分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島。

1576. **Dere reticulata** Gressitt 藍翅紅胸天牛 (Gressitt, 1951:311; Hua, 1982:37)
Dere reticulata Gressitt, 1942::4. (Tibet)
寄 主：雲南松。
分 佈：西藏、雲南、四川；寮國。

1577. **Dere thoracica** White 櫟紅胸天牛 (Chang & Hung, 1986:122; Gressitt, 1951:312; Hua, 1982:37; Han., 1992:479)
Dere thoracica White, 1855:249. (N. China)
別 名：*櫟藍胸天牛*。
寄 主：雲南松、葡萄、梨、郁李、胡頹子類、槲櫟、合歡、光葉石楠、木荷、山槐、櫻花類。
分 佈：雲南、湖南、江西、浙江、江蘇、陝西、河北、華北；朝鮮、日本、寮國。
天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein)　兩色刺足繭蜂(幼蟲)

1578. **Derolus volvulus** (Fabricius) 灰脊腿天牛 (Gressitt, 1951:143; Hua, 1982:37)
Cerambyx volvulus Fabricius, 1801:271. (India)
=*Cerambyx demissus* Pascoe, 1859:21. (India)
Derolus volvulus, Auriv., 1912:58.
別 名：*金合歡灰天牛*。
寄 主：棗屬、金合歡屬、合歡屬、木棉樹屬、山檨高屬、野桐屬、紫檀屬、婆羅雙樹屬等。
分 佈：海南(尖蜂嶺)；菲律賓、越南、寮國、印尼、印度、阿拉伯。

1579. **Dialeges undulatus** Gahan 波紋裂眼天牛 (Gressitt, 1951:145; Hua, 1982:37; Yunn., 1987:649)
Dialeges undulatus Gahan, 1891:23.　(Ceylon)
寄 主：李屬、梨屬、印緬櫻、開麻屬、木姜子屬。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；寮國、爪哇、泰國、緬甸、斯里蘭卡。

1580. **Epiclytus taiwanmus** Chang 臺灣蟻虎天牛 (Chang & Hung, 1986:122)
Epiclytus taiwanus Chang, 1960:1. (Taiwan: Mt. Chang-sheng)
寄 主：柿。
分 佈：臺灣。

1581. **Epipedocera atritarsis djoui** Gresssitt 紅翅眉天牛 (Gressitt, 1951:627; Hua, 1982:38)
Epipedocera atritarsis djoui Gressutt, 1951:627.
寄 主：桑。
分 佈：廣東。

1582. **Erythresthes bowringii** (Pascoe) 栗長紅天牛 (Gressitt, 1951:187; Hua, 1982:38; Han., 1992:480; Zhang, 1987[ed.] 2:32)
Erythrus ? bowringii Pascoe, 1863:52.
Erythresthes bowringii, Thomson, 1864:159.
寄 主：板栗。
分 佈：江西、廣東、香港、湖南、江西。

1583. **Erythrus fortunei** White 弧斑紅天牛 (Chao, 1982:142; Gressitt, 1951:186; Hua, 1982:39; Li et al., 1981:96)
Erythrus fortunei White, 1853:142. (China: Shanghai)
=*Erythrus fortunei* ab. *bipunctatus* Plavilstshikov, 1931:128.
別 名：*弧斑天牛*。
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、陝西。

1584. **Euryphagus miniatus** (Fairmaire) 黃暈闊嘴天牛 (Li et al., 1981:96)
寄 主：龍眼。
分 佈：福建。

1585. **Gnatholea eburifera** Thomson 額天牛 (Gressitt, 1951:150; Hua, 1982:39)
Gnatholea eburifera Thomson, 1861:375.(Cambodia, Assam)
別 名：*牙斑柚天牛*。
寄 主：柚、柑橘、板栗、梨、冬瓜木、榕。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；婆羅洲、越南、寮國、柬埔寨、馬來亞、泰國、緬甸、印度。

1586. **Gracilia minuta** (Fabricius) 小天牛 (Gressitt, 1951:160; Hua, 1982:39)
Saperda minuta Fabricius, 1781:235.
Gracilia minuta, Fowler, 1890:226.
別 名：*微小天牛*。
寄 主：胡桃屬、桃、栗、榧、山楂屬、懸鉤子屬、鵝耳櫪、槭屬、衛茅、決明科植物、柳、橡、楓、櫟屬、山毛櫸。
分 佈：陝西、華北；日本、亞洲西部、歐洲、北美

1587. **Hemadius oenochrous** Fairmaire 櫻紅天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:32)
寄 主：桃。
分 佈：江西。

1588. **Ipothalia esmeralda** Bates 狹錘角天牛 (Yunn., 1987:669)
寄 主：板栗。
分 佈：雲南；印尼。

1589. **Lachnopterus auripennis** (Newman) 毛翅天牛 (Gressitt, 1951:145; Hua, 1982:40)
Hammaticherus auripennis Newman, 1842:245.
Lachnopterus auripennis, Kano, 1929:77.
=*Lachnopterus socius*, Mitono, 1938:191.
寄 主：番櫻桃、*Calocacis esculenta*.
分 佈：臺灣；菲律賓。

1590. **Leontium viride** Thomson 綠色細青天牛 (Chang & Hung, 1986:123; Gressitt, 1951:208)
Leontium viride Thomson, 1865:569.
=*Callichroma* (*Chloridolum*) *tenuatum* Bates, 1873:197.
寄 主：松類。
分 佈：臺灣；日本、庫頁島。

1591. **Massicus raddei** (Blessig) 栗山天牛 (ASZI, 1986, 1:557; Chang & Hang, 1986:124; Hua, 1982:41; Hun., 1992:481; Li et al., 1981:96; Yunn., 1987:649; Zhang, 1987[ed.] 2:32)
Neocerambyx raddei Blessig, 1872:170.
=*Pachydissus (Mallambyx) japonicus* Bates, 1873:152.
Massicus raddei, Gressitt, et al., 1970:59.
別 名：*栗天牛、深山天牛*。
寄 主：桑、柑橘、栗、錐栗、鋸栗、麻櫟、櫻、柞、泡桐、水曲柳、梳、枹樹、櫟樹、柯樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西、山東、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1592. **Nadezhdiella aurea** Gressitt 桃褐天牛 (ASZI, 1986, 1:557; Gressitt, 1951:139; Hua, 1982:42, Zhang, 1987[ed.] 2:32)
Nadezhdiella aureus Gressitt, 1937:91.
=*Nadezhdiella conica* Chiang, 1942:254.
寄 主：桃、梨。
分 佈：廣西、四川、江西、浙江。

1593. **Nadezhdiella cantori** (Hope) 橘褐天牛 (ASZI, 1986, 1:558; Chang, 1954:55-75; Chang & Hung, 1986:125; Chao, 1982:143; Chen, 1941:1-35; Gressitt, 1951:139; Hua, 1982:42; Huang, 1990[ed.] 2:234-236; Huang et Gao, 1996:199; Hun., 1992:482; Hung et al., 1960:169-173; Li et al., 1981:96; Lin, 1986[ed.] 323-326; Lin, 1997(4):40-41; Liu, 1941:1- ; 1942:40-47; 1947:69-119; NZWDI, 1981:1930; Tan, 1960:44; Ye, 1993(1):17; Yunn., 1987:648; Zhang, 1987[ed.] 2:32)
Cerambyx coori Hope, 1845:11. (Korea, China)
=*Cerambyx scabricollis* Chevrolat, 1852:416. (Hong Kong)
=*Cerambyx lucasi* Brongniart, 1891:238. (Siam)
Nadezhidiella contori, Plavilstshikov, 1931:71.
別 名：*褐天牛、臺灣山天牛、侃陶利橘天牛*。
寄 主：柑橘、檸檬、柚、紅橘、甜橙、鳳梨、葡萄、山黃麻。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、河南；泰國。
天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein)　兩色刺足繭蜂(幼蟲)

1594. **Neocerambyx mandarinus** Gressitt 黑腫角天牛 (Gressitt, 1951:134; Hua, 1982:43)
Neocerambyx mandarinus Gressitt, 1939:209.
寄 主：蘋果、梨、李、桃、梅。
分 佈：四川、陝西。

1595. **Neocerambyx (Hemadius) oenochrous** (Fairmaire) 櫻紅腫角天牛 (Chao, 1982:143; Gressitt, 1951: 135; Gressitt, et al., 1970:58)
Hemadius oenochrous Fairmaire, 1889:57. (Anhwei)
=*Neocerambyx stötzneri* Heller, 1923:72. (Szechuan)
=*Neocerambyx mushaensis* Kano, 1928:224. (Taiwan)
Neocerambyx (Hemadius) oenochrous, Gressitt et al., 1970:58.
寄 主：桃、福建山櫻桃、*Prunus taiwana*.
分 佈：臺灣、福建、西藏、四川、安徽；寮國。

1596. **Nothopeus hemipterus** (Olivier) 僞鞘天牛 (Gressitt, 1951:190; Hua, 1982:43)
Cerambyx hemipterus Olivier, 1795:127. (Java)
Nothopeus hemipterus, Gahan, 1906:203.
寄 主：番櫻桃、番石榴、水曲柳、紫薇。

分 佈：臺灣；馬來亞、爪哇、蘇門答臘、泰國、緬甸、印度北部。

1597. **Pachyteria violaceothoracica** Gressitt et Rondon 紫胸厚天牛 (Gressitt, et al., 1970: 139; Yunn., 1987:669)
Pachyteria violaceothoracica Gressitt et Rondon, 1970:139. (Laos)
寄 主：檬果。
分 佈：雲南；寮國。

1598. **Palaeocallidium (Callidium) rufipenne** Motschulsky 紅翅扁胸天牛 (Gressitt, 1951:225; Hua, 1982:27)
Callidium rufipenne Motschulsky, 1860:19. (Japan)
=*Callidium rufipenne* abb. *bicoloratum, metallipenne* Pic, 1906:10.
=*Callidium japonicum* Plavilstshikov, 1933:126. (Japan)
=*Callidium plavilstshikovi* Matsushita, 1933:439. (n. n. for *japonicum* Plavilstshikov, by transferring it to Semanotus)
別 名：*紅翅杉天牛*。
寄 主：松、柳杉、冷杉、日本扁柏。
分 佈：臺灣、江西、陝西、河北；朝鮮、日本、琉球、庫頁島。

1599. **Perissus laetus** Lameere 魚藤跗虎天牛 (Gressitt, 1951:269; Hua, 1982:45; Yunn., 1987:663)
Perissus laetus Lameere, 1893:283. (Cambodia)
=*Perissus proprius* Gahan, 1894:21. (Burma)
=*Perissus kankauensis chungkonensis* Gressitt, 1940:73. (Hainan)
寄 主：柿樹、魚藤、雞血藤、合歡、櫟、榕、黃檀、香須、貓尾樹、金合歡、臘腸樹。
分 佈：廣東、海南、雲南；寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、印度(阿薩姆)。

1600. **Perissus** sp. 跗虎天牛 (Luo et al., 1996:57)
寄 主：檬果(花)。
分 佈：海南。

1601. **Phymatodes (Paraphymatobes) albicinctus** Bates 臺灣棍腿天牛 (Chang & Hung, 1986:127; Gressitt, 1951:228; Hua, 1982: 45)
Callidium albofasciatum Motschulsky, 1866:174. (*nec* Bland)
Phymatodes albicinctus Bates, 1873:198.
寄 主：葡萄、歐洲酸櫻桃。
分 佈：臺灣；琉球、日本、朝鮮。

1602. **Phymatodes (Paraphymatodes) hauseri** (Pic) 梨棍腿天牛 (Gressitt, 1951:229; Hua, 1982:45)
Callidium hauseri Pic, 1907:9.
Phymatodes (*Paraphymatodes*) *hauseri*, Plavilstshikov, 1934:216.
寄 主：梨。
分 佈：新疆；中亞。

1603. **Phymatodes (Poecilium) infasciatus** Pic 紅胸棍腿天牛 (Chao, 1982:143; Gressitt, 1951:229; Hua, 1982:45; Zhang, 1987[ed.] 2:33)
Poecilium infasciatus Pic, 1935:36.
別 名：*二色小天牛*。
寄 主：葡萄。
分 佈：福建、江西、江蘇。

1604. **Phymatodes (Poecilium) maaki** (Kraatz) 葡萄楃腿天牛 (Gressitt, 1951:229; Hua, 1982:46)
Callidium alni ?, Blessig, 1872:182. (*nec* Linnaeus)
Callidium maaki Kraatz, 1879:88, 106.
Phymatodes maaki, Bates, 1884:228.
Phymatodes (*Poecilium*) *maaki*, Plavilstshikov, 1934:223
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣；日本、朝鮮、西伯亞東南部。

1605. **Phymatodes (Paraphymatodes) mediofasciatus** Pic 中帶楃腿天牛 (Gressitt, 1951:229; Hua, 1982:46)
Callidium albofasciatum, Kraatz, 1879:88. (*nec* Motschulsky)
Phymatodes (*Poecilium*) *mediofasciatum* Pic, 1933:29.
Phymatodes (*Paraphymatodes*) *mediofasciatus*, Plavilstshikov, 1940:324, 701.
別 名：*中帶天牛*。
寄 主：桃。
分 佈：華南、江蘇、華中、陝西；西伯利亞東南部。

1606. **Plocaederus bicolor** Gressitt 二色皺胸天牛 (Gressitt, 1951:140; Hua, 1982:46; Hun., 1992:482)
Plocaederus bicolor Gressitt, 1942:1.
寄 主：栗。
分 佈：西藏、雲南、貴州、湖南、湖北、河北。

1607. **Plocaederus obesus** Gahan 咖啡皺胸天牛 (ASZI, 1986, 1:558; Chang & Hung, 1986:127; Gressitt, 1951:141; Hua, 1982:46; Luo et Li, 1998:76; Yunn., 1987:648)
Plocaederus obesus Gahan, 1889:
Plocaederus pedestris, Cotes, 1889:91. (*nec* White)
Plocaederus obesus Gahan, 1890:51, 51. (India)
別 名：*咖啡胖天牛*。
寄 主：咖啡、山檨子、檬果、蘋婆、板栗、腰果、人面子、木棉、酒椰子、破布子、吉貝、石梓、杜果、婆羅雙樹、酸棗、欖仁樹、橡膠
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南；寮國、泰國、緬甸、印度(阿薩姆)、安德曼群島。

1608. **Plocaederus ruficonis** (Newman) 紅角皺胸天牛 (Hua, 1982: 46; Yunn., 1987:648)
Cerambyx ruficornis Newman, 1842:245. (Philippines)
=*Cerambyx fulvicornis* Guer., 1843:227. (Philippines)
=*Plocaederus pruinosus* Pascoe, 1866:526. (Penang)
寄 主：檬果、荔枝。
分 佈：雲南；菲律賓、寮國、馬來亞、印尼、泰國。

1609. **Polyzonus fasciatus** (Fabricius) 黃條藍天牛 (Chao, 1982:143; Gressitt, 1951:210; Xiao, 1992: 494)
Saperda fasciata Fabricius, 1781:232.
=*Cerambyx sibiricus* Gmelin, 1790:1840.
=*Cerambyx bicinctus* Oliver, 1795:46.
Polyzonus fasciatus, Castelnau, 1840:483.
=*Polyznus meridionalis* Bates, 1879:413.
別 名：*多帶天牛*，*黃帶藍天牛*。
寄 主：橘、梛、松、楊、柳、刺槐、竹、桉、榆、柏、菊科、傘形花科

植物。
分 佈：廣東、福建、江西、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、寧夏、甘肅、山東、山西、河北、天津、北京、內蒙古、吉林；朝鮮、蘇聯(西伯利亞)。

1610. **Pronocera brevicollis** (Gebler) 原扁胸天牛 (Gressitt, 1951:219; Hua, 1982:47)
Callidium brevicollis Gebler, 1833:302.
=*Callidium sibiricum* Gebler, 1848:391.
=*Callidium dauricum* Motschulsky, 1859:294.
=*Pseudophymatodes altaiensis* Pic, 1901:12.
=*Pronocera brevicollis* var. *daurica*, Cho, 1936:93.
Pronocera brevicollis, Plavilstshikov, 1940:263, 685.
寄 主：松。
分 佈：內蒙古北部、東北；朝鮮、庫頁島、西伯利亞。

1611. **Prothema signata** Pascoe 長跗天牛 (Gressitt, 1951:188; Hua, 1982:47; Hun., 1992:483)
Prothema signata Pascoe, 1856:43. ("N. China")
=*Prothema funerea* Pascoe, 1856:43. (China)
=*Prothema coomani* Pic, 1934:20. (Tonkin)
寄 主：錐栗。
分 佈：西藏、廣東、福建、江西、湖南、浙江、華北；越南、寮國。

1612. **Pseudamaesthetis langana** Pic 小栗色天牛 (Zhang, 1987B[ed.] 2:33)
寄 主：蘋果。
分 佈：江西。

1613. **Purpuricenus** (s. str.) **malaccensis** (Lacordaire) 黃帶紫天牛 (Gressitt, 1951:318; Hua, 1982:48)
Philagathes malaccensis Lacordaire, 1869:176. (Malacca)
=*Purpuricenus fasciatus* Brogniart, 1891:241. (Indo-China)
Purpuricenus malaccensis, Gahan, 1906:185.
寄 主：柿。
分 佈：廣東、海南、陝西；越南、寮國、馬來亞、印尼、泰國、緬甸、阿薩姆。

1614. **Purpuricenus** (s. str.) **montanus** White 黑條紫天牛 (Gressitt, 1951:318; Hua, 1982:48)
Purpuricenus montanus White, 1853:138.
寄 主：松、櫟。
分 佈：西藏；克什米爾。

1615. **Purpuricenus (Sternoplistes) spectabilis** Motschulsky 二點紫天牛 (Gressitt, 1951:319; Hua, 1982:48; Hun., 1992:484; Li et al., 1981:97)
Purpuricenus spectabilis Motschulsky, 1857:36. (Japan)
=*Sternoplistes temmincki*, Matsumura, 1908:pl. 52, f. 11.
=*Purpurcenus spectabilis* var. *bijunctus* Pic, 1923:8. (Japan)
=*Purpuricenus spectabilis* forma *okiensis* Fujimura, 1962:209. (Oki)
別 名：*二點紅天牛*。
寄 主：棗、梨、杉、油桐、櫟、竹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、甘肅；朝鮮、日本。

1616. **Purpuricenus (Sternoplistes) temminckii** Guérin-Meneville 竹紫天牛 (Chao, 1982:144; Chang & Hung, 1986:129; Chen et al., 1993:85; Gressitt, 1951:319; Hua, 1982:49; Li et al., 1981:97)

Purpuricenus temminckii Guerin-Meneville, 1844:224. (China: Shanghai)
=*Purpuricenus sinensis* White, 1853:139. (Shanghai)
=*Purpuricenus japonus* Motschulsky, 1857:37. (Japan)
=*Purpuricensu temminckii* var. *similis* Pic, 1923:8. (China)
=*Sternoplistes temmincki* abb. *binavus, corvinus, kaili* Heyrovsky, 1933:135.
=*Sternoplistes temmincki* ab. *tesari* Heyrovsky, 1935:83.
Purpuricenus (Sternoplistes) temminckii, Gressitt, 1951:319.

別 名：*竹竿紅天牛，竹紅天牛，紅天牛，泰敏克紫煙艷天牛。*
寄 主：棗、竹。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、遼寧；朝鮮、日本、寮國。

1617. **Rhaphuma acutivittis** (Kraatz) 尖紋艷虎天牛 (Gressitt, 1951; Hua, 1982:49)

Clytus (Xylotrechus) acutivittis Kraatz, 1879:111.
Rhaphuma acutivittis, Auriv., 1912:407

別 名：*尖紋虎天牛。*
寄 主：葡萄、柳屬。
分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(西伯利亞)。

1618. **Rhaphuma horsfieldi** (White) 管紋艷虎天牛 (Gressitt, 1951:290; Gressitt et Rondon, 1970:241; Hua, 1982:50)

Clytus horsfieldi White, 1855:284. (Java)
Rhaphuma horsfieldi, Gahan, 1906:272.
=*Rhaphuma horsfieldi* var. *laosensis* Pic, 1923:9. (Laos)

別 名：*管紋虎天牛。*
寄 主：胡桃、香須樹、櫟、木姜子、合歡屬。
分 佈：雲南、四川；越南、寮國、緬甸、印度東北部。

1619. **Rhopalopus (Prorrhopalopus) signaticollis** Solsky 褐扁鞘天牛 (Gressitt, 1951:218; Hua, 1982:51)

Rhopalopus signaticollis Solsky, 1872:177.
Rhopalopus (Prorrhopalopus) signaticollis, Plavilstshikov, 1921:121.
=*Rhopalopus (Prorrhopalopus) signaticollis* ab. *rufithorax* Plavilstshikov, 1940:679.

寄 主：胡桃屬、柞、赤楊、櫟屬、楷木屬。
分 佈：東北；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、東西伯利亞。

1620. **Rhytidodera bowringii** White 脊胸天牛 (ASZI, 1986, 1:559; Chao, 1982:154; Gressitt, 1951:146; Hua, 1982:51; Huang, 1995, 18(1):12-19; Huang et Gao, 1996:278; Huang et al., 1998(4):38; Hun., 1992:486; Li et al., 1981:97; Lin, 1997(4):40-41; Luo, 1991:86; Luo et Li, 1998:53, 78; Luo et al., 1996:58; NZWDI, 1981 :1985; Shi, 1998, 21(3):36)

Rhytidodera bowringii White, 1853:137.

寄 主：檬果、腰果(*Anacardium occidentale*)、橄欖、人面子(*Dracontomelum dao*)、朴樹(*Celis sinensis*)。
分 佈：福建、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、安徽、湖北；爪哇、緬甸、印度。

1621. **Rhytidoera integra** Kolbe 榕脊胸天牛 (Gressitt, 1951:146; Gressitt et Rondon, 1970:88; Hua, 1982:51; Hun., 1992:486)

Rhytidodera integra Kolbe, 1886:237. (China)
寄 主：檬果、細葉榕。
分 佈：湖南、廣東、香港、廣西、雲南、湖北；朝鮮、日本、寮國、泰國、緬甸。

1622. **Rosalia** (s. str.) **batesi** Harold 柳麗天牛 (Gressitt, 1951:213; Hua, 1982:51)
Rosalia batesi Harold, 1877:360.
寄 主：胡桃、柳。
分 佈：四川、陝西；朝鮮、日本。

1623. **Rosalia** (s. str.) **lameerei** Brongniart 茶麗天牛 (ASZI, 1986, 1:561; Gressitt, 1951:214; Gressitt et Rondon, 1970:190; Hua, 1982:51; Yunn, 1987:655)
Rosalia lameerei Brongniart, 1890:cxxi. (Laos)
=*Rosalia lameerei* var. *semireducta* Pic, 1910:30.
=*Rosalia lameerei* varr. *bireducta*, *quadrinotata* Dayrem., 1935:25.
=*Rosalia lameerei* var. *unireducta* Pic, 1937:11.
寄 主：梨、桃、柿、板栗、雲南松、茶、麻櫟、冬瓜木、朴、山林果、麻、女貞、冬瓜。
分 佈：臺灣、雲南、四川；越南、寮國、泰國、緬甸、阿薩姆。

1624. **Semanotus bifasciatus** (Motschulsky) 雙條杉天牛 (Beijing FC., 1980[ed.]:326-329; Gressitt, 1951:221; Hua, 1982:52; Li et al., 1981:97; Liu, 1982[ed.]:286-288)
Hylotrupes bifasciatus Motschulsky, 1875:148. (N. China)
=*Sympiezocera sinensis* Gahan, 1888:61. (China)
Semanotus bifasciatus, Plavilstshikov, 1931:201.
寄 主：松、檜柏、側柏、杉、扁柏、羅漢松。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、京、東北；朝鮮、日本。
天 敵：*Thanasinus lewisi* Jacobson 似蟻郭公蟲(成蟲和幼)
Tillus notatus Klug 異色郭公蟲
Zombrus bicolor (Enderlein) 兩色齒足繭蜂(幼蟲)
Zombrus sjöstedti (Fahringer) 醬色刺足繭蜂(幼蟲)
Scleroderma guani Xiao et Wu 管氏腫腿蜂(幼蟲)

1625. **Semanotus japonicus** (Lacordaire) 日本杉天牛 (Chang & Hung, 1986:130; Gressitt, 1951: 222)
Sympiezocera japonica Lacordaire, 1869:47.
Semanotus japonicus, Auriv., 1912:341.
寄 主：松類、檜類、柳杉。
分 佈：臺灣；日本。

1626. **Stenygrinum quadrinotatum** Bates 擬蠟天牛 (ASZI, 1986, 1:561; Chang & Hung, 1986:130; Gressitt, 1951:158; Gressitt et Rondon, 1970:100; Hua, 1982:53; Hun., 1992:487; Li et al., 1981:98; Yunn., 1987:653)
Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873:154. (Japan)
=*Stenygrinum quadrinotatum* ab. *binotatum* Plavilstshikov 1931:41.
=*Stenygrinum quadrinotatum* ab. *conjunctum* Matsushita, 1932:66.
別 名：*四星栗天牛*，*四星扁褐天牛*。
寄 主：華山松、油松、栗屬、櫟屬、枹樹。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、山東、河南、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、寮國、緬甸、印度(阿薩姆)。

1627. **Stromatium longicorne** (Newman) 長角鑿點天牛 (Chang & Hung.,1986130; Gressitt, 1951: 150; Gressitt et Rondon, 1970:53; Hua, 1982:53; Li et al., 1981:98; Xiao, 1992:502; Yunn., 1987:669)

Arhopalus longiconrne Newman, 1842:246. (Philippines: Luzon)
=*Stromatium asperulum* White, 1855:300. (Hong Kong)
Stromatium longicorne, Gahan, 1906:115.

別 名：*長角櫟天牛，櫟鑿點天牛、家天牛。*

寄 主：板栗、菠蘿蜜、橄欖、桑、櫟、柚木、麻栗、木麻黃、冷杉、相思、黃檀、楠、杉、櫸、烏墨、青皮、橡膠樹、槐樹及危害其它闊葉樹達 40 多種。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、海南、廣西、雲南、貴州、四川、山東、遼寧；日本、琉球、菲律賓、婆羅洲、加里曼丹、越南、寮國、馬來西亞、印尼、蘇門答臘、東印度、泰國、緬甸、印度(阿薩姆)。

1628. **Tetropium castaneum** (Linnaeus) 光胸斷眼天牛 (Gressitt, 1951:40; Xiao,1992:504)

Cerambyx castaneus Linnaeus, 1758:396.
=*Cerambyx luridus* Linnaeus, 1767:634.
=*Callidium aulicum* Fabricius, 1775:190.
Tetropium castaneum, Jacobson, 1910: pl. 66, f. 3.
=*Tetropium luridum* var. *atricorne* Pic, 1931.258.

別 名：*光胸幽天牛。*

寄 主：紅松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉、冷杉、興安落葉松等。

分 佈：雲南、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

天 敵：Ichneumonidae　姬蜂科
雲杉天牛瘦姬蜂
雲杉天牛矛繭蜂
赤腹繭蜂
Helcon sp.　黑繭蜂

1629. **Trichoferus campestris** (Faldermann) 家茸天牛 (ASZI, 1986, 1:560; Beijing FC., 1980[ed.]:358-359; Gressitt, 1951:149; Hua, 1982:53; Hun., 1992:488; Liu, 1982[ed.]:296; Xiao, 1992:506; Zhan, 1984:32-33)

Callidium campestris Faldermann, 1835:435.
=*Stromatium turkestanicum* Heyden, 1886:193.
=*Hesperophanes rusticus* Ganglbauer, 1886:133.
=*Hesperophanes flavopubescens* Kolbe, 1886:219.
Trichoferus campestris, Plavilstshikov, 1940:69, 630.

寄 主：棗、蘋果、梨、桑、雲南松、油松、雲杉、刺槐、丁香、楊樹、柳樹、榆、香椿、黃蓍、柚木、樺木、梧桐、白蠟。

分 佈：湖南、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、江蘇、上海、山東、河南、陝西、青海、甘肅、山西、河北、北京、天津、內蒙古、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、蒙古。

天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein)　兩色刺足繭蜂(幼蟲)
Zombrus sjöstedti (Fahringer)　醬色刺足繭蜂(幼蟲)

Scleroderma guani Xiao et Wu 管氏腫腿蜂

1630. **Trirachys oreintalis** Hope 刺角天牛 (ASZI, 1986, 1:557; Chao, 1982:144; Chen et al., 1993:87; Gressitt et Rondon, 1970:68; Hun., 1982:488; Li et al., 1981:98; Xiao, 1992:507; Zhang, 1987[ed.] 2:34)
Trirachys orientalis Hope, 1841:61. (E. China: Chusan Is.)
=*Trirachys formosana* Schwarzer, 1925:21. (Taiwan)
寄 主：銀杏、柑橘、梨、棗、楊、柳、槐、刺槐、臭椿、榆、泡桐、櫟、合歡。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、貴州、陝西、甘肅、浙江、安徽、江蘇、上海、湖北、河南、山東、山西、河北、天津、北京、遼寧、黑龍江；日本(九州)、寮國。

1631. **Turanium (Chalcoturaium) johannis** Baeckmann 綠溝跗天牛 (Gressitt, 1951:220; Hua, 1982:54)
Turanium johannis Baeckmann, 1923:34.
Turanium (*Chalcoturanium*) *johannis*, Jank., 1934:100.
寄 主：梨、胡桃、北歐花楸。
分 佈：新疆；中亞。

1632. **Xylotrechus (Xyloclytus) altaicus** (Gebler) 松脊虎天牛 (Gressitt, 1951:238; Hua, 1982: 54)
Clytus altaicus Gebler, 1830:342.
=*Clytus popovii* Mannerheim, 1849:241.
Xylotrechus altaicus, Chevrolat, 1863:313.
Xylotrechus (*Xyloclytus*) *altaicus*, Plavilstshikov, 1940:343, 707.
寄 主：落葉松。
分 佈：內蒙古北部；蒙古、日本、庫頁島、蘇聯(西伯利亞)。

1633. **Xylotrechus** (s. str.) **atronotatus** Pic 稜額虎天牛 (Chang & Hung, 1986:131; Gressitt, 1951: 239)
Xylotrechus atronotatus Pic. 1917:11. (Taiwan)
=*Xylotrechus basalis* Schwarzer, 1925:25. (Taiwan: Taroko)
=*Xylotrechus basalis* ssp. *unicolor* Kano, 1933:132.
=*Xylotrechus cinerascens* Matsushita, 1933:268.
=*Xylotrechus atronotatus* ssp. *bandaishanus* Mitono, 1941:92.
別 名：*北字脊虎天牛*。
寄 主：黃心柿、水藤。
分 佈：臺灣、海南；日本(琉球)。

1634. **Xylotrechus (Xyloclytus) chinensis** (Chevrolat) 桑脊虎天牛 (ASZI, 1986, 1:565; Chien, 1989: 338; Gressitt, 1951:238; Hua, 1982:54; Li et al., 1981:98; NZWDI, 1981:1127; Suzhou CS., 1985:237-239; Xiao, 1992:509; Zhang, 1987[ed.] 2:34; Zheng, 1982:237-239)
Clytus chinensis Chevrolata, 1852:416. (China)
Xylotrechus chinensis Chevrolat, 1863:313.
=*Xylotrechus sekii* Matsushita, 1936:146.
=*Xylotrechus chinensis* var. *griseofasciatus* Pic, 1943:1.
別 名：*桑虎天牛*、*虎天牛*、*虎斑天牛*。
寄 主：桑、蘋果、梨。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、琉球。
天 敵：寄生菌

線蟲
Formicidae 蟻科
蟾蜍
Dendrocopos major cabanisi Malherbe 斑啄木鳥(滅蟲率可達 11.3%)

1635. **Xylotrechus** (s. str.) **chinensis** var. **sauteri** Schzarzer 曹氏華夏黃虎天牛 (Chang & Hung, 1986:131)
寄 主：梨、桑。
分 佈：臺灣。

1636. **Xylotrechus** (s. str.) **contortus** (Gahan) 核桃脊虎天牛 (Chien, 1989:338; Gressitt, 1951:245; Hua, 1982:55; Hun., 1992:489; Yunn., 1987:663)
Xylotrechus contortus Gahan, 1906:249.
=*Xylotrechus biarcuatus* Pic, 1917:6.
Xylotrechus (s. str.) *incurvatus contortus* Gressitt, 1951:245
別 名：*核桃虎天牛、核桃脊天牛*。
寄 主：核桃、杜鵑花屬。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川；緬甸、印度。

1637. **Xylotrechus** (s. str.) **grayii** (White) 咖啡脊虎天牛 (Chang & Hung, 1986:131; Gressitt, 1951:243; Hua, 1982:55; Hun., 1992:489; Li et al., 1981:98; Peng et Zhong, 1997, (2):35-38; Yunn., 1987:661)
Clytus grayii White, 1855:261. (N. China)
Xylotrechus grayii, Chevrolat, 1863:325.
別 名：*咖啡虎天牛、胸斑虎天牛、葛氏棱額虎天牛*。
寄 主：咖啡、柑橘、柚木、榆、日本泡桐、山石榴、金銀花。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、西藏、四川、貴州、江蘇、湖北、甘肅北部、華北；朝鮮、日本。
天 敵：*Scleroderma guani* Xiao et Wu 管氏腫腿蜂(幼蟲)

1638. **Xylotrechus** (s. str.) **incurvatus** (Ghevrolat) 曲紋脊虎天牛 (Gressitt, 1951:244; Hua, 1982:55; Yunn., 1987:662)
Amauresthes incurvatus Chevrolata, 1863:331. (India)
Xylotrechus incurvatus, Gahan, 1906:248.
寄 主：李、核桃。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、華南、四川；緬甸、印度、孟加拉、阿薩姆。

1639. **Xylotrechus** (s. str.) **magnicollis** (Fairmaire) 巨胸脊天牛 (Chien, 1989:340; Gressitt, 1951:248; Hua, 1982:56, Hun., 1992:490; Yunn., 1987:662)
Clytus (*Xylotrechus*) *magnicollis* Fairmaire, 1888:34. (W. China)
Xylotrechus magnicollis, Pic, 1900:18.
=*Xylotrechus magnicollis* var. *atrithorax* Pic, 1910:30.
=*Xylotrechus magnicollis* var. *decoloratipes* Pic, 1910:30.
=*Xylotrechus gahani* Stebbing, 1914:352. (Assam)
=*Xylotrechus renominatus* Beeson, 1919:151.
=*Xylotrechus irinae* Plavilstshikov, 1925:360. (SE. Siberia)
別 名：*巨胸脊虎天牛*。
寄 主：柿屬、櫟屬、柞樹、國槐、槍彈木、印度橡樹、榕。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、陝西、河

北：俄羅斯(西伯利亞東南)、寮國、緬甸、印度(阿薩姆)。

1640. **Xylotrechus** (s. str.) **namangensis** (Heyden) 柳脊虎天牛 (Gressitt, 1951:249; Hua,1982: 56)

Clytus (Xylotrechus) namangensis Heyden, 1885:297.
Xylotrechus namangensis, Sem., 1893:500.
寄 主：李、蘋果、桑、胡桃。
分 佈：新疆；中亞。

1641. **Xylotrechus** (s. str.) **pyrrhoderus** Bates 葡萄脊虎天牛 (ASZI, 1986, 1:566; Chao, 1982:145; Chen et Wang, 1987:180; Chien, 1989:338; Gressitt, 1951:249; Hua, 1982:56; Huang, 1990[ed.] 2:377; Li et al., 1981:98; Lin, 1997(4):40-41; Lu, 1996(2):48-49; Su et al., 1999(1):60; Zhang, 1987[ed.] 2:34)

Xylotrechus pyrrhoderus Bates, 1873:200.
=*Xylotrechus rufilius*, Yokohama, 1931:35. (*nec* Bates)
別 名：*葡萄虎天牛*。
寄 主：葡萄。
分 佈：福建、江西、四川、貴州、浙江、江蘇、山東、陝西；朝鮮、日本。
天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein) 兩色刺足繭蜂(幼蟲)

1642. **Xylotrechus** (s. str.) **quadripes** Chevrolat 滅字脊虎天牛 (ASZI, 1986, 1:567; Chang & Hung, 1986:132; Gressitt, 1951:250; Gressitt et Rondon, 1970:200; Hua, 1982:56; Hun., 1992:490; Kuang, 1959:281-284, 280; Luo et Li, 1998:35; Peng et Zhong, 1997, (2):35-38; Yunn., 1987:661; Zhang et al., 1999, 22(1):12-13)

Xylotrechus quadripes Chevrolat, 1863:315. (India)
=*Cucujus coffeophagus* Richter, 1867:
別 名：*咖啡滅字虎天牛、赤足稜額虎天牛*。
寄 主：咖啡、橡果、菠蘿蜜、柚木、厚皮樹、山石榴、黃垠木、鐵刀木。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川；越南、寮國、泰國、緬甸、印度(阿薩姆)。

1643. **Xystrocera globosa** (Olivier) 合歡雙條天牛 (ASZI, 1986, 1:556; Chao, 1982:145; Chang & Hung, 1986:132; Gressitt, 1951:130; Gressitt et Rondon, 1970:51; Hua, 1982:57; Hun., 1992:491; Li et al., 1981:98)

Cerambyx globosus Olivier, 1795:27. (Java)
Xystrocera globosa, Serville, 1834:69.
=*Xystrocera globosa* var. *mediovitticollis* Breuning, 1957:1241. (China, Japan, Tonkin)
別 名：*雙條合歡天牛、青條天牛*。
寄 主：桑、柑橘、桃、雲南松、油茶、銀樺皮樹、合歡、楹樹、大葉合歡、相思樹、槐、櫟、孔雀豆、海紅豆、木棉、羊蹄甲屬、扁擔杆屬、木棉。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東、河北、東北；朝鮮、日本、菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、印尼、蘇門答臘、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、太平洋各島嶼、新幾內亞、夏威夷、毛里求斯、毛里西亞、馬達加斯加、埃及。

1644. **Xystrocera festiva** Thomson 咖啡雙條天牛 (Gressitt et Rondon, 1970:51; Hua, 1982:57)

Xystrocera festiva Thomson, 1861:251. (Java)
寄 主：咖啡、可可、合歡屬、南洋楹、楹樹。

分 佈：雲南；婆羅洲、越南、寮國、馬來亞、爪哇、蘇門答臘、緬甸、印度(阿薩姆)。

Lamiinae 溝脛天牛亞科

1645. **Acalolepta cervina** (Hope) 咖啡鍚天牛 (ASZI, 1986, 1:574; Hua, 1982:58; Li et al., 1981:99; Luo et Li, 1998:33; Meng & Huang, 1962:430-431; Yunn., 1987:686)
Lamia cervinus Hope, 1831:27.
=*Dihammus vervinus*, Gressitt, 1938:154.
別 名：*咖啡旋皮天牛*。
寄 主：咖啡、石榴屬、蒴藋(*Sambucus javanica* Bl.)、駁骨丹(*Buddleia asiatica* Lour.)、蓖麻(*Ricinus communis* L.)、柚木屬、水團花屬(*Adina*)、醉魚草屬(*Buddleia*)、臭牡丹(*Clerodendron fragrans* Vent.)、赤桐屬、石梓屬、蓖麻。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、西藏、四川；朝鮮、日本、越南、寮國、緬甸、印度、尼泊爾。

1646. **Acalolepta sericeomicans** (Fairmaire) 絹鍚天牛 (Gressitt, 1951:403; Hua, 1982:60; Yunn., 1987:686)
Monohamus sericeomicans Fairmaire, 1889:67.
別 名：*閃光鍚天牛*、*絹花鍚天牛*。
寄 主：核桃、櫟。
分 佈：廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西；越南。

1647. **Acanthocinus aedilis** (Linnaeus) 灰長角天牛 (Gressitt, 1951:519; Hua, 1982:61; Zhang, 1987[ed.] 2:34)
Cerambyx aedilis Linnaeus, 1758:392.
Acanthocinus aedilis, Stephens, 1831:232.
別 名：*長角灰天牛*。
寄 主：紅松、華山松、馬尾松、油松、雲杉。
分 佈：江西、陝西、河南、山東、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、西伯利亞、歐洲。

1648. **Acanthocinus griseus** (Fabricius) 小灰長角天牛 (ASZI, 1986, 1:576; Gressitt, 1951:520; Hua, 1982:61; Li et al., 1981:99; Xiao, 1992:453; Zhang, 1987[ed.] 2:34)
Cerambyx griseus Fabricius, 1792:261.
Acnathocinus griseus, Reitter, 1912:59.
別 名：*灰長角天牛*。
寄 主：紅松、華山松、馬尾松、油松、魚鱗雲杉、雲杉、櫟屬，以紅松受害較烈。
分 佈：福建、江西、貴州、陝西、山東、河南、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1649. **Anaesthetobrium lieuae** (Gressitt) 橘微天牛 (Gressitt, 1951:509; Hua, 1982:63)
Paraphidola lieuae Gressitt, 1942:5
寄 主：柑橘。
分 佈：四川。

1650. **Anaesthetobrium luteipenne** Pic 微天牛 (Gressitt, 1951:509; Hua, 1982:63)

Anaesthetobrium luteipenne Pic, 1923:20.
別 名：*桑小天牛*
寄 主：桑。
分 佈：浙江、江蘇；日本。

1651. **Anoplophora** (s. str.) **beryllina** (Hope) 綠絨星天牛 (Gressitt, 1951:367; Hua, 1982:64; Hun., 1992:495; Yunn., 1987:681)
Monochamus beryllina Hope, 1840:79. (Assam)
=*Monochamus melanostictus* White, 1858:407. (N. India)
=*Melanauster argentifer* Pic, 1902:31. (China)
Anoplophora beryllina, Breun., 1944:289.
寄 主：核桃、板栗、栗、錐櫟、冬瓜木、青杠櫟、櫟屬。
分 佈：臺灣、湖南、湖北、廣東、廣西、雲南；越南(北部)、緬甸、印度(北部)、阿薩姆、錫金、斯里蘭卡。

1652. **Anoplophora** (s. str.) **chinensis** (Fōrster) 星天牛 (ASZL 1986, 1:572; Beijing FC., 1980[ed.]:330-331; Cai et Cai, 1997(4):51; Ceng et He, 1944:41-47; Chang, 1951:55-75; Chang & Hung, 1986:124; Chao, 1982:146; Chen, 1951:8-9; Chen, 1981:43; Chen et Wang, 1987:241-242; Fan, 1995(3):9; Gressitt, 1951:368; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hua, 1982:64; Huang, 1936:1-12; 1936:9-10; 1937; 121-124; Huang, 1990[ed.] 2:232-234; Huang et Gao, 1996:198; Huang et Ho, 1994:271-275; Hun., 1992:495; Jiang, 1938:62-64; Kang, 1994(2):46; Lei et al., 1994(2):36-37; Li, 1999(2):23; Li et al., 1981:99; Lin, 1986[ed.]:322-323; Lin, 1997(4):40-41; Liu, 1941:1-8; 1945:62-101; Liu, 1982[ed.]:290-291; Liu et al., 1994, 11(2):85; Liu et al., 1998, 20(3):97-105; Liu et al., 1999, 21(3):97-106; NZWDI, 1981:1720, 1933; Pingtung, 1986:42; Suzhou CS., 1985:247; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Tao, 1960:44-49; Teng, 1994(1):46; Wang et Chen, 1986:20-21; Wang et Liu, 1994(2):45-46; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu, 1994(1):46; Xiao, :454; Ye, 1993(1):17; Yunn., 1987:681; Zhang, 1987[ed.] 2:35; Zheng, 1982:247; Zheng, 1999(1):43; Zhou, 1993(2):46)
Cerambyx farinosus Houttuyn, 1766:536. (*nec* Linnaeus)
Cerambyx chinensis Förster, 1771:39.
=*Lamia punctator* Fabricius, 1776:230.
=*Cerambys pulchricornis* Voet, 1778:22.
=*Cerambys sinensis* Gmelin, 1790:1863.
Anoplophora (Melenauster) chinensis, Bates, 1888:379.
Anoplophora chinensis, Breun., 1944:285.
Anoplophora (s. str.) *chinensis*, Gressitt, 1951:368.
別 名：*華星天牛、白星天牛、銀星天牛*。
寄 主：雜、柑橘、檸檬、橙、蘋果、梨、李、杏、桃、櫻桃、枇杷、紅花、棕、棗、龍眼、荔枝、楊桃、番石榴、蓮霧、菠蘿蜜、無花果、核桃、栗、桑、油橄欖、紅椿、椒、油桐、法國梧桐、柳、白楊、苦楝、紫苧麻、樹豆、紅椿、洋槐、木荷、楷木、油茶、冬瓜木、柚木、櫟、麻栗、楊、柳、榆、懸鈴木、冬青、烏桕、梧桐、木芙蓉、閩粵石楠、黃梔花、相思樹、細直枝木麻黃、銀樺、柳杉、糖槭。可危害 19 科 29 屬 48 種。
分 佈：全國，臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、山東、河北、甘肅、遼寧、吉林；朝鮮、日本、琉球、緬甸、北美。
天 敵：蠼螋(幼蟲)
Colydiidae 堅甲科
Dastarcus longulus Sharp 花絨堅甲(幼蟲)
寄生蜂(幼蟲)
Ontsira palliatus (Cameron) 斑頭陡盾繭蜂(幼蟲)
Aprostocetus fukutai Miwa et Sonan 嚙小蜂(卵)
Formicids 蟻類(幼蟲,蛹)

1653. **Anoplophora** (s. str.) **davidis** (Fairmaire) 藍斑星天牛 (Gressitt, 1951:369; Hua, 1982:65)
Melanauster davidis Fairmaire, 1886:355. (China)
=*Melanauster zonator*, Gahan, 1894:39. (*nec* Thomson) (Burma)
Anoplophora davidis Breun., 1944:286.
別 名：*星天牛藍斑亞種*。
寄 主：核桃、山楊。
分 佈：臺灣、西藏、雲南、四川、陝西；越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸。

1654. **Anoplophora** (s. str.) **glabripennis** (Motschulsky) 光肩星天牛 (ASZI, 1986, 1:573; Beijing FC., 1980[ed.]:329-330; Chen, 1989:341-349; Chen et al., 1993:83; Gressitt, 1951:369; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:252-253; Hua, 1982:65; Hun., 1992:496; Jiang, 1980:96-97; Li et al., 1981:99; Liu, 1982[ed.]:291-292; Xiao, 1992:455)
Cerosterna glabripennis Motschulsky, 1853:48.
=*Cerosterna laevigator* Thomson, 1857:297.
= *Melanauster angustatus* Pic, 1925:21.
=*Melanauster nankineus* Pic, 1926:2.
Anoplophora (s. str.) *glabripennis*, Gressitt, 1951:369.
別 名：*光肩天牛*，*柳星天牛*。
寄 主：蘋果、梨、李、櫻桃、棗、桑、櫻花、柳、楊、榆、懸鈴木、楓香、苦楝、糖槭、水杉、槭、樺、鉛夫楊、元寶楓、青楊。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：Colydiidae 堅甲科
Dastarcus longulus Sharp 花絨堅甲(幼蟲)
斑啄木鳥

1655. **Anoplophora** (s. str.) **imitatrix** (White) 擬星天牛 (Chao, 1982:146; Gressitt, 1951:370; Hua, 1982:65; Hun., 1992:496)
Cerosterna imitator White, 1858:404.
=*Melanauster pirouletii* Fairmaire, 1889:66.
Anoplophora imitator, Breun., 1944:287.
寄 主：柑橘、板栗、麻栗、冬瓜木。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、江蘇。

1656. **Anoplophora** (s. str.) **leechi** (Gahan) 黑星天牛 (Gressitt, 1951:370; Hua, 1982:65; Hun., 1992:497; Wang, 1987[ed.]:227-229; Xiao, 1992:457; Zhang, 1987[ed.]:2:35)
Melanauster leechi Gahan, 1888:63.
Anoplophora leechi, Gressitt, 1951:370.
寄 主：板栗、楊、柳、櫟、榆、漆樹。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、河北。

1657. **Anoplophora** (s. str.) **lurida** (Pascoe) 灰綠黑星天牛 (Chang & Hung, 1986:118; Gressitt, 1951:370; Hun., 1982:497)
Monohammus lurida Pascoe, 1856:47. (N. China)
Anoplophora lurida, Breuning, 1944:289.

Anoplophora (s. str.) *lurida*, Gressitt, 1951:370.
別 名：*槐星天牛*。
寄 主：板栗、槐樹。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、湖北、甘肅、華北。

1658. **Anoplophora** (s. str.) **macularia** (Thomson) 斑星天牛 (Gressitt, 1951:371; Ho et al., 1995:263-278; Ho et al., 1998:263-278; Ho, 1996:339; Lee et Lo, 1998:105-109; Lo et Lee, 1995:382; 1996:339-340; Nakamura, et al., 1992: 80; Wen, 1987:327-330)
Calloplophora macularia Thomson, 1865:553. (N. China)
Melanauster chinensis var. *macularius*, Bates, 1873:311.
=*Melanauster chinensis*, Matsumura, 1908: no. 704, pl. 53, f. 3.
Anoplophora macularia, Breuning, 1944:286.
寄 主：柑橘類、梨、無花果、印度棗、桑、柳等。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、琉球。

1659. **Anoplophora** (s. str.) **malasiaca** (Thomson) 胸斑星天牛 (Chang & Hung, 1986:118; Hua, 1982:66)
Malasia malasiaca Thomson, 1865:553.
=*Calloplophora macularia* Thomson, 1865:553.
=*Melanauster chinensis* Matusmura,
=*Melanauster chinensis macularia* Thomson,
別 名：*星天牛胸斑亞種*、*斑星天牛*、*星天牛*。
寄 主：柑橘類、梨、蘋果、臺灣蘋果、荔枝、龍眼、番石榴、無花果、桑、柳、楝、樹豆、麻黃、懸鈴木、野桐、木豆、紅檜、构樹、野桐、木瓜、法國梧桐、木麻黃、洋紫荊。
分 佈：臺灣、廣東、華北、東北；朝鮮、日本、琉球、馬來亞。

1660. **Anoplophora** (s. str.) **versteegi** (Ritsema) 灰星天牛 (Gressitt, 1951:372; Gressitt et Rondon, 1970:440; Hua, 1982:66; Yunn., 1987:681)
Monohammus verrsteegi Ritsema, 1881:155. (Sumatra)
=*Monohammus albescens* Pic, 1920:2. (Tonkin)
=*Monochamus albescens* v. *subuniformis* Pic, 1934:34.
Anoplophora versteegi, Breuning, 1943:175.
寄 主：板栗、柑橘類、青杠櫟。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；越南、寮國、馬來西亞、蘇門答臘、緬甸、印度、阿薩姆、錫金。

1661. **Anoplophora vitalisi** (Pic) 藍斑星天牛 (Gressitt, 1951:404; Yunn., 1987:681)
Monochamus vitalisi Pic, 1925:19.
=*Dihammus sericeomicans*, Schwarzer, 1925:59. (*nec* Fairmaire)
=*Dihammus ikedai* Mitono, 1943:581.
Dihammus vitalisi, Breuning, 1944:460.
Anoplophora vitalisi,
寄 主：柑橘、栗、雲南松、高山松、冬瓜木、楝樹。
分 佈：雲南。

1662. **Aphrodisium faldermanii** (Saunders) 黃頸柄天牛 (Gressitt, 1951:201; Yunn., 1987:658)
Callichroma faldermannii Saunders, 1850:111. (N. China)
=*Aromia faldermanni insularis* Gressitt, 1936:90. (Taiwan: Bukai, Hori, Hassenzan, Hinokiyama)
=*Aphrodisium yugaii*, Hirayama, 1940:126. (*nec* Kano) (Musha)
Aphrodisium faldermanii, Gressitt et Rondon, 1970:144.

寄 主：桃。
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、華北、內蒙古；東西伯利亞。

1663. **Aphrodisium gibbicolle** (White) 綠綠柄天牛 (Gressitt, 1951:198; Yunn., 1987:658)
Calichroma gibbicolle White, 1853:160. (N. China)
=*Chelidonium gibbicolle* var. *subgibbicolle* Pic, 1925:17.
=*Chelidonium gibbicolle* var. *rubrofemoralis* Pic, 1932:24.
Aphrodisium gibbicolle, Gressitt et Rondon, 1970:149.
寄 主：柑橘類、板栗、華山松、櫸、青杠、茴香、小油桐。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、江蘇、安徽、華北；寮國、印度。

1664. **Aphrodisium thomsoni** (Pascoe) 湯氏阿姆天牛 (Chang & Hung, 1986:118)
寄 主：板栗、栓皮櫟。
分 佈：臺灣。

1665. **Apriona germari** (Hope) 粒肩天牛 (ASZI, 1986, 1:575; Beijing FC., 1980[ed.]:333-334; Chao, 1982:146; Chang & Hung, 1986:118; Chen et Wang, 1987:45-46; Ding, 1998(2):44; Gao et al., 1987, 5(1,2):46; Gressitt, 1951:409; Hua, 1982:67; Huang, 1990[ed.] 2:69-71; Huang, 1997(4):21; Hun., 1992:498; Li et al., 1981:99; Liu, 1982[ed.]:293-295; Liu, 1995:42-43; NZWDI, 1981:1123, 1719; Suzhou CS., 1985:235-237; Tao, 1980:253; Wang et He, 1994(4):27; Wang et Zhan, 1988:347-350; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu, 1994(1):32; Xiao, 1992:461; Zhang, 1987[ed.] 2:35; Zhao et al., 1994, 20(1):10-11; Zhu, 1994(2):49)
Lamia germari Hope, 1831:28.
=*Apriona rugicollis* Chevrola, 1852:418. (Shanghai)
=*Apriona plicicollis* Motschulsky, 1853:48. (N. China)
Apriona germari, Stebbing, 1903:25.
別 名：*桑天牛、褐天牛、桑幹黑天牛、刺肩天牛、傑氏阿蘭天牛。*
寄 主：桑、柑橘、蘋果、臺灣蘋果、紅花、梨、杏、桃、李、海棠、沙果、櫻桃、枇杷、棗、板栗、山核桃、無花果、雲南松、桑科、榆、柳、刺槐、柞、楮、楓楊、柳、白毛楊、楝、油桐、构樹、朴樹、臺灣赤楊、九芎、樹豆、山黃麻、紫薇。
分 佈：全國南北各地、臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、青海、寧夏、山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、印度、孟加拉。
天 敵：Colydiidae　堅甲科
Dastarcus longulus Sharp　花絨堅甲(幼蟲)
Parecerchysius ceresii Liao et Tachikawa　桑天牛跳小蜂
Aprostocetus fukutai Miwa et Sonan.　長尾嚙小蜂(卵，寄生率在杭州爲 24%，廣東達 40-70%)

1666. **Aristobia approximator** (Thomson) 橘斑簇天牛 (Gressitt et Rondon, 1970:424; Hua, 1982:68; Yunn., 1987:684, 696)
Celosterna approximator Thomson, 1865:552.
=*Aristobia birmanica* Gahan,:40.
Aristobia approximator, Brongniart, 1891:247.
寄 主：荔枝、柑橘、李、柿、石榴、柚木、牛肋巴、錐栗、櫟、臘腸樹、木槿屬、帽蛀木屬、盾蛀木屬、大花紫薇、麻櫟、樟木、石楠。
分 佈：雲南；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度。

1667. **Aristobia hispida** (Saunders) 瘤胸簇天牛 (ASZI, 1986, 1:571; Chao, 1982:147; Chang & Hung, 1986:119; Gressitt, 1951:356; Hua, '982:68; Hua., 1992:498; Li et al., 1981:100; Xiao, 1992:464;)

Cerosterna hispida Saunders, 1863:112. (N. China)

Aristobia hispida, Thomson, 1868:178.

別 名：*瘤胸天牛*。

寄 主：橘類、桃、桑、金合歡、漆樹、油桐、降香、黃檀、南嶺黃檀、海南檀、印度黃檀、紫籐。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、西藏、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、甘肅、陝西、河南、河北、北京；日本、越南(北部)。

1668. **Aristobia horridula** (Hope) 毛簇天牛 (Gressitt, 1951:357; Gressitt et Rondon, 1970:425; Hua, 1982:68)

Lamia horridula Hope, 1831:27.

=*Cerosterna fasciculata* Redtenbacher, 1848:552.

Aristobia horridula, Auriv., 1922:110.

寄 主：柑橘、核桃、雲南松、水馬桑、秧青、柳、牛肋巴、黃檀、鈍葉黃檀。

分 佈：雲南、四川；越南、寮國、緬甸、印度、克什米爾。

1669. **Aristobia testudo** (Voet) 龜背簇天牛 (ASZI, 1986, 1:571; Chao, 1982:147; Chen et al., 1994:57; Gressitt, 1951:357; Han et al., 1994, 16(4):175-182; He et al., 1990, 12(3):123-128; Hua, 1982:68; Li et al., 1981_100; Lin, 1997(4):40-41; Liu et Zhang, 1998, 20(2):75-80; NZWDI, 1981:1981; Xu et al., 1994, 1:35; Yunn., 1987:684)

Cerambyx testudo Voet, 1778:12.

=*Lamia reticulator* Fabricius, 1781:219.

=*Celosterna clathrator* Thomson, 1865:552.

Aristobia testudo, Auriv., 1922:110.

別 名：*龜背天牛*、*荔枝龜背天牛*。

寄 主：荔枝、龍眼、釋迦、李、橄欖、栗、麻櫟、樟木、黎豆、雙翼豆。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、陝西；越南。

1670. **Aromia bungii** (Faldermann) 桃紅頸天牛 (ASZI, 1986, 1:564; Gressitt, 1951:200; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang et Gao, 1996:244; Pang et al., 1980:20; Xiao, 1992:465; Yunn., 1987:656)

Cerambyx bungii Faldermann, 1835:433.

=*Callichroma cyanicornis* Guerin, 1844:222 .

=*Aromia cyanicornis var. ruficollis* Redtenbacher, 1869:149.

Aromia bungii, Lacordaire, 1869:15.

=*Aromia* (s. str.) *cyanicornis* ab. *puncticollis* Plavilstshikov, 1940:204, 670.

寄 主：桃、杏、櫻桃、李、郁李、梅、蘋果、梨、草櫻、清水櫻、柳。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東、陝西、甘肅、山西、河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、蘇聯。

天 敵：*Scleroderma guani* Xiao et Wu 管氏腫腿蜂(幼蟲)

1671. **Aromia moschata** (Linnaeus) 楊紅頸天牛 (Gressitt, 1951:201; Xiao, 1992:466)

Aromia moschata, Saito, 1932:471.

寄 主：旱柳、楊樹、桑、山桃。

分 佈：江西、陝西、甘肅、河南、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、東西伯利亞、中亞細亞。

天 敵：白僵菌、蘇馬、蟻、寄蠅、啄木鳥

1672. **Aromia moschata orientalis** Plavilstshikov 楊紅頸天牛 (Gressitt, 1951:201; Hua, 1982:26)
Aromia moschata, Saito, 1932:471.
=*Aromia moschata* var. *ambrosiaca*, Matsushita, 1933:252.
Aromia moschata var. *orientalis* Plavilstshikov, 1933:12.
=*Aromia moschata ambrosiaca* var. *vetusta* Yankovskii, 1934.
寄 主：山桃、桑、楊、柳類。
分 佈：江西、陝西、甘肅、華北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、東西伯利亞。

1673. **Asias halodendri** (Pallas) 紅緣天牛 (Chang & Hung, 1986:119; Gressitt, 1951:322; Xiao, 1992:468)
Cerambys halodendri Pallas, 1776:724. (Siberia)
=*Cerambys humeralis* Olivier, 1795:38.
=*Cerambys elaeagni* Fischer, 1824: pl. 49, f. 5-6.
=*Purpuricenus* (*Asias*) *heptapotamicus* Semenov, 1926:48. (S. Russia)
=*Purpuricenus pirus* Arakawa, 1932: 18. (S. Manchuria)
Asias halodendri, Plavilstshikov, 1940:593, 764.
別 名：*黑色紅緣天牛*。
寄 主：梨、蘋果、棗、沙棗、酸刺、刺槐、錦雞兒、小葉榆、家榆、歐美楊、旱柳、枸杞、檸條、沙棘。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇、陝西、甘肅、寧夏、河南、山東、山西、河北、內蒙古、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、蘇聯南部、蒙古。

1674. **Astathes episcopalis** Chevrolat 黃荊重突天牛 (Chao, 1982:147; Hua, 1982:68; Hun., 1992:499)
Astathes episcopalis Chevrolat, 1852:418. (China)
別 名：*黃荊眼天牛*。
寄 主：雲南松、油桐、蓖麻、黃荊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、陝西、山西；朝鮮、日本。

1675. **Bacchisa dioica** (Fairmaire) 蘋眼天牛 (Gressitt, 1951:618; Hua, 1982:70; Yunn., 1987:672)
Astathes dioica Fairmaire, 1878:133.
Bacchisa dioica,
寄 主：蘋果、李、櫟。
分 佈：雲南、四川；印度。

1676. **Bacchisa fortunei fortunei** (Thomson) 梨眼天牛 (ASZI, 1986, 1:578; Chang & Hung, 1986:121; Chao, 1982:147; Gressitt, 1951:618; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hua, 1982:70; Huang et Gao, 1996:245; Hun., 1992:500; Li, 1995:27; Li et al., 1981:100; NZWDI, 1981:1722; Pang, et al., 1980:20; Qing, 1987:223; Sun, 1984:369-371; Wu, 1994(1):32; Zhang, 1987[ed.] 2:36; Zhang, 1997(3):41-42; Zhao et al., 1998(4):29)
Plaxomicrus fortunei Thomson, 1857:58. (China)
=*Chreonoma fortunei* ssp. *flavicornis* Kano, 1933:291. (Taiwan: Urai)
Bacchisa fortunei fortunei,
別 名：*梨綠天牛*、*福氏琉璃天牛*。
寄 主：蘋果、梨、梅、杏、桃、李、海棠、山楂、榲桲、石榴等枝條木質部。
分 佈：全國南北果產區，臺灣、福建、江西、湖南、貴州、浙江、安徽、江蘇、山西、山東、陝西、吉林；朝鮮、日本。

1677. **Bacchisa fortunei japonica** Gahan 梅眼天牛 (Gressitt, 1951:619; Hua, 1982:70)
Chreonoma fortunei var. *japonica* Gahan, 1901:68.
寄 主：梅、梨。
分 佈：福建；日本。

1678. **Bacchisa guerryi** (Pic) 黃藍眼天牛 (ASZI, 1986, 1:579; Chen et Wu, 1993:16-17; 1994:285; Hun., 1992:500; Yang et al., 1994(3):9-11; Yunn., 1987:672, 701; Zhang, 1987[ed.] 2:36)
=*Chreonoma nigronotata* Pic, 1912:21.
寄 主：蘋果、花紅、梨、棠梨、海棠、山楂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南。

1679. **Batocera davidis** Deyrolle 橙斑白條天牛 (ASZI, 1986, 1:575; Chang & Hung, 1986:119; Gressitt, 1951:406; Hua, 1982:71; Hun., 1992:500; Li et al., 1981:100; Qian, 1983:133; Xiao, 1992:470:Yunn., 1987:677, 698)
Batocera davidis Deyrolle, 1878:131. (S. China)
=*Batocera henrietta* Kriesche, 1915:138.
=*Batocera davidis* m. *yunnana* Breuning, 1948:14.
=*Batocera davidis* var. *obscura* Gilm. et Dibb, 1948:38.
別 名：*大衛氏白條天牛*。
寄 主：鳳梨、板栗、核桃、蘋果、掌葉蘋婆、油桐、苦楝、櫟、細葉青、冬瓜、木棉、吉貝、西印白塞木。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、陝西、浙江、湖北、河南；越南、寮國。

1680. **Batocera horsfieldi** (Hope) 雲斑白條天牛 (Beijing FC., 1980[ed.]:334-335; Chen et Wang, 1987:198-199; Gressitt, 1951:406; Hua, 1982:71; Huang, 1990[ed.] 2:343-344; Hun., 1992:501; Liu, 1982[ed.]:295-296; NZWDI, 1981:1775; Suzhou CS., 1985:247; Wang, 1987[ed.]:229-231; Wang, 1995:29; Xiao, 1992:472; Zhang, 1987[ed.] 2:36; Zhang, 1998(2):54; 1998(3):15; Zheng, 1982:247; Zhu, 1994(2):49)
Lamia horsfieldi Hope, 1839:42.
Batcera horsfieldi, van de Poll, 1887:227.
=? *Batocera lineolata*, Frivaldsky, 1892:118.
=*Batocera lineolata* var. *kuntzeni* Kriesche, 1915:139.
=*Batocera horsfieldi* var. *kuntzeni* Gilmour et Dibb, 1948:90.
別 名：*雲斑天牛*、*核桃大天牛*、*核桃天牛*。
寄 主：核桃(胡桃)、山核桃、板栗、梨、枇杷、蘋果、柑橘(?)、桑、栗、油橄欖、麻櫟、栓皮櫟、大官楊、響葉楊、梓、滇楊、苦楝、法桐、青楊、歐美楊、柳、榕、榆、女貞、懸鈴木、泡桐、楓楊、烏桕、油茶、油桐、桤木、山毛櫸、木麻黃、桉樹、山麻黃。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、西北；朝鮮、日本、越南、印度東北部。
天 敵：Colydiidae 堅甲科
Dastarcus longulus Sharp 花絨堅甲
核型多角體病毒(NPV)
真菌
蟲花棒束孢菌
Braconidae 繭蜂科
繭蜂(幼蟲)
Encyrtidae 跳小蜂科
Oubius sp.

1681. **Batocera lineolata** Chevrolat 密點白條天牛 (Chao, 1982:147; Chang & Hung, 1986:119, Gressitt, 1951:407; Gressitt et Rondon, 1970:470; Hua, 1982:71; Li et al., 1981:100; Qian, 1983:135;Yunn., 1987:678, *Zhang*, 1987[ed.] 2:36)
Batocera lineolata Chevrolat, 1852:417. (China)
=*Batocera chinensis* Thomson, 1857:170. (N. China)
=*Batocera catenata* Vollenhoven, 1871:215.
=*Batocera flachi* Schwarzer, 1914:280. (China)
=*Batocera hauseri* Schwarzer, 1914:280. (China)
=*Batpcera lineolata* var. *variecollis* Schwarzer, 1925:60.
別 名：*雲斑天牛，雲斑白條天牛，大白條天牛*。
寄 主：桑、板栗、蘋果、沙果、梨、枇杷、臺灣枇杷、胡桃、無花果、油橄欖、楊、柳、茅栗、麻櫟、槲櫟、孢樹、紅櫟、麵櫧、柯樹、日本水青岡、楊類、榕、榆、山黃麻、烏桕、女貞、青桐、泡桐、油桐、柳、檔木、山毛櫸、楓楊。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、山西、河北；朝鮮、日本、寮國。
天 敵：Colydiidae　堅甲科
Dastarcus longulus Sharp　花絨堅甲(幼蟲)

1682. **Batocera parryi** (Hope) 圓八星白條天牛 (Gressitt et Rondon, 1970:470; Hua, 1982:71; Li et al., 1981:100; Qian, 1983:135; Yunn., 1987:677, 697)
Batocera parryi Hope, 1845:77.
別 名：*檬果八星天牛*。
寄 主：檬果。
分 佈：福建、海南、雲南；寮國、緬甸、印度北部。

1683. **Batocera roylei** (Hope) 檬果白條天牛 (Gressitt, 1951:407; Gressitt et Rondon, 1970:470; Hua, 1982:71; Qian, 1983:135; Yunn., 1987:677)
Lamia roylei Hope, 1833:86.
=*Batocera downesi* Hope, 1845:76.
=*Batocera princeps* Redtembacher, :551.
Batocera roylei, Gressitt, 1940:407.
寄 主：檬果。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南；越南、寮國、緬甸、印度、尼泊爾。

1684. **Batocera rubus rubus** (Linnaeus) 黃八星白條天牛 (ASZI, 1986, 1:575; Gressitt, 1951:408; Hua, 1982:71; Luo et Jin, 1997:75; Luo et Li, 1998:85; Qian, 1983:135; Zhang, 1987[ed.] 2:36)
Cerambyx rubus Linnaeus, 1758:390. (India)
=*Lamia stigma* Voet, 1778:15. (Tonkin, China)
=*Lamia octomaculata* Fabricius, 1792:290. (India)
=*Batocera albofasciata* Stebbing, 1914:244.
Batocera rubus, Auriv., 1922:126.
Batocera rubus rubus, Gressitt, 1951:408.
別 名：*榕八星天牛*。
寄 主：檬果、波蘿蜜、梨、枇杷、無花果、桑、榕、柳、木棉、楓楊、重陽木、刺桐、雞骨常山、美洲膠。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、四川、雲南；朝鮮、琉球、越南、寮國、印度、阿薩姆。

1685. **Batocera rubus albofasciata** (De Geer) 無花果天牛 (Chang & Hung, 1986:119; Gressitt, 1951:408)

Cerambyx albofasciata De Geer, 1775:106.
=*Batocera rubus* var. *formosana* Kriesche, 1915:136.
Batocera rubus albofasciata, Gilmour et Dibb, 1948:112.
寄 主：無花果、檬果、印度橡膠樹。
分 佈：臺灣；印度東部。

1686. **Batocera rufomaculata** (De Geer) 赤斑白條天牛 (Gressitt, 1951:408; Hua, 1982:72)

Cerambyx rufomaculata De Geer, 1775:107.
=*Batocera rufomaculata* var. *diana* Nonfried, 1891:276.
Batocera rufomaculata, Gardner, 1927:23.
寄 主：桑、菠蘿蜜、檬果、番瓜樹、黃檀、榕、羊蹄甲、合歡、木棉、构樹。
分 佈：西藏；印度、阿達曼島、斯里蘭卡、馬達加斯加、毛里求斯、東非、西印度群島。

1687. **Blepephaeus succinctor** (Chevrolat) 深斑灰天牛 (Gressitt, 1951:378; Gressitt et Rondon, 1970:453; Hua, 1982:72; Hun., 1992:501; Yunn., 1987: 687)

Monohammus succinctor Chevrolat, 1852:417. (China)
=*Monohammus sublineatus* White, 1858:410. (Inida)
=*Monohammus ofuscatus* White, 1858:411. (Hong Kong)
Blapephaeus succinctor, Pascoe, 1866:250.
=*Coelosterna fleutiauxi* Lameere, 1893:283. (Cochin-China)
=*Neanthes scutellaris* Fairmaire, 1895:179.
=*Blepephaeus humeralis* Pic, 1925:18. (China)
寄 主：柑橘、核桃、桑、油茶、南嶺黃檀、秧青、油桐、小油桐、泡桐、梧桐、野楹樹、相思樹、楝、槐、秧青藤茶、海紅豆、雜木。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；越南、寮國、馬六甲、泰國、印度。

1688. **Casia (Corethrophora) shirupiti** Kano 白紋纓象天牛 (Chang & Hung, 1986:119; Hua, 1982: 73)

Casia shirupiti Kano, 1939:31.
Casia (*Corethrophora*) *shirupiti*, Breuning, 1942:143.
寄 主：薜荔、榕。
分 佈：臺灣(琉球)。

1689. **Cataphrodisium rubripenne** (Hope) 紅翅擬柄天牛 (ASZI, 1986, 1:564; Gressitt, 1951:193; Li et al., 1981:95; Yunn., 1987:658)

Purpuricenus rubripennis Hope, 1843:110. (Assam)
=*Pachyteria latemaculata* var. *magnifica* Pic, 1902:29. (Yunnan ?)
=*Aphrodisium rubripenne* var. *magnifica* Pic, 1911:20.
=*Cataphrodisium rubripenne* ab. *magnifica* Aurivillius, 1912:301.
=*Asiodiphrum nigrofasciatum* Plavilstshikov, 1934:224. (Szechuan)
別 名：*魯妮凱銅天牛*。
寄 主：梨、蘋果、山林果、花紅、棠梨、海棠、枇杷。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、貴州、湖北、山東；印度(阿薩姆)。

1690. **Ceresium sinicum sinicum** White 中華蠟天牛 (ASZI, 11986, 1:560; Gressitt, 1951:156; Li et al., 1981:95; Yunn., 1987:654)

Ceresium sinicum White, 1855:245. (N. China)
Ceresium sinicum ab. *5-maculatulm* Plavilstshikov, 1931:43.
寄 主：柑橘、梨、蘋果、桃、櫻桃、桑、楝、樟、楓楊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河北；日本、泰國。

1691. **Ceresium sinicum ornaticolle** Pic 四斑蜡天牛 (Li et al., 1981:95)
寄 主：柑橘、樟、楝。
分 佈：福建。

1692. **Chelidonium argentatum** (Dalman) 橘光綠天牛 (Gressitt, 1951:197; Gressitt et Rondon, 1970:152; Huang, 1990[ed.] 2:236-238; Huang et Gao, 1996:201; Li et al., 1981:95; Lin, 1997(4):40-41; Yunn., 1987: 657)
Cereambyx argentatum Dalman, 1817:151. (China)
Chelidonium argentatum, Thomson, 1864:176.
寄 主：檸檬、雪柑、蘆柑、椪柑、紅橘、核桃、构樹。
分 佈：福建、江西、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、江蘇；越南、寮國、緬甸、印度。

1693. **Chelidonium gibbicolle** (White) 纖綠橘天牛 (Li et al., 1981:95)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

1694. **Chloropharus annularis** (Fabricius) 竹綠虎天牛 (Li et al., 1981:95)
寄 主：竹、蘋果、楓、柚木、棉、槭。
分 佈：福建。

1695. **Chreonoma dioica** Fabricius 蘋眼天牛 (Huang, 1990[ed.] 2:73)
寄 主：蘋果。
分 佈：四川(西部)。

1696. **Chreonoma fortunei** (Thomson) 梨眼天牛 (Chen et Wang, 1987:46-47; Gressitt, 1951:618; Huang, 1990[ed.] 2:72-73)
Plaxomicrus fortunei Thomson, 1857:58.
寄 主：蘋果、梨、海棠、梅、桃、石榴、山楂等。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇、安徽、陝西、東北；朝鮮、日本。

1697. **Coptops albonotata** (Pic) 柿瘤象天牛 (Gressitt, 1951:430; Hua, 1982:74)
Pachyosa albonotata Pic, 1917:354.
=*Mutatocoptops albosparsa* Pic, 1926:7.
Coptops albonotata, Breuning, 1939:515.
寄 主：柿。
分 佈：雲南、西康、四川；越南。

1698. **Coptops annulipes** Gahan 灰背瘤象天牛 (Gressitt et Rondon, 1970:343; Yunn., 1987:689, 699)
Coptops annulipes Gahan, 1864:54.
寄 主：野核桃。
分 佈：雲南；越南、寮國。

1699. **Coptops japonica** Breuning 綾紋麻斑天牛 (Chang & Hung, 1986:121)
Coptops aedificater Schwarzer, 1925:62.(*nec* Fabricius).
Coptops japonica Breuning, 1936:311.
寄 主：柑橘類、雞血藤、相思樹、榕樹、垂柳。
分 佈：臺灣；日本。

1700. **Coptops lichenea** Pascoe 欖仁瘤象天牛 (Gressitt, 1951:431; Gressitt et Rondon, 1970: 344; Yunn., 1987:689)
Coptops lichenea Pascoe, 1865:118.
=*Mutatocoptops salvazai* Pic, 1925:29.
寄 主：檬果、婆羅雙樹、魚藤屬、橡膠、櫟。
分 佈：雲南；越南、寮國、馬六甲、緬甸。

1701. **Coscinesthes porosa** Bates 柳枝豹天牛 (ASZI, 1986, 1:570; Gressitt, 1951:379; Hua, 1982:74)
Coscinesthes porosa Bates, 1890:247.
=*Monochamus multiperforatus* Pic, 1920:2.
=*Trichocoscinesthes grossefoveata* Breuning, 1957:
寄 主：桑、柳、楊、榿木。
分 佈：江西、雲南、四川、陝西。

1702. **Cyrtoclytus caproides** Bates 柿曲虎天牛 (ASZI, 1986, 1:567; Gressitt, 1951:259)
Clytus caproides Bates, 1873:200.
Cyrtoclytus caproides, Auriv., 1912:373.
寄 主：柿、樺屬、榿木屬植物。
分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

1703. **Cyrtogrammus lateripictus** Gressitt 彎點天牛 (Gressitt, 1951:439; Hua, 1982:75)
Cyrtogrammus lateripictus Gressitt, 1939:67.
寄 主：檬果、菠蘿蜜、桑、大葉榕、細葉榕。
分 佈：廣東。

1704. **Desisa subfasciata** Pascoe 白帶窩天牛 (Gressitt, 1951:479; Hua, 1982:75; Rondon et Breuning, 1970:407; Yunn., 1987:692)
Praonetha subfasciata Pascoe, 1862:348.
Desisa subfasciata, Pascoe, 1865:163.
=*Falsomesosella rufa* Pic, 1936:17.
寄 主：杏、桃、大葉羊蹄甲、粗糠柴。
分 佈：廣東、海南、雲南、湖北；日本、越南、寮國、柬埔寨、印度。

1705. **Desisa variabilis** (Schwarzer) 變異斑鏽天牛 (Chang & Hung, 1986:122; Gressitt, 1951:479)
Mesopenthea variabilis Schwarzer, 1925:67.
Desisa variabilis, Matsushita, 1933:364.
寄 主：柑橘類、烏桕、鐵刀木、榕樹。
分 佈：臺灣。

1706. **Diastocera wallichi** (Hope) 木棉叢角天牛 (Gressitt, 1951:432; Hua, 1982:75; Yunn., 1987:694)
Lamia wallichi Hope, 1831:27.

=*Diastocera wallichii* ab. *disjuncta* Plavilstshikov, 1927:108.
Diastocera wallichi, Beeson et Bhatia, 1939:58.
別 名：*木棉天牛*。
寄 主：桃樹、檬果、華山松、雲南松、木棉、油桐、合歡、多瓜木、櫟、桉、木荷、香椿、柳、楷木。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川；越南、緬甸、印度北部、喜馬拉雅。

1707. **Doliops similis** Miwa et Mitono 細角天牛 (Chang & Hung, 1986:122; Gressitt, 1951:454; Hua, 1982:75)
Aprophata pachyrrhynchoides Miwa et Mitono, 1932:306. (*nec* Heller)
Doliops similis Miwa et Mitono, 1933:373. (n. n. for *pachyrrhynchoides* Miwa et Mitono, 1932)
別 名：*細角麗吉丁天牛*。
寄 主：薜荔、榕樹。
分 佈：臺灣(蘭嶼、琉球)。

1708. **Dystomorphus notatus** Pic 松刺脊天牛 (Gressitt, 1951:386; Hua, 1982:78)
Dystomorphus notatus Pic, 1926:12.
寄 主：華山松。
分 佈：陝西。

1709. **Epepeotes luscus** Fabricius 石紋擬天牛 (Hua, 1982:81)
Epepeotes luscus Fabricius, 1866:
寄 主：菠蘿蜜、橄欖、檬果、可可、刺桑屬、印度膠樹、對葉榕、長果桑。
分 佈：雲南；菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸。

1710. **Epepeotes luscus densemaculatus** Breuning 密點擬鹿天牛 (Gressitt, 1951:362; Hua, 1982:81; Rondon et Breuning, 1970:432; Yunn., 1987:683, 695)
Epepetes luscus densemaculatus Breuning, 1943:223.
別 名：*石紋擬鹿天牛*。
寄 主：菠蘿蜜、檬果屬、山挂牌條(懸鈎子)。
分 佈：雲南、四川；菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸。

1711. **Epepeotes unicinctus** Gahan 黑斑擬鹿天牛 (Gressitt, 1951:362; Hua, 1982:81; Yunn., 1987:682)
Epepeotes uncinatus Gahan, 1888:271.
寄 主：菠蘿蜜、無花果、杜英屬、榕屬、欖仁樹屬、印度膠樹、長果桑、思維樹、魚木屬、雞桑。
分 佈：雲南；越南、寮國、緬甸、印度、錫金、不丹、斯里蘭卡。

1712. **Eutetrapha chrysocloris** Bates 粗綠直脊天牛 (Hua, 11982:82; Hun., 1992:503)
寄 主：油松。
分 佈：湖南、陝西；日本。

1713. **Exocentrus alboguttatus subconjunctus** Gressitt 桑勾天牛 (Gressitt, 1951:527; Hua, 1982:82)
Exocentrus alboguttatus subconjunctus Gressitt, 1940:184. (Hainan)

寄 主：桑、金合歡、野桐。
分 佈：海南。

1714. **Exocentrus lineatus** Bates 橘勾天牛 (Hua,1982:83; Zhang, 1987[ed.] 2:37)
寄 主：柑橘枝條。
分 佈：江西；日本。

1715. **Glenea** (s. str.) **centroguttata** Fairmaire 桑并脊天牛 (Chao, 1982:148; Chang & Gressitt, 1951:574; Hung, 123; Hua, 1982:85)
Glenea centroguttata Fairmaire, 1897:232. (Tibet)
=*Glenea issikii* Mitono, 1934:490. (Taiwan)
別 名：*桑棺天牛，中斑平背天牛，一色黃紋天牛*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、西藏、四川、陝西；日本。

1716. **Glenea** (s. str.) **chujoi** Mitono 四斑并天牛 (Chang & Hung, 1986:123; Gressitt, 1951:575; Hua, 1982:85)
Glenea chujoi Mitono, 1937:149. (Taiwan)
別 名：*十二星並肩天牛*。
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣、廣東。

1717. **Glenea** (s. str.) **licenti** Pic 十二星并天牛 (Gressitt, 1951:576; Hua, 1982:86)
Glenea (Sphenura) *licenti* Pic, 1939:3.
寄 主：核桃。
分 佈：陝西、甘肅。

1718. **Glenea** (s. str.) **pulchra** Aurivillius 麗并脊天牛 (Hua, 1982:87; Rondon et Breuning, 1970:531)
Glenea pulchella Thomson, 1860:58. (*nec* Pascoe)
Glenea pulchra Aurivillius, 1926:111.
Genea (s. str.) *pulchra*, Breuning, 1956:147.
寄 主：翅蘋婆、粗毛刺果藤。
分 佈：臺灣、廣西、雲南、西藏；越南、寮國、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、阿薩姆、錫金。

1719. **Hoplothrix foveatus** Chiang et Li 穴點沃天牛 (Chiang et Li, :97)
Hoplothrix foveatus Chiang et Li, 1984:97.
寄 主：黑松。
分 佈：雲南。

1720. **Imantocera penicillata** (Hope) 榕指角天牛 (Gressitt, 1951:410; Rondon et Breuning, 1970:471; Yunn., 1987:679; Zhao et al., 1997:188)
Lamia penicillata Hope, 1831:17.
=*Imantocera plumosa* Thomson, 1860:102. (*nec* Oliv.)
Imantocera penicillata, Pascoe, 1862:345.
寄 主：榛、鳳梨、板栗、細葉青、櫟樹、冬瓜。
分 佈：雲南；越南、寮國、馬六甲、緬甸、印度北部。

1721. **Lamiomimus gottschei** Kolbe 雙帶粒翅天牛 (Gressitt, 1951:354; Hua, 1982:89; Hun.,

1992:504)
Lamiomimus gottschei Kolbe, 1886:224.
=*Lamia adelpha* Gangl., 1886:137.
寄 主：油松、柳、槲、柞、櫟、楊、椿、槐、枹樹。
分 佈：江西、湖南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、蘇聯。

1722. **Leiops guttatus** Bates 赤松天牛 (Hua, 1982:89)
寄 主：赤松、泡桐。
分 佈：江西；日本。

1723. **Linda annulicornis** Matsushita 輪角黑翅林蘋天牛 (Chang & Hung, 1986:124; Gressitt, 1951:605)
Linda annulicornis Matsushita, 1933:424. (Taiwan)
寄 主：蘋果、梨類。
分 佈：臺灣、華南、華東。

1724. **Linda atricornis** Pic 黑角瘤筒天牛 (Chan, 1982:149; Chen et Wang, 1987:47; Gressitt, 1951:605; Hua, 1982:90; Hun., 1992:505; Li et al., 1981:101; Yunn., 1987:673; Zhang, 1987[ed.] 2:37)
Linda atricornis Pic, 1924:19.
別 名：*黑角筒天牛*。
寄 主：蘋果、桃、梨、梅、李、杏、榲桲、懸鈎子、桑。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、河北、內蒙古、東北。

1725. **Linda femorata** (Chevrolat) 瘤筒天牛 (ASZI, 1986, 1:581; Gressitt, 1951:605; Hua, 1982:90; Hun., 1992: 505; Yunn., 1987:673)
Amphionycha femorta Chevrolat, 1852:418. (China)
Linda femorata, Thomson, 1864:122.
別 名：*瘤胸筒天牛*。
寄 主：蘋果。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西。

1726. **Linda fraterna** (Chevrolat) 頂斑瘤筒天牛 (ASZI, 1986, 1:580; Chao, 1982:149; Chang et al., 1960:193; Chang & Hung, 1986:124; Gressitt, 1951:606; Huang, 1990[ed.] 2:71-72; Hun., 1992:505; Li et al., 1981:101; Lin, 1997(4): 40-41; NZWDI, 1981:1721; Qing, 1987:223; Zhang, 1987[ed.] 2:37)
Amphionycha fraterna Chevrolat, 1852:419. (China)
=*Oberea seminigra* Fairmaire, 1887:134.
Linda fraterna, Gahan, 1894:486.
=*Linda seminigra* var. *subtestacea* Pic, 1906:17.
=*Linda seminigra* var. *luteonotata* Pic, 1907:24.
別 名：*頂斑筒天牛*、*蘋枝天牛*、*蘋枝天牛*。
寄 主：蘋果、桃、梨、杏、沙果、海棠、梅、李、榲桲、懸鈎子類枝梢、野薔薇
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、河北、西北。

1727. **Linda fraterna pratti** Pic 頂斑筒天牛 (Hua, 1982:90; Hun., 1992:505; Yunn., 1987:673)
Linda fraterna pratti Pic, 1902:

別 名：*頂斑瘤筒天牛*。
寄 主：梨、桃、李、蘋果、懸鈎子等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北、河北、東北。

1728. **Linda gracilicornis** Pic 細角瘤筒天牛 (Gressitt, 1951:606; Hua, 1982:90)
Linda gracilicornis Pic, 1907:24.
寄 主：梨。
分 佈：雲南、四川。

1729. **Linda nigroscutata** (Fairmaire) 黑盾瘤筒天牛 (ASZI, 1986, 1:581; Cao, 1981, 8(3):193-196; Gressitt, 1951:607; Hua, 1982: 90; Liu, 1978:6-7; Xiao, 1992:480; Yunn., 1987:673, 703)
Miocris ngroscutatus Fairmaire, 1902:245.
Linda nigroscutata, Beeson et Bhatia, 1939:130.
別 名：*赤瘤筒天牛*。
寄 主：蘋果、紅花(*Malus asiatica* Nakai)、山荊子(*Malus baccata* (Linnaeus))、桃、梨、棠梨、枇杷、海棠、雲南山楂(山林果)(*Crataegus scabrifolia* (Fr.)、板栗、華山松、花椒、柳、油杉、香椿、柳。
分 佈：貴州、雲南、西藏、四川；印度阿薩姆。

1730. **Linda signaticornis** Schwarzer 斑角瘤筒天牛 (Chang & Hung, 1986:124; Gressitt, 1951:607; Hua, 1982:90)
Linda signaticornis Schwarzer, 1925:154. (Taiwan)
別 名：*斑角黑翅林蘋天牛*、*紅胸黑天牛*。
寄 主：梨、枇杷。
分 佈：臺灣。

1731. **Macrochenus assamensis** Breuning 三條鹿天牛 (Hua, 1982:91; Rondon et Breuning, 1970:433)
Macrochenus assamensis Breuning, 1935:61.
寄 主：桑、雲南松。
分 佈：西藏、雲南；寮國、印度。

1732. **Macrochenus guerrini isabellinus** Aurivillius 長頸鹿天牛 (Hua, 1982:91; Rondon et Breuning, 1970:433; Yunn., 1987:683)
Macrochenus isabellinus Aurivillius, 1920:12.
寄 主：無花果、桑、榕樹、构樹。
分 佈：雲南、四川；越南、寮國、泰國、緬甸、印度、錫金。

1734. **Macrochenus tonkinensis inarmata** Gressitt 刺尾鹿天牛 (Gressitt, 1951:360; Hua, 1982:91)
Psacothea inarmata Gressitt, 1940:92.
Psacothea tonkinensis inarmata Gressitt, 1951:360.
Macrochenus tonkiensis inarmata,
寄 主：桑。
分 佈：廣東、海南、廣西。

1733. **Macrochenus tonkinensis tonkinensis** (Aurivillius) 白星鹿天牛 (Gressitt, 1951:360, Hua, 1982:91)
Macrochenus tonkinensis Aurivillius, 1920:12.

別 名：*白星桑天牛*。
寄 主：桑、馬桑。
分 佈：雲南、貴州、湖北；越南。

1735. **Menesia sulphurata sulphurata** (Gebler) 培甘弱脊天牛 (Gressitt, 1951:557; Hua, 1982:92)
Saperda sulphurata Gebler, 1825:52.
Menesia sulphurata, Tamanuki, 1933:83.
別 名：*培甘天牛*。
寄 主：培甘(山核桃屬)。
分 佈：陝西、山東；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞。

1736. **Menesia sulphurata galathea** (Thomson) 愈斑弱脊天牛 (Gressitt, 1951:558; Hua, 1982:92)
Glenea galathea Thomson, 1865:566.
=*Menesia sulphurata* ab. *nigrocincta* Pic, 1915:10.
=*Menesia tokioensis* Kobayashi et Seki, 1935:42.
Menesia sulphurata galathea, Mitono, 1940:204.
寄 主：胡桃屬。
分 佈：吉林；日本、庫頁島、西伯利亞東部。

1737. **Meschthistatus perplexa** Pascoe 桑象天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:37)
寄 主：桑。
分 佈：江西。

1738. **Mesosa** (s. str.) **myops** (Dalman) 四點象天牛 (Chang & Hung, 1986:125; Gressitt, 1951:415; Hua, 1982:93; Xiao, 1992:482)
Lamia myops Dalman 1817:168.
Mesosa myops, Bates, 1888:379.
=*Mesosa japonica* Tomari, 1930:39.
別 名：*黍歐麻斑天牛*。
寄 主：蘋果、梨、櫻、核桃、核桃楸、漆樹、楸、柏、柳、山楊、蒙古櫟、遼東櫟、水曲柳、赤楊、楊；枹、家榆、榔榆、糖槭、櫟樹等多達 15 屬 30 餘種。
分 佈：臺灣、廣東、西康、四川、安徽、陝西、河南、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、北歐。

1739. **Mesosa** (s. str.) **perplexa** Pascoe 桑象天牛 (Chao, 1982:149; Chang & Hung, :125; Gressitt, 1951:416; Hua, :93; Li et al., 1981:101)
Mesosa perplexa Pascoe, 1858:243. (N. China)
=*Saimia alternans* Schwarzer, 1925:62. (Taiwan: Kankau, Kosempo, Pilam)
=*Mimocoptops formosana* Pic, 1925:30. (Taiwan)
Mesosa (s. str.) *perplexa*, Gressitt, 1951:416.
別 名：*雜紋茶斑天牛*、*茶胡麻斑天牛*。
寄 主：柑橘類、桃、桑、烏桕、构樹、白塞木類、相思樹、血藤。
分 佈：臺灣、福建、江西、浙江、遼寧；日本。

1740. **Mesosa stictica** Blanchard 異斑象天牛 (Gressitt, 1951:416; Hua, 1982:93; Yuan, 1987:689)
Mesosa stictica Blanchard, 1871:812.
=*Mesosa oculicollis* Fairmaire, 1878:131.

寄 主：山核桃、核桃、刺槐。
分 佈：西藏、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、陝西、山西。

1741. **Microlenecamptus biocellatus** (Schwarzer) 雙環小粉天牛 (Gressitt, 1951:446; Hua, 1982:94; Hun., 1992:506)
Olenecamptus biocellatus Schwarzer, 1925:63. (Taiwan: Kankau)
=*Olenecamptus virescens* Savio, 1929:8. (China)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、安徽。

1742. **Monochamus** (s. str.) **alternatus** Hope 松墨天牛 (ASZI, 1986, 1:573; Beijing FC., 1980[ed.]:335-336; Chao, 1982:150; Chang & Hung, 1986:125; Gressitt, 1951:393; Hua, 1982:96; Hun., 1992:507; Li et al., 1981:101; Li et al., 1986:169-170; Liu, 1982[ed.]:288-289; Rondon et Breuning, 1970:461; Song et al., 1990, (6):9-13; Xiao, 1992:483; Yunn., 1987: 685; Zhang, 1987[ed.] 2:38; Zhang et al., 1992, (5)4:478-482; Zhang et al., 1995:21-26; Zhao et al., 1997:188)
Monochamus alternatus Hope, 1842:111 (China)
=*Monochamus tesserula* White, 1858:408. (Hong Kong)
別 名：*松天牛，松褐天牛，松斑長角天牛*。
寄 主：蘋果、花紅、榛、華山松、紅松、雲南松、思茅松、馬尾松、日本赤松、雪松、松屬、落葉松、柳杉、冷杉、雲杉、檜、刺柏、扁柏類、櫟、雞眼藤。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、上海、湖北、山東、陝西、河南、河北；朝鮮、日本、越南、寮國；加拿大、美國、墨西哥等。
傳播媒介：*Bursaphelenhus xilophilus* 松材線蟲
天 敵：蜘蛛
Colydiidae 堅甲科
Dastarcys longlus Sherp 花絨堅甲
Beayverua sp. 白僵菌
Nematoda 線蟲
Ontsira palliatus (Cameron) 斑頭陡盾繭蜂(幼蟲)
Sckeriderna guani Xiao et Wu 管氏腫腿蜂
鳥

1743. **Monochamus fasciatus** Betes 紅角墨天牛 (Hua, 1982:98, Zhang, 1987[ed.] 2:38)
寄 主：松樹。
分 佈：江西；日本。

1744. **Monochamus** (s. str.) **galloprovincialis pistor** (Germer) 樟子松墨天牛 (Gressitt, 1951:394; Hua, 1982:97)
Lamia pistor Germar, 1818:242.
Monochamus galloprovincialis var. *pistor*, Gangl., 1884:83.
=*Monochamus sibiricus* Pic, 1908:5.
寄 主：樟子松。
分 佈：東北；庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1745. **Monochamus (Tibetobia) guerryi** Pic 藍墨天牛 (Gressitt, 1951:392; Hua, 1982:97; Hun., 1992: 508; Yunn., 1987:685)
Monochamus guerryi Pic, 1903:121.

寄 主：板栗、蘋果、思茅松、櫟屬、錐栗、栲、青岡、榿木。
分 佈：湖南、湖北、廣東、廣西、雲南、貴州。

1746. **Monochamus (s. str.) impluviatus** Motschulsky 密白點墨天牛 (Gressitt, 1951:394; Hua, 1982:97)
Monochammus impluviatus Motschulsky, 1859:571.
寄 主：針葉松。
分 佈：陝西、內蒙古、黑龍江；朝鮮、庫頁島、西伯利亞東部。

1747. **Monochamus (Tibetobia) millegranus** Bates 綠墨天牛 (Gressitt, 1951:392; Hua, 1982: 97; Yunn., 1987:685)
Monochammus millegranus Bates, 1891:80.
=*Tibetobia szechenyana* Frivaldsky,1892:119.
=*Monochammus touzalini* Pic, 1920:198.
Monochamus (Tibetobia) millegranus, Gressitt, 1951:392.
寄 主：板栗、櫟。
分 佈：西藏、雲南、四川。

1748, **Monochamus subfasciatus** Bates 麗角墨天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:38)
寄 主：松樹。
分 佈：江西。

1749. **Monochamus (s. str.) sutor** (Linnaeus) 雲杉小墨天牛 (ASZI, 1986, 1:574; Beijing FC., 1980[ed.]:337; Gressitt, 1951:395; Xiao, 1992:486)
Cerambyx sutor Linnaeus, 1758:392.
Monochamus sutor, Jacobson, 1911: pl. 70, f. 13.
=*Monochammus sutor var. pellio*, Matsumura, 1911:140.
Monochamus (s. str.) *sutor*, Gressitt, 1951:395.
寄 主：紅松、歐洲赤松、落葉松、雲杉、冷杉。
分 佈：青海、山東、河北、內蒙古、東北；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、中亞、西歐。
天 敵：大蟻(Formicidae)蟻科
寄生蜂
啄木鳥

1750. **Monochamus (s. str.) talianus** Pic 斑腿墨天牛 (Gressitt, 1951:395; Hua,1982:98)
Monochamus talianus Pic, 1912:20.
寄 主：華山松。
分 佈：西藏、雲南。

1751. **Monochamus (s. str.) urussovi** (Fisher) 雲杉大墨天牛 (ASZI, 1986, 1:573; Beijing FC., 1980[ed.]:336-337; Gressitt, 1951: 396; Hua, 1982:98; Liu, 1982[ed.]:289-290; Xiao, 1992:487)
Cerambyx urussovi Fisher, 1806:12.
=*Monochammus quadrimaculatus* Motschulsky, 1845:86.
=*Monochamus sartor*, Okamoto, 1927:79. (*nec* Fabricius)
=*Monochamus rosenmüllelri*, Plavilstshikov, 1930:55. (*nec* Cederh.)
=*Monochamus sartor* var. *quadrimaculatus*, Matsumura, 1931:260.
Monochamus (s. str.) *urussovii*, Gressitt, 1951:396.
別 名：*雲杉大黑天牛*。
寄 主：雲杉、紅松、興安落葉松、長白落葉松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉、臭冷杉、白樺。

分 佈：江蘇、陝西、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、蒙古、歐洲北部。

1752. **Morimospasma granulatum** Chiang 細粒巨瘤天牛 (Chiang, 1981:80; Hua, 1982:98)
Morimospasma granulatum Chiang, 1981:80.
寄 主：華山松。
分 佈：陝西。

1753. **Morimospasma paradoxum** Ganglbauer 松巨瘤天牛 (Gressitt, 1951:348; Hua, 1982:98)
Morimospasma paradoxum Ganglbauer, 1889:80.
=*Trachystola difformis* Pic, 1934:12.
寄 主：華山松、油松、遼東櫟。
分 佈：四川、陝西、甘肅。

1754. **Niphona (s. str.) hookeri** Gahan 三脊吉丁天牛 (Gressitt, 1951:456; Hua, 1982:100; Hun., 1992:510; Rondon et Breuning, 1970:383; Yunn., 1987:693)
Niphona hookeri Gahan, 1900:351.
別 名：*霍克竹天牛*。
寄 主：柑橘、竹。
分 佈：湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏；寮國、錫金、阿達曼島。

1755. **Nupserha marginella** (Bates) 綠翅脊筒天牛 (Chang, 1963:218; Chang & Hung, 1986:126; Gressitt, 1951:584; Hua, 1982:101; Hun., 1992:511; Li et al., 1981:101)
Oberea marginella Bates, 1873:390.
=*Nupserha (?) japonica* Kraatz, 1879:95.
Nupserha marginella, Gressitt, 1937:325.
別 名：*黑尾短蘋天牛*、*綠翅蘋天牛*。
寄 主：蘋果、臺灣蘋果、梨。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇、山東、陝西、東北；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1756. **Oberea formosana** Pic 臺灣筒天牛 (Chang, 1963:219; Chang & Hung, 1986:126; Chao, 1982:150; Gressitt, 1951: 595; Hua, 1982:103; Li et al., 1981:101; Rondon et Breuning, 1970:568)
Oberea formosana Pic, 1911:20. (Taiwan)
=*Oberea holoxantha* Plavilstshikov, 1916:80. (*nec* Fairmaire)
Oberea posticata, Kano, 1928:126. (*nec* Gahan) (Chikuto)
別 名：*長角細蘋天牛*。
寄 主：蘋果、臺灣蘋果、梨、櫻桃、櫻、黃波羅、川黃、樟。
分 佈：臺灣、臺灣、海南、華南；朝鮮、婆羅洲、越南、緬甸、錫金。

1757. **Oberea fuscipennis** (Chevrolat) 暗翅筒天牛 (Chang & Hung, 1986:126; Gressitt, 1951:595; Hua, 1982:103; Huang, 1990:349; Rondon et Breuning, 1970:570)
Isosceles fuscipennis Chevrolat, 1852:419. (China)
=*Oberea fulveola* Bates, 1873:390. (Japan)
=*Oberea holoxanthus* Fairmaire, 1888:
=*Oberea sinensis* Pic, 1902:
=*Oberea theryi* Pic, 1902:
=*Oberea diversipes* Pic, 1919:
=*Oberea rufotestacea* Pic, 1923:11.

=*Oberea pieli* Pic, 1924:
Oberea fuscipennis, Schwarzer, 1925:513.
=*Oberea infratestacea* Pic, 1936:
=*Oberea rosi* Gressitt, 1940:214, 218.
=*Oberea cephalotes* Breuning, 1946:
=*Oberea fuscipennis* v. *rufotestacea*, Breuning, 1960-1962:178.
別 名：*桑黃細蘋天牛*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、西藏、四川、浙江、江蘇、河北；朝鮮、日本、越南、寮國。

1758. **Oberea japonica** (Thunberg) 日本筒天牛 (ASZI, 1986, 1:581; Chang & Hung, 1986:126; Gressitt, 1951:597; Hua, 1982:104; Li et al., 1981:101; Zhang, 1987[ed.] 2:38)
Saperda japonica Thunberg, 1787:57.
Oberea japonica, Kano, 1928:125.
別 名：*日本細蘋天牛*。
寄 主：桃、梅、李、杏、櫻桃、梨、蘋果、臺灣蘋果、榅桲、桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、河南、山東、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

1759. **Oberea nigriventris** Bates 黑腹筒天牛 (Chao, 1982:151; Gressitt, 1951:598; Hua, 1982:104; Hun., 1992:512; Li et al., 1981:101; Rondon et Breuning, 1970:564; Zhang, 1987[ed.] 2:39)
Oberea nigriventris Bates, 1873:390. (Japan)
=*Oberea langana* Pic, 1902:35.
=*Oberea nigriventris* ab. *angustatissiima* Pic, 1908:
=*Oberea nigriventris angustissima* Pic, 1908:
=*Oberea nonfriedi horiensis* Matsushita, 1931:47.
=*Oberea nigriventris* m. *langana*, Breunig, 1960-1962:94.
寄 主：沙梨。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、內蒙古、遼寧；日本、越南、寮國、馬來亞、緬甸。

1760. **Oberea oculata** (Linnaeus) 灰翅筒天牛 (Gressitt, 1951:599; Xiao, 1992:492)
Cerambyx oculatus Linnaeus, 1758:394.
Oberea oculata, Mulsant, 1839:194.
寄 主：蘋果、桃、梨、杏、柳、楊、刺槐、樺。
分 佈：陝西、山東、內蒙古、東北。

1761. **Olenecamptus albolineatus** Pic 斷條粉天牛 (Yunn., 1987:698)
寄 主：板栗、雲南松。
分 佈：雲南。

1762. **Olenecamptus bilobus** (Fabricius) 六星粉天牛 (Chang & Hung, 1986:126; Hua, 1982:106; Rondon et Breuning, 1970:479; Yunn., 1987:679)
Saperda bilobus Fabricius, 1801:324. (N. Australia)
Olenecamptus bilobus, Pascoe, 1866:3.
=*Olenecamptus lacteoguttatus* Fairmaire, 1881:351.
別 名：*白星細胸天牛*。
寄 主：桑、菠蘿蜜、檬果、羊蹄甲、印度橡膠樹、榕。
分 佈：臺灣、廣東、香港、海南、雲南、四川；日本、琉球、菲律賓、婆羅洲、越南、寮國、馬來亞、印尼、泰國、緬甸、印度、巴基斯

坦、斯里蘭卡、摩鹿加、西里伯、澳洲北部、新幾內亞、毛里求斯、塞舌耳、馬達加斯加。

1763. **Olenecamptus clarus** Pascoe 黑點粉天牛 (Gressitt, 1951:443; Hua, 1982:107; Hua, 1992:513; Li et al., 1981:102; Zhang, 1987[ed.] 2:39)
Olenecamptus clarus Pascoe, 1895:44.
寄 主：桑、桃。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

1764. **Olenecamptus clarus suboliteratus** Pic 斜翅黑點粉天牛 (Gressitt, 1951:444; Hua, :107)
Olenecamptus clarus subobliteratus Pic, 1923:19.
寄 主：桑、榲桲。
分 佈：四川、江西、浙江、江蘇、陝西。

1765. **Olenecamptus cretaceus** Bates 白背粉天牛 (Chang & Hung, :126; Gressitt, 1951:444; Hua, :107)
Olenecamptus cretaceus Bates, 1873:314. (Japan)
別 名：*三缺白背粉天牛*。
寄 主：桑、櫸。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇；朝鮮、日本、蘇聯。

1766. **Olenecamptus octopustulatus chinensis** (Motschulsky) 八星粉天牛 (Chao, 1982:151; Gressitt, 1951:445; Hua, 1982:107; Li et al., 1981:102)
Ibidimorphum octopustulatum Motschulsky, 1860:152.
Olenecamptus octopustulatus, Blessig, 1873:194.
=*Olenecamptus optatus*, Kikuchi, 1933:51. (*nec* Pascoe)
寄 主：核桃、櫟屬、楓楊、柳。
分 佈：福建、江西、貴州、陝西、內蒙古、遼寧；日本、庫頁島、西伯利亞、蒙古。

1767. **Olenecamptus octopustulatus formosana** Pic 臺灣白天牛 (Chang & Hung, 1986:127; Gressitt, 1951:445)
Olenecamptus formosana Pic, 1914:19. (Taiwan)
=*Olenecamptus decemmaculatus* Pic, 1916:13. (Hanoi, Tonkin)
Olenecamptus octopustulatus formosanus, Dillon et Dillon, 1948:204.
寄 主：野胡桃、槭、茶。
分 佈：臺灣；日本、越南。

1768. **Olenocamptus siamensis** Breuning 大星粉天牛 (Rondon et Breuning, 1970:479; Yunn., 1987:678, 698)
Olenecamptus siamensis Breuning, 1936:319.
寄 主：檬果。
分 佈：雲南；越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸。

1769. **Olenecamptus suboliteratus** Pic 四星粉天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:39)
寄 主：桑。
分 佈：江西。

1770. **Olenecamptus taiwanus** Dillon et Dillon 臺灣六星粉天牛 (Chang & Hung, 1986:126; Hua, 1982:106)
Olenecamptus tawanus Dillon et Dillon, 1948:229.
別 名：*臺灣六白星細胸天牛*。
寄 主：桑、檬果、菠蘿蜜、面包樹、羊蹄甲、榕。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；日本。

1787. **Palimna annulata** (Olivier) 網斑地衣天牛 (Gressitt, 1951:434; Hua, 1982:108; Rondon et Breuning, 1970:473; Yunn., 1987:688)
Cerambyx annulatus Olivier, 1792:465.
=*Lamia nodulosa* Schoenh., 1817:395.
=*Golsinda tesselata* Pascoe, 1857:49.
Palimna annulata, Breuning, 1938:326.
=*Palimna annulata tessellata*, Gressitt, 1951:434.
寄 主：檬果、厚皮樹、肉托果、酸棗。
分 佈：廣東、海南、雲南；越南、寮國、婆羅洲、爪哇、蘇門答臘、泰國、印度、東印度群島。

1772. **Palimna palimnoides** (Schwarzer) 帕斯帕娜天牛 (Chao, 1982:151; Chang & Hung, 1986:127; Gressitt, 1951:436; Rondon et Breuning, 1970:473)
Apalimna palimnoides Schwarzer, 1925:62. (Taiwan: Fuhosho, Hozan, Kosampo, Taihorin)
Palimna palimnoides, Breuning, 1938:327.
=*Palimna palimnoides palimnoides* Gressitt, 1951:436.
寄 主：板栗。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、華南；寮國、印度北部、錫金、不丹。

1773. **Palimna yunnana** Breuning 雲南地衣天牛 (Gressitt, 1951: Hua, 1982:108; Rondon et Breuning, 1970:474)
Palimna yunnana Breuning, 1935:153.
寄 主：落葉松。
分 佈：雲南；寮國、緬甸、印度、錫金。

1774. **Paraglenea fortunei** (Saunders) 苧麻雙脊天牛 (Chao, 1982:151; Gressitt, 1951:568; Hun., 1982:513; Li et al., 1981:102)
Glenea fortunei Saunders, 1853:112. (N. China)
=*Glenea chloromelas* Thomson, 1879:21. (China)
=*Paraglenea swinhoei*, Heyden, 1886:288.
=*Paraglenea fortunei* ab. *soluta* Ganglbauer, 1887:22.
=*Glenea fortunei* abb. *notatipennis*, *pubescens* Pic, 1914:7.
=*Glenea fortunei* abb. *bisbinotata*, *fasciata*, *innotata* Pic, 1915:
=*Glenea fortunei* var. *savioi* Pic, 1923:21.
=*Paraglenea fortunei* ssp. *szetchwana* Heller, 1926:48.
=*Paraglenea fortunei* var. *innotaticollis* Pic. 1936:17.
別 名：*苧麻天牛*。
寄 主：桑、林檎、苧麻、木槿。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、安徽、江蘇、上海、陝西、河南、河北、北京、吉林；日本、越南。

1775. **Paraglenea fortunei fasciata** Pic 苧麻雙脊天牛 (ASZI, 1986, 1:579; Chao, 1982:151; Gressitt, 1951:568; Hua, 1982:108)
Glenea fortunei ab. *fasciata* Pic, 1915:
別 名：*苧麻天牛*。

寄 主：苧麻、桑、木槿。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、河北；日本。

1776. **Paraleprodera carolina** (Fairmaire) 蠟斑齒脛天牛 (Chao, 1982:151; Gressitt, 1951: 362; Hua, 1982:189)
Archidice carolina Fairmaire, 1900:641.
Paraleprodera carolina, Breuning, 1935:254.
寄 主：山挂牌條(懸鈎子屬)。
分 佈：福建、雲南、四川、貴州。

1777. **Paraleprodera diophthalma** (Pascoe) 眼斑齒脛天牛 (Chao, 1982:151; Gressitt, 1951: 363; Hua, 1982:109; Hun., 1992:514; Yunn., 1987:682; Zhang, 1987[ed.] 2:39)
Morimus diophthalma Pascoe, 1856:49.
=*Leprodera bioculata* Fairmaire, 1900:641.
Paraleprodera diophthalma, Breuning, 1935:254.
寄 主：獼猴桃、板栗、虎榛子、四照花、竹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、河北、

1778. **Paranamera ankangensis** Chiang 黃斑凹唇天牛 (Chiang, 1981:82; Hua, 1982:109)
Paranamera ankangensis Chiang, 1981:82.
寄 主：桃。
分 佈：陝西。

1779. **Pharsalia (Cycos) subgemmata** (Thomson) 橄欖梯天牛 (Gressitt, 1951:376; Hua, 1982: 110; Rondon et Breuning, 1970:449; Yunn., 1987:679, 695)
Monochamus subgemmatus Thomson, 1857:294.
=*Monochamus georgius* White, 1858:407.
Cycos subgemmatus, Lacordaire, 1869:346.
=*Pelargoderus apicalis*, Gressitt, 1940:94. (*nec* Gahan)
Pharsalia (*Cycos*) *subgemmatus*, Breuning, 1943:329.
寄 主：橄欖屬、山樣子屬、欖仁樹屬。
分 佈：廣東、海南、雲南；寮國、柬埔寨、印尼、泰國、緬甸、印度。

1780. **Plaxomicrus ellepticus** Thomson 廣翅天牛 (Gressitt, 1951:615; Hua, 1982:112)
Plaxomicrus ellepticus Thomson, 1857:58.
別 名：*廣翅眼天牛*。
寄 主：核桃。
分 佈：雲南、四川、江蘇、湖北、陝西；越南。

1781. **Pogonocherus** (s. str.) **fasciculatus** De Geer 松梢芒天牛 (Hua, 1982:112)
Pogonocherus (s. str.) *fasciculatus* De Geer, 1775:
寄 主：松。
分 佈：黑龍江；高加索、歐洲。

1782. **Psacothea hilaris** (Pascoe) 黃星天牛 (ASZI, 1986, 1:571; Chao, 1982:152; Chang & Hung, 1986:128; Gao et al., 1987, 5(1,2):46; Gressitt, 1951:359; Hua, 1982:113; Hun., 1992:516; Li et al., 1981:102; Liu, 1995:44-45; NZWDI, 1981:1125; Suzhou CS., 1985:239-241; Tao, 1980:255; Zhang, 1987[ed.] 2:39; Zheng, 1982:239-241)
Monohammus hilalris Pascoe, 1857:103. (N. China)

=*Diochares flavoguttatus* Fairmarier, 1887:133.
Psacothea hilaris, Gahan, 1888:400
=*Psacothea hilaris* ssp. *albomaculata* Kano, 1933:278.
Psacothea hilaris hilaris, Gressitt, 1951:359.
別 名：*黃星桑天牛，黃星長鬚天牛，黃斑天牛，黃星長角天牛，長角天牛，黃點天牛。*
寄 主：桑、無花果、枇杷、蘋果、柑橘、柳、面包樹、馬桑、油桐。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、河北、東北；朝鮮、日本、琉球、越南。

1783. **Pseudanaesthetis langana** Pic 偽昏天牛 (Gressitt, 1951:505; Hua, 1982:114; Hun., 1992:517)
Pseudanaesthetis langana Pic, 1922:15.
=*Eupogonius rufipennis*, Gressitt, 1937:610.
寄 主：蘋果、桃、胡桃、檳榔青、南酸棗屬。
分 佈：江西、湖南、廣東、海南、四川、貴州、浙江、陝西；越南。

1784. **Pseudocalamobius japonicus** (Bates) 日本偽馬天牛 (Chao, 1982:152; Chang & Gressitt, 1951:543; Hung, :128)
Calamobius japonicus Bates, 1873:383.
Pseudocalamobius japonicus, Kraatz, 1879:116.
寄 主：懸鉤子類。
分 佈：臺灣、福建、浙江；日本。

1785. **Pterolophia (Hylobrotus) annulata** (Chevrolat) 斑角坡天牛 (Chao, 1982:152; Gressitt, 1951:465; Hua, 1982:116; Hun., 1992:517; Li et al., 1981:102; Luo et al., 1996:57)
Cpptops annulata Chevrolat, 1845:99. (Macao)
=*Praonetha bowringi* Pascoe, 1865:170. (Hong Kong)
Pterolophia annulata, Gahan, 1895:69.
=*Pterolophia scutellata* Schwarzer, 1925:66. (Kosempo, Alikang, Kankau)
=*Pterolophia annulicornis* Pic, 1925:138. (China)
=*Pterolophia lacosa* Pic, 1926:3. (Tonkin)
=*Pterolophia lunigera* ssp. *formosana* Hayashi, 1960:28. (Japan)
別 名：*坡翅桑天牛。*
寄 主：檬果(花枝)、桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、澳門、海南、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇；朝鮮、日本、越南、緬甸。

1786. **Pterolophia jugosa** (Bates) (Chang & Hung, 1986:128)
寄 主：柑橘類、桑。
分 佈：臺灣；朝鮮、日本。

1787. **Pterolophia kaleea latenotata** (Pic) 多點坡天牛 (Gressitt, 1951:469; Hua, 1982:118)
Sybra latenottata Pic, 1927:153.
Pterolophia kaleea latenotata, Gressitt, 1951:469.
寄 主：桑。
分 佈：江蘇、山東。

1788. **Pterolophia** (s. str.) **persimilis** Gahan 金合歡坡天牛 (Gressitt, 1951:471; Hua, 1982:119; Rondon et Breuning, 1970:393)

Pterolophia persimilis Gahan, 1894:71.
=*Pterolophia subexternefasciata* Pic, 1925:29.
Pterolophia (s. str.) *persimilis*, Breuning, 1965:240.
寄 主：李屬、梨、金合歡、木藍屬、厚皮樹屬。
分 佈：廣東香港；越南、寮國、緬甸、印度北部、阿薩姆。

1789. **Pterolophia rigida** (Bates) 柳坡天牛 (Gressitt, 1951:472; Hua, 1982:119; Zhang, 1987[ed.] 2:40)
Praonetha rigida Bates, 1873:316.
Pterolophia rigida, Okamoto, 1927:82.
別 名：*坡翅柳天牛*。
寄 主：柿、桑、柳、榆、合歡、漆樹。
分 佈：江西、寧夏、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

1790. **Pterolophia zonata** (Bates) 黃帶坡天牛 (Chang & Hung, 1986:129; Gressitt, 1951:476; Hua, 1982:120)
Praonetha zonata Bates, 1873:315.
Pterolophia zonata, Gyotoku, 1938:542.
寄 主：桑、李、梨、柳、榕、合歡、杉、櫸。
分 佈：臺灣；日本。

1791. **Ropica subnotata** Pic 桑縫角天牛 (Gressitt, 1951:492; Hua, 1982:122; Li et al., 1981:102)
Ropica posticalis Pascoe, 1858: pl. 26, f.4. (figure only, not description)
Ropica subnotata Pic, 1925:138.
別 名：*縫角天牛*。
寄 主：桑。
分 佈：福建、廣東、浙江、江蘇、湖北、河南、山東。

1792. **Stenostola basisuturalis** Gressitt 黑斑修天牛 (Gressitt, 1951:609; Hua, 1982:125)
Stenostola basisuturalis Gressitt, 1935:573.
寄 主：核桃枝。
分 佈：四川、陝西。

1793. **Sybra** (s. str.) **punctatostriata** Bate 棉散天牛 (Chao, 1982:153; Gressitt, 1951:501; Hua, 1982:127; Li et al., 1981:103)
Sybra punctatostriata Bate, 1866:351. (Taiwan)
=*Sybra gossipi* Matsumura, 1912:219.
=*Sybra ordinata*, Miwa, 1931:210.
別 名：*棉蒴天牛*。
寄 主：棉、柑橘(?)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南；日本、琉球。

1794. **Xenolea asiatica** (Pic) 桑枝小天牛 (Gressitt, 1951:447; Hua, 1982:129; Rondon et Breuning, 1970:481)
Aeschopalea asiatica Pic, 1925:16. (Tonkin)
=*Xenolea tomentosa* var. *asiatica* (Pic 1925).
Xenolea asiatica, Gressitt, 1938:158.
寄 主：桑、柘。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、四川；日本、越南、寮國、印度。

Chrysomeloidea 葉甲總科

Crioceridae 負泥蟲科

1795. **Lilioceris egena** (Weise) 纖負泥蟲 (Chao, 1982:157; Gressitt et Kimoto,:48; Hun., 1992:527)
Crioceris egena Weise, 1922:41.
Lilioceris egena, Heinze, 1943:102.
寄 主：懸鈎子、黃獨、薔薇。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、湖北。

1796. **Lilioceris quadripustulata** (Fabricius) 四斑負泥蟲 (Gressitt et Kimoto, :55; Yunn., 1987:713)
Crioceris 4-pustulata Fabricius, 1787:88.
Crioceris ququadripustulata, Lacordire, 1845:558.
Lilioceris quadripustulata, Medvedev, 1958:108.
寄 主：番木瓜。
分 佈：雲南、四川；越南、寮國、印尼、泰國、緬甸。

1797. **Lilioceris ruficollis** (Baly) 紅頸負泥蟲 (Luo et al., 1996:58)
寄 主：檬果(花枝)。
分 佈：海南。

Alticinae 跳甲亞科

1798. **Altica fragariae** Nakane 蛇莓跳甲 (Hun., 1992:551)
寄 主：蛇莓、草莓、水楊梅等
分 佈：貴州、湖南、江蘇、北京；日本。

1799. **Aphthona howenchuni howenchuni** (Chen) 隆翅側刺跳甲 (Gressitt et Kimoto, :868; Hun., 1992:546)
Aphthonaltica howenchuni Chen, 1934:63.
Aphthona howenchuni, Heikertinger, 1948:143.
寄 主：懸鈎子。
分 佈：湖南、四川、貴州。

1800. **Argopus nigrifrons** (Chen) 黑額凹唇跳甲 (ASZL, 1986, 1:623; Chao, 1982:172; Gressitt et Kimoto, :819; Hun., 1992:541)
Argopus nigrifrons Chen, 1933:237.
寄 主：柑橘、花椒。
分 佈：廣東、福建、湖南、浙江、湖北。

1801. **Argopus nigritarsis** (Gebler) 凹唇跳甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:53)
寄 主：橘梗、鐵線蓮。
分 佈：江西。

1802. **Chaetocnema discreta discreta** (Baly) 銅色脛鬚跳甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:53)
寄 主：蛇莓、寒莓、茅莓、日本牛膝、大豆、纖梗蓼、大圓茄、蝦鉗菜。
分 佈：江西。

1803. **Clitea fulva** Chen 褐黃葉甲 (Huang, 1990[ed.] 2:223; Huang et Gao, 1996:208)
寄 主：柑橘(嫩葉、嫩部)。
分 佈：福建。

1804. **Clitea metallica** Chen 惡性橘潛跳甲 (ASZI, 1986, 1:621; Ai, 1998(4):24; Chao, 1982:173; Gressitt et Kimoto, 1963:790; Huang, 1990[ed.] 2:223-226; Huang et Gao, 1996:206; Liu, 1960:96-97; NZWDH, 1981:1738; Tang, 1995(2):20; Yunn., 1987:738; Zhang, 1987[ed.] 2:53; Zhu, 1998, 15(2):32)
Clitea metallica Chen, 1933:383.
別 名：*惡性橘嚙跳甲，柑橘惡性葉甲，橘潛葉甲，橘潛葉蟲*。
寄 主：柑橘屬植物。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川；越南。
天 敵：霉菌(蛹)、蠼螋、獵蝽、瓢蟲、蟻

1805. **Hemipyxis lusca** (Fabricius) 斑翅溝脛跳甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:843; Hun., 1992:543)
Crioceris lusca Fabricius, 1801:456.
Hemipyxis lusca, Gressitt et Kimoto, 1963:843.
寄 主：核桃。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江；越南、印尼、緬甸。

1806. **Hespera excavata** Chen & Wang 凹窩絲跳甲 (Chen & Wang, 1986:284, 292)
Hespera excavata Chen & Wang, 1986:284, 292.
寄 主：山桃。
分 佈：四川。

1807. **Hespera sericea** Weise 裸頂絲跳甲 (ASZI, 1986, 1:622; Gressitt et Kimoto, 1963:808; Hun., 1992:545)
Hespera sericea Weise, 1889:639.
寄 主：桃、蝶形花科木藍屬、豆科、薔薇科等植物。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、西康、西藏、四川、貴州、湖北、甘肅；越南、印度(北部)、不丹、尼泊爾。

1808. **Luperomorpha xanthodera** (Fairmaire) 黃胸寡毛跳甲 (Chao, 1982:174; Gressitt et Kimoto, 1963:864; Huang et Gao, 1996:208; Hun., 1992:546; Luo et Jin, 1995:87; Zhang, 1987[ed.] 2:54)
Luperocnemus xanthodera Fairmaire, 1888:43.
=*Luperomorpha collaris*, Chen, 1933:245. (*nec* Baly)
=*Luperomorpha similis* Chûjô, 1938:166.
=*Luperomorpha funesta fanesta* Chen et Kung, 1954:92, 96.
=*Luperomorpha funesta collaris*, Chen et Kung, 1954:92,96.
Luperomorpha xanthodera, Gressitt et Kimoto, 1963:864.
別 名：*黃胸葉甲*。
寄 主：柑橘(花瓣、幼樹鬚根)、李、桃、獼猴桃、酪梨、茼蒿、南瓜、小麥、十字花科蔬菜、甘薯、蘿菜、大豆、高粱、玉米、粟、向日葵、辣椒、茶、野薔薇。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、四川、浙江、湖北、山東、河北、東北南部。

1809. **Phygasia fulvipennis** (Baly) 棕翅粗角跳甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:884; Hun.,

1992:550)
Graptodera fulvipennis Baly, 1874:193.
=*Aldrisma externecostata* Fairmaire, 1888:156.
Phygasia fulvipennis, Chen, 1934:376.
寄 主：桑、羅摩科、雞矢藤。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、河北、吉林；日本。

1810. **Podagricomela apicipennis** Jacoby 淡尾橘潛跳甲 (Yunn., 1987:738)
寄 主：柑橘。
分 佈：廣東、雲南；越南、馬來亞、泰國。

1811. **Podagricomela cyanea** Chen 藍橘潛跳甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:789; Xiao, 1992:547)
Podagricomela cyanea Chen, 1939:58.
寄 主：柑橘、花椒。
分 佈：江蘇、陝西、甘肅。

1812. **Podagricomela geminata** Chen et Zia 藍橘潛跳甲 (Yunn., 1987:738)
寄 主：柑橘。
分 佈：雲南。

1813. **Podagricomela nigricollis** Chen 柑橘潛葉跳甲 (ASZI, 1986, 1:620; Chao, 1982:175; Gressitt et Kimoto, 1963:789; Huang, 1990[ed.] 2:226-228; Huang et Gao, 1996:207; NZWDI, 1981:1940; Zhang, 1987[ed.] 2:55)
Podagricomela nigricollis Chen, 1934:58.
寄 主：柑橘類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、湖北。
天 敵：*Oecephylla smaragdina* Fabricius 黃柑蟻

1814. **Podagricomela parva** Chen et Zia 小橘潛跳甲 (Yunn., 1987:738)
寄 主：柑橘。
分 佈：雲南。

1815. **Podagricomela weisei** Heikertinger 枸橘潛葉跳甲 (ASZI, 1986, 1:620; Gressitt et Kimoto, 1963:790; Huang, 1990[ed.] 2:228-229; NZWDI, 1981:1942; Zhang, 1987[ed.] 2:55)
Podagricomela weisei Heikertinger, 1924:36.
別 名：*枸橘潛葉蟲*，*潛葉綠跳甲*，*擬恶性葉蟲*，
寄 主：枸橘、衢橘、廣橙、柑、早福柑、速福橘、柚、香橼、枳殼。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、湖北、山東。

1816. **Podagricomela** sp. 潛葉跳甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:55)
寄 主：橘類。
分 佈：江西。

1817. **Throscoryssa citri** Maulik 紅黑蛀葉甲 (Chao, 1982:176; Gressitt et Kimoto, 1963:788)
Trichochrysea citri Maulik, 1928:160.
別 名：*橘潛蟲*。
寄 主：柑橘類。
分 佈：福建、廣東；阿薩姆。

Chrysomelinae 葉甲亞科

1818. **Agrosteomela indica indica** (Hope) 柱胸葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:331; Yunn., 1987:743)
Chrysomela indica Hope, 1831:39.
Agrosteomela indica, Monrós et Bechyne, 1956:1130.
寄 主：桃(?)
分 佈：臺灣、雲南、西藏；緬甸、印度(北部)、錫金、不丹、尼泊爾。

1819. **Chrysomela maculicollis** (Jacoby) 斑胸葉甲 (Gressitt et Kimoto, 11963:349; Hun., 1992:536)
Melasoma maculicollis Jacoby, 1890:117.
Chrysomela maculicollis, Chen, 1934:64.
寄 主：桑、榕。
分 佈：湖南、雲南、貴州、浙江、湖北。

1820. **Clitenella fulminans** (Faldermann) 黃腹麗螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:600; Gressitt et Kimoto, 1963:419)
Galeruca fulminans Faldermann,1835:438.
Clitenella fulminans, Laboissière, 1927:54.
寄 主：野葡萄、朴樹、樟樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、四川、浙江、湖北、河北、內蒙古。

1821. **Fleutianuxia aumata** (Baly) 棗葉甲 (Chen et al., 1993:40)
寄 主：棗。
分 佈：浙江。

1822. **Gastrolina depressa depressa** Baly 核桃扁葉甲 (ASZI,1986, 1:629; Chan, 1982:164; Chen, 1974:195, 196; Gressitt et Kimoto, 1963:341; Huang, 1990[ed.] 2:342-343; Hun., 1992:535; Xiao, 1992:540; Yunn., 1987:743)
Gastrolina depressa Baly, 1859:61.
=*Gastrolina thoracica* Baly, 1864:228.
=*Gastrolina thoracica* var. *immaculicollis* Chen, 1936:83.
=*Gastrolina thoracica* var. *cupricollis* Chûjô, 1941:459.
別 名：*黑胸核桃扁葉甲*。
寄 主：核桃、泡核桃、核桃楸、楓楊。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、甘肅、河南、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東部。
天 敵：盆蝽
蠋蝽
Aiolocaria hexaspilote (Hope) 六斑異瓢蟲

1823. **Gastrolina depressa pallipes** Chen 淡足核桃扁葉甲 (ASZI, 1986, 1:629; Yang, 1982:18-19; Yunn., 1987:743)
Gastrolina depressa pallipes Chen, 1974:196.
寄 主：核桃。
天 敵：*Aiolocaria nexaspilota* (Hope) 六斑異瓢蟲
分 佈：雲南。

1824. **Morophosphaera japonica** (Hornstedt) 榕葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:48)
寄 主：薜荔、小葉榕、天仙果。
分 佈：江西。

1825. **Pallasiola absinthii** (Pallas) 隧脛螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:597; Gressitt et Kimoto, 1963:404)
Chrysomela absinthii Pallas, 1773:725.
Pallasiola absinthii, Jacobson, 1925:51.
寄 主：山櫻桃、榆、蒿、假木賊。
分 佈：雲南、西康、西藏、四川、陝西、甘肅、河北、內蒙古、新疆、遼寧、吉林；蒙古、蘇聯南部、西伯利亞東南部。

1826. **Paropsides duodecimpustulata** Gebler 方形葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:48)
寄 主：梨、棠梨。
分 佈：江西。

1827. **Paropsides soriculata** Swartz 山楂斑葉甲 (ASZI, 1986, 1:631; An, 1994(2):32; Chao, 1982:165; Gressitt et Kimoto, 1963:787; Hun., 1992:537; Yunn., 1987:747)
Chrysomela soriculata Swartz, 1808:246.
別 名：*山楂似瓢葉甲、梨斑葉甲*。
寄 主：山楂、梨、杜梨。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、山東、山西、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、西伯利亞、越南、緬甸、印度。

1828. **Phaedon fulvescens** Weise 黃猿葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:336; Hun., 1992:534)
Phaedon fulvescens Weise, 1922:55.
寄 主：懸鉤子屬。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州；越南。

1829. 枸杞十點葉甲(負泥蟲) (Zhao et al., 1999(3):60)
寄 主：枸杞。
分 佈：寧夏。

1830. 草莓葉甲 (Gao et al., 1994(1):32)
寄 主：草莓。
分 佈：河北。

Galerucinae 螢葉甲亞科

1831. **Agelasa nigriceps** Motschulsky 獼猴桃柱螢甲 (ASZI, 1986, 1:616; Gressitt et Kimoto, 1963:713; Hun., 1992:587)
Agelasa nigriceps Motschulsky, 1860:25.
寄 主：獼猴桃、狗棗子、枳椇。
分 佈：湖南、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

1832. **Agelastica alni orientalis** Baly 東方臀螢甲 (Xiao, 1992:518)
別 名：*榿毛臀螢甲(東方亞種)*。

寄 主：蘋果、扁桃、楊、柳、榆。
分 佈：新疆；蘇聯、歐洲、北美。

1833. **Aulacophora indica** (Gmelin) 黃守瓜 (ASZI, 1986, 1:605; Chao, 1982:167; Gressitt et Kimoto, 1963:486; Hun., 1992:560; Luo et Jin, 1995:87; Yunn., 1987:755)
=*Aulacophora femoralis* Motschulsky, 1857:37.
=*Aulacophora similis*, Baly, 1886:3, 5, 16.
=*Rhaphidopalpa coffeae* Allard, 1888:306.
=*Rhaphidopalpa chinensis* Weise, 1892:395.
=*Rhaphidopalpa foveicollis*, Liu, 1935:635.
寄 主：瓜類作物、桃、梨、蘋果、柑橘、酪梨、樫木、葵花等多種植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東、陝西、河北，全國大部分省區均有分布；朝鮮、日本、西伯利亞東部、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、新幾內亞、斐濟。

1834 **Aulacophora nigripennis** Motschulsky 黑守瓜 (Luo et Jin, 1995:87)
寄 主：酪梨(葉)、瓜類。
分 佈：海南。

1835. **Clitenella fulminans** (Faldermann) 黃腹麗螢葉甲 (Chao, 1982:166; Gressitt et Kimoto, 1963:419; Hun., 1992:552)
Galeruca fulminans Faldermann, 1835:438.
Clitenella fulminans, Laboissière, 1927:54.
寄 主：野葡萄、朴樹、樟樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、湖北、河北、內蒙古。

1836. **Cneorane intermedia** Fairm 疑克螢葉甲 (Luo et al., 1996:58)
寄 主：檬果(花枝)。
分 佈：海南。

1837. **Fleutiauxia armata** (Baly) 桑窩額螢葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:526; Hun., 1992:567)
Aenidia armata Baly, 1874:179.
Fleutiauxia armata, Lab., 1933:55.
寄 主：桑、胡桃、楊樹等。
分 佈：湖南、浙江、吉林；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

1838. **Gallerucida bifasciata** Motschulsky 二紋柱螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:615; Chao, 1982:169; Gressitt et Kimoto, 1963:721; Hun., 1992:584; Yunn., 1987:768)
Gallerucida bifasciata Motschulsky, 1860:24.
=*Melospila nigromaculata* Baly, 1861:297.
=*Melospila consociata* Baly, 1874:185.
=*Galerucida nigrofasciata* Baly, 1879:453.
Galerucida bifasciata, Weise, 1886:578.
寄 主：桃、蕎麥、三裂蟛蜞菊、大黃、酸模、萹蓄。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、甘肅、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東南部。

1839. **Gallerucida thoracica** (Jacoby) 斑胸柱螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:616; Chao, 1982:169; Gressitt et Kimoto, 1963:734)
Eustetha thoracica Jacoby, 1888:348.
Galerucida (Eusthetha) thoracica, Weise, 1924:142.
寄 主：葡萄屬植物。
分 佈：福建、江西、湖北。

1840. **Haplosomoides costata** (Baly) 黑翅哈螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:609; Chao, 1982:169; Gressitt et Kimoto, 1963:518; Hun., 1992:567)
Mimastra costata Baly, 1878:415.
Haplosomoides costata, Laboissière, 1930:325.
寄 主：柑橘、桃、李、杏、櫻桃、柿、葡萄、玉米。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、西康、四川、貴州、浙江、湖北；琉球、越南。

1841. **Haplosomoides egena egena** Weise 褐背哈螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:608; Chao, 1982:169; Gressitt et Kimoto, 1963:518; Yunn., 1987:760)
Haplosomoides egena Weise, 1922:74.
寄 主：楊梅、朴屬、海州常山、臭牡丹等。
分 佈：福建、浙江、廣東、廣西、雲南、四川；越南北部。

1842. **Mimastra cyanura** (Hope) 桑黃米螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:610; Chao, 1982:169; Gressitt et Kimoto, 1963:536; Hun., 1992:569; NZWDL, 1981:1099; Song et Xian, 1993:236-237; Suzhou, CS., 1985:189-191; Yunn., 1987:768; Zheng, 1982[ed.]:189-191)
Auchenia cyanura Hope, 1831:29.
=*Phyllobrotica lunata* Kollar et Redtenbacher, 1848:556.
=*Anthraxantha davidis* Fairmaire, 1878:137.
=*Mimasta apicalis* Baly, 1886:28.
=*Mimastra cyanura* ab. *davidis*, Weise, 1924:124.
別 名：*黃葉甲、黃葉蟲、藍尾金花蟲*。
寄 主：成蟲爲害桑、蘋果、桃、梨、棠梨、李、梅、櫻桃、茶、苧麻、大麻、十字花科蔬菜、豆類、梧桐、榆、櫸等；幼蟲爲害馬齒莧、油菜、蟋蟀草、香附子。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、湖北；緬甸、印度、尼泊爾、克什米爾。
天 敵：*Cantharis curtata* Kies 赤胸花螢

1843. **Mimastra limbata** Baly 黃緣米螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:610; Gressitt et Kimoto, 1963:538; Hun., 1992:570; Yunn., 1987:768)
Mimastra limbata Baly, 1879:449.
寄 主：蘋果、梨、山麻黃、厚殼樹、榆科。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、陝西；印度。

1844. **Monolepta bicavipennis** Chen 凹翅長跗螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:612; Gressitt et Kimoto, 1963:610; Hun., 1992:576; Yunn., 1987:770)
Monolepta bicavipennis Chen, 1942:55.
寄 主：核桃、栗屬、銀杏、水杉、楓楊、楓香、柳。
分 佈：雲南、湖南、江西、浙江、湖北、陝西、山西。

1845. **Monolepta discalis** Gressitt et Kimoto 楊長跗螢葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:612;

Yunn., 1987:770)
Monolopta discalis Gressitt et Kimoto, 1963:612-613.
寄 主：核桃、楊、柳。
分 佈：雲南、貴州。

1846. **Monolepta hieroglyphica** (Motschulsky) 雙斑長跗葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:51)
寄 主：蘋果、桃、板栗、棉、馬鈴薯、大豆、向日葵、玉米、高粱。
分 佈：江西。

1847. **Monolepta longitarsoides** Chujo 竹長跗葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:51)
寄 主：松、杉、竹、野茉莉。
分 佈：江西。

1848. **Monolepta yunnanica** Gressitt et Kimoto 雲南長跗螢葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1963:637; Hun., 1992:579; Yunn., 1987:770)
Monolepta yunnanica Gressitt et Kimoto, 1963:637-638.
寄 主：核桃、柳、馬桑屬。
分 佈：雲南、湖南。

1849. **Morphosphaera chrysomeloides** (Bates) 臺灣一字螢葉甲 (Chang & Hung, 1986:133)
Oides chrysosmeloides Bates,
別 名：*臺灣一字金花蟲*。
寄 主：無花果、榕樹。
分 佈：臺灣。

1850. **Oides decempunctata** (Billberg) 十星瓢螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:602; Chao, 1982:170; Chen et Wang, 1987:178; Gressitt et Kimoto, 1963:477; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:375-376; Huang et Gao, 1996:283; Hun., 1992:557; Lu, 1996(2):48-49; Mao, 1996(4):49-50; NZWDI, 1981:1752; Zhang, 1987[ed.] 2:52)
Adorium decempunctata Billberg, 1808:230.
Oides decempunctata, Jacoby, 1883:400.
=*Solanophila gigantea* Roubal, 1929:96.
別 名：*葡萄十星葉甲*、*葡萄金花蟲*。
寄 主：葡萄、野葡萄。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林；朝鮮、越南。

1851. **Oides maculatus** (Olivier) 寬緣瓢螢葉甲 (ASZI, 1986, 1:603; Hun., 1992:558)
=*Oides laticlava* (Faldermann),
=*Oides tibetana* (Baly),
=*Oides starsatus* Jacoby,
=*Oides tibialis* Laboissiere,
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北。

1852. **Oides tarsata** (Baly) 黑跗瓢螢葉甲 (ASZI,1986, 1:604; Chao, 1982:170; Gressitt et Kimoto, 1963:479; Hun., 1992:558; Yu, 1985:23-24; Zhang, 1987[ed.] 2:52)

Adorium tarsatum Baly, 1865:435.
=*Adorium sordidum* Baly, 1865:435.
Oides tarsata, Ogloblin, 1936:147, 395.
寄 主：葡萄、野葡萄。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、西康、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、河北。

1853. **Paleosepharia fulvicornis** Chen 褐凹翅螢葉甲 (ASZI,1986, 1:614; Chao, 1982:170; Gressitt et Kimoto, 1963:647; Yunn., 1987:765)
Paleosepharia fulvicornis Chen, 1942:51.
寄 主：楊梅、李。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北。

1854. **Paraluperodes nigrobilineatus** Motschulsky 二黑條葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:52)
寄 主：柑橘、大豆、高粱、玉米、大麻、白菜、甘薯、棉。
分 佈：江西。

1855. **Parnops glasunowii** Jacobson 楊梢葉甲 (Liu, 1982[ed.]:213)
寄 主：梨(葉、梢)、楊、柳。
分 佈：河南、山東、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧。

1856. **Phyllobrotica (Fleutiauxia) armata** Baly 藍葉蟲 (Suzhou, CS., 1985:191-192; Zheng, 1982[ed.]:191-192)
寄 主：桑(春嫩葉)。
分 佈：貴州、浙江、東北。

1857. **Platyxantha chinensis** Maulik 桑葉蟲 (Suzhou, CS., 1985: 192; Zheng, 1982[ed.]:192)
寄 主：桑(嫩葉)。
分 佈：浙江、江蘇。

Eumolpinae 肖葉甲亞科

1858. **Abiromorphus anceyi** Pic 皺背葉甲 (ASZI, 1986, 1:643; Dai, 1983:121; Gressitt et Kimoto, 1963:274; Hun., 1992:596)
Abiromorphus anceyi Pic, 1924:7.
寄 主：棗、桃、楊、柳、水杉。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、湖北、北京、東北；朝鮮。

1859. **Abirus fortuni** (Baly) 桑皺鞘葉甲 (Chang & Hung, 1986:312; Chao, 1982:160; Gressitt et Kimoto, 1963:277; Hun., 1992:597; Suzhou, CS., 1985:192; Zhang, 1987[ed.] 2:43; Zheng, 1982[ed.]:192)
Dermorhytis fortunei Baly, 1861:283.
Abirus fortunei, Fairmaire, 1889:71.
=*Abirus recticollis* Pic, 1927:133.
=*Abirus sinensis* Pic, 1927:133.
=*Abirus sinensis* var. *guerryi* Pic, 1946:14.
別 名：*夏葉蟲*。
寄 主：桑、榆。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東；朝鮮、越南。

1860. **Acrothinium gaschkevitschii** (Motschulsky) 葡萄麗葉甲 (ASZI, 1986, 1:636; Chao, 1982:159; Gressutt et Kimoto, 1963:239; Zhang, 1987[ed.] 2:43)
Chrysochus gaschkevitschii Motschulsky, 1860:23.
Acrothinium gaschkevitschii, Marshall, 1864:47.
寄 主：葡萄、野薄荷、鴨跖草。
分 佈：臺灣、福建、江西、浙江；日本。

1861. **Aoria nucea** (Fairmaire) 栗厚緣葉甲 (ASZI, 1986, 1:641; Gressitt et Kimoto, 1963:257; Hun., 1992:595; Zhang, 1987[ed.] 2:43)
Osnaparis nucea Fairmaire, 1889:72.
=*Aoria taliana* Pic, 1935:8.
Aoria (*Osnaparis*) *nucea*, Chen, 1935:364.
寄 主：板栗、獼猴桃、柳。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西康、四川、貴州、湖北、河北。

1862. **Aoria scutellaris** Pic 盾厚緣葉甲 (Chao, 1982:160, Gressitt et Kimoto, 1963:260; Hun., 1992:596, Wu et Li, 1993:230-231)
Aoria atra var. *scutellaris* Pic, 1923:17.
Aoria scutellaris, Chen, 1935:367.
寄 主：葡萄(嫩莖、嫩梢)、野葡萄。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、吉林；越南。

1863. **Basilepta davidi** (Lefèvre) 鈍角胸葉甲 (ASZI, 1986, 1:634; Chao, 1982:158; Gressitt et Kimoto, 1963:219; Zhang, 1987[ed.] 2:43)
Nodostoma davidi Lefèvre, 1877:157.
=*Nodostoma atriventre* var. *approximatum* Pic, 1933:8.
=*Nodostoma okinawense* Chûjô, 1935:77.
=*Nodostoma insulanum* Chûjô, 1935:204.
Basilepta davidi, Miwa, 1931:187.
別 名：*紅棕角胸葉甲*。
寄 主：李、桃、櫻桃屬、山核桃屬、楊梅屬植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇；朝鮮、越南(北部)。

1864. **Basilepta fulvipes** (Motschulsky) 褐足角胸葉甲 (ASZI, 1986, 1:634; Chao, 1982:158; Gressitt et Kimoto, 1963:222; Yunn., 1987:727; Zhang, 1987[ed.] 2:43)
Nodostoma fulvipes Motschulsky, 1860:176.
=*Nodostoma aeneipennis* Motschulsky, 1860:177.
=*Nodostoma rufotestacea* Motschulsky, 1860:177.
=*Nodostoma atripes* Motschulsky, 1861:23.
=*Nodostoma chinense* Lefèvre, 1877:158.
=*Nodostoma fulvipes* var. *coerulescens* Weise,1889:597
=*Nodostoma fulvipes* var. *picicollis* Weise, 1889:597.
=*Nodostoma fulvipes* varr. *aeneipennis*, *rufotestacea*, *agripes* Weise, 1889:596-7
Basilept fulvipes, Weise, 1922:47.
=*Nodostoma bicoloripes* Pic, 1930:7.
寄 主：櫻桃、梨、蘋果、梅、李、葡萄、楓楊、旋覆花、蒿屬，在北方成蟲還為害大豆、穀子、玉米、高粱、大麻、甘草等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙

江、江蘇、湖北、山東、陝西、寧夏、山西、河北、北京、內蒙古、吉林、東北；朝鮮、日本、西伯利亞。

1865. **Basilepta leechi** (Jacoby) 隆基角胸葉甲 (Chao, 1982:158; Gressitt et Kimoto, 1961:225; Hun., 1992:591; Zhang, 1987[ed.] 2:43)
Nodostoma leechi Jacoby, 1888:344.
=*Basilepta leachi*, Weise, 1922:47.
Basilepta leechi, Chen, 1935:321.
寄 主：刺莓、紅腺懸鉤子、茅莓、栲屬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北；越南。

1866. **Basilepta pallidulum** (Baly) 小黃褐角胸葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:44)
寄 主：松、杉。
分 佈：江西。

1867. **Basilepta ruficolle** (Jacoby) 圓角胸葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1961:230; Hun., 1992:591)
Nodostoma ruficolle Jacoby, 1885:205.
=*Nodostoma nigripenne* Pic, 1928:379.
Basilepta ruficolle, Chen, 1935:315.
寄 主：栗屬、懸鉤子屬、蓼屬。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、湖北；日本。

1868. **Basilepta sinara** Weise 棕角胸葉甲 (Chao, 1982:159; Gressitt et Kimoto, 1961:230; Hun., 1992:591)
Basilepta sinarum Weise, 1922:47.
Basilepta sinara, Hunan, 1992:591.
寄 主：獼猴桃、榛屬、青岡櫟。
分 佈：福建、湖南、廣東、四川、貴州、山東、河北。

1869. **Basilepta subcostata** (Jacoby) 脊鞘角胸葉甲 (Yunn., 1987:727)
寄 主：芭蕉。
分 佈：雲南；寮國、泰國、緬甸、印度。

1870. **Bromius obscurus** (Linnaeus) 葡萄葉甲 (ASZI, 1986, 1:641; Gressitt et Kimoto, 1961:255; Hun., 1992:596)
Chrysomela obscura Linnaeus, 1758:375.
Adoxus obscurus, Horn., 1892:197.
寄 主：葡萄。
分 佈：貴州、湖南、江蘇、甘肅、山西、河北、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、北美。

1871. **Callisina burmanica** Jacoby 凸斑寬角葉甲 (Yunn., 1987:727)
寄 主：板栗、櫟、算盤子。
分 佈：雲南。

1872. **Chrysolampra splendens** Baly 亮葉甲 (ASZI, 1986, 1:643; Chao, 1982:161; Gressitt et Kimoto, 1961:285; Hun., 1992:597; Yunn., 1987:731; Zhang, 1987[ed.] 2:44; Zhao et al., 1977:188)
Chrysolampra splendens Baly, 1859:126.

寄 主：梨、櫻桃、棕、杉木屬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、江蘇、甘肅；越南、寮國、柬埔寨。

1873. **Cleoporus variabilis** (Baly) 李葉甲 (Chang & Hung, 1986:132; Chao, 1982:159; Gressitt et Kimoto, 1961:201; Hun., 1992:393; Xiao, 1992:533; Yunn., 1987:727, 733; Zhang, 1987[ed.] 2:44)
Paria variabilis Baly, 1874:166.
=*Paria robusta* Baly, 1874:166.
=*Stethotes tibialis* Lefevre, 1885:65.
=*Stethotes pallidipes* Fairmaire, 1888:36.
=*Mouhotina rufipes* Lefèvre, 1889:293.
=*Cleoporus niger* Weise, 1922:52.
=*Cleoporus pygmaeus* Weise, 1922:53.
=*Cleoporus tibialis* Chen, 1935:285.
=*Cleoporus tibialis* var. *aeneipennis* Chen, 1935:286.
Cleoporus variabalis, Chen, 1935:288.
別 名：*雲南松葉甲*。
寄 主：李、桃、梅、梨、蘋果、栗、華山松、雲南松、馬尾松、馬桑、麻櫟、檵木、長梗柳、算盤子屬、野桐屬、檸檬桉、大葉桉、蠻青岡、楷木、細葉楷木、胡枝子、大葉桉、月季、楓楊、油茶、烏桕。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、山東、陝西、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(東西伯利亞)、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、泰國。
天 敵：寄生菌(蛹)
蜘蛛(捕食成蟲)
蟻(卵,幼蟲,蛹)

1874. **Clytra quadripunctata** Linnaeus 粗背鋸角葉甲 (ASZI, 1986, 1:651)
寄 主：山楂、楊、柳、榛、白樺、白楊等。
分 佈：新疆；西伯利亞、歐洲。

1875. **Colaspoides femoralis** Lefèvre 毛股溝臀葉甲 (ASZI, 1986, 1:644; Chao, 1982:161; Gressitt et Kimoto, 1961:280; Hun., 1992:398; Xiao, 1992:535; Yunn., 1987:731)
Colaspides femoralis Lefèvre, 1885:158.
別 名：*茶葉甲*。
寄 主：栗、茶、油桐、楓香、水紅木、木荷屬、燈臺樹。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、山東、山西。

1876. **Cryptocephalus japanus** Baly 酸棗隱頭葉甲 (ASZI, 1986, 1:654; Chen et al., 1993:40; Gressitt et Kimoto, 1961:138)
Cryptocephalus japanus Baly, 1873:92.
=*Cryptocephalus raddei* Kraatz, 1879:131.
=*Cryptocephalus raddei* var. *raddensis* Pic, 1904:27.
=*Cryptocephalus raddei* ssp. *rasinae* Pic, 1904:27.
=*Cryptocephalus peliopterus bistrinotatus* Chen, 1942:116.
寄 主：棗、酸棗、圓葉鼠李。
分 佈：陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

1877. **Lypesthes atra** (Motschulsky) 粉筒胸葉甲 (ASZI, 1986, 1:641; Chao, 1982:160; Gressitt et Kimoto, 1961:270; Hun., 1992:596; Zhang, 1987[ed.] 2:45)
Fidia atra Motschulsky, 1860:22.
Lypesthes atra, Baly, 1863:152.
=*Leprotes pulverulentus* Jacoby, 1885:203, 705.
=*Talmona farinosus* Fairmaire, 1889:71.
寄 主：蘋果、沙果。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、湖北、陝西；朝鮮、日本。

1878. **Nodina chinensis** Weise 中華球葉甲 (ASZI, 1986, 1:634; Chao, 1982:159; Gressitt et Kimoto, 1961:207; Hun., 1992:590; Zhang, 1987[ed.] 2:45)
Nodina chinensis Weise, 1922:49.
寄 主：板栗、馬尾松、楷木、擦木、竹、算盤子屬植物
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、湖北、陝西。

1879. **Nodina punctatostriolata** (Fairmaire) 柑橘花葉蟲 (Chao, 1982:159; Gressitt et Kimoto, 1961:212; Liu, 1960:96-97)
Lamprosoma punctostriolatum Fairmaire, 1888:37.
=*Lamprosoma minutulum* Fairmaire, 1888:37.
=*Nodina chinensis* Bryant, 1924:248. (*nec* Weise)
=*Nodina fokienica* Chen, 1935:300. (New name for *chinensis* Bryant)
Nodina punctatostriolata (sic); Chen, 1935:301.
=*Nodina metallica* Bryant, 1937:98. (New name for *chinensis* Bryant)
寄 主：柑橘(花)。
分 佈：福建、江西、廣東、海南、雲南。

1880. **Oomorphoides tonkinensis** (Chûjô) 毛葉楝卵形葉甲 (ASZI, 1986, 1:647; Gressitt et Kimoto, 1961:193)
Lamprosoma tonkinense Chûjô, 1935:94.
Oomorphoides tonkinensis, Gressitt et Kimoto, 1961:193.
寄 主：栗樹、毛葉楝木、銀鵲樹。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、湖北；越南。

1881. **Parascela cribrata** (Schaufuss) 粗刻似角胸葉甲 (ASZI, 1986, 1:636; Gressitt et Kimoto, 1961:237; Hun., 1992:593)
Pseudocolaspis cribrata Schaufuss, 1871:200.
Parascela cribrata, Baly, 1878:252.
=*Basilepta hirta* Chen, 1935:769.
寄 主：櫻桃、楊樹、十大功勞。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、雲南、四川、浙江。

1882. **Parnops glasunowi** Jacobson 楊梢葉甲 (Gressitt et Kimoto, 1961:242; Sun, 1998(4):54; Xiao, 1992:545)
Parnops glasunowi Jacobson, 1894:277.
寄 主：梨、楊、柳。
分 佈：陝西、寧夏、甘肅、新疆、河南、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、蘇聯。

1883. **Platycorynus undatus** (Olivier) 波紋扁角葉甲 (Chao, 1982:161; Gressitt et Kimoto, 1961:295; Hun., 1992:599; Yunn., 1987:732)

Cryptocephalus undatus Olivier, 1791:614.
別 名：*曲帶扁角葉甲*。
寄 主：枇杷、油茶。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、雲南；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度。

1884. **Scelodonta lewisii** Baly 葡萄溝頂葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:45)
寄 主：葡萄。
分 佈：江西。

1885. **Trichochrysea japana** (Motschulsky) 銀紋毛葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:45)
寄 主：板栗、毛栗、白櫟、檵木。
分 佈：江西。

1886. **Trichochrysea marmorata** Tan 閃爍毛葉甲 (Tan, 1984:94)
Trichodhrysea marmorata Tan, 1984:94.
寄 主：雲南松、落葉松、檵木。
分 佈：雲南。

1887. **Trichochrysea nitidissima** (Jacoby) 合歡毛葉甲 (Chao, 1982:160; Gressitt et Kimoto, 1961:247; Yunn., 1987:729)
Heteraspis nitidissima Jacoby, 1888:345.
=*Trichochrysea scutellaris* Pic, 1926:11.
=*Trichochrysea donckieri* Pic, 1926:11.
Trichochrysea nitidissima, Chen, 1935:343.
=*Trichochrysea diversicolor* Pic, 1939:344.
=*Trichochrysea viridis* Chen, 1940:507.
寄 主：板栗、山合歡、黃檀屬。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南、海南、廣西、雲南、四川；越南。

Cryptocephalinae 隱頭葉甲亞科 (Lamprosomatinae)

1888. **Cryptocephalus approximatus** Baly 栗隱頭葉甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:46)
寄 主：西班牙栗。
分 佈：江西。

Clyptrinae 鋸角葉甲亞科

1889. **Physauchenia bifasciata** (Jacoby) 雙帶方額葉甲 (ASZI, 1:650; Chao, 1982:162; Gressott et Kimoto, :105; Hun, :600; Zhang, 1987ed.(2):47)
Clythra (Physauchenia) pallens, Lacordaire, 1848:368. (*nec* Fabricius)
Coptocephala bifasciata Jacoby, 1888:341.
=*Coptocephala (Physauchenia) pallens* var. *bifasciata*, Jacoby et Clavareau, 1906:51.
=*Physauchenia pallens* varr. *binotata, uninotata, fokiensis* Pic,1927:7
Physauchenia bifasciata, Gressitt et Kimoto, 1963:105.
寄 主：柑橘屬、檸檬桉、算盤子、黑荊樹、南紫薇、月季、牡荊、櫟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、越南、印度。

1890. **Smaragdina nigrifrons** (Hope) 黑額光葉甲 (ASZI, 1986, 1:650; Chao, 1982:162; Gressitt

et Kimoto, 1961: 99; Hun., 1992:602; Zhang, 1987[ed.] 2:47)
Clythra nigrifrns Hope, 1842:51.
=*Clythra japonica* Baly, 1873:79.
=*Clythra coreana* Kolbe, 1886:226.
=*Coptocephala japonica* var. *immaculata* Heyden, 1887:295.
=*Gynandrophthalma japonica* var. *mandarina* Weise, 1887:579.
=*Physauchenia atripes* Pic, 1927:7.
=*Cyaniris japonica* var. *atrobasalis* Pic, 1932:13.
=*Cyaniris mandarina* varr. *basidisjuncta, latereducta* Pic, 1934:20.
=*Cyaniris* (s. str.) *japonica* var. *formosana* Chûjô, 1934:284.
=*Cyaniris kolthoffi* Pic, 1938:17.
Smaragdina nigrifrons, Gressitt et Kimoto, 1963:99.
寄 主：栗屬、馬尾松、柳、白茅屬、榛屬、蒿、算盤子、南紫薇。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西康、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、山東、河南、陝西、山西、河北、北京、遼寧；朝鮮；日本。

1891. **Smaragdina semiaurantiaca** (Fairmaire) 梨光葉甲 (ASZI, 1986, 1:651; Gressitt et Kimoto, :1961 101)
Gynandrophthalma semiaurantiaca Fairmaire, 1888:150.
=*Calyptorrhina* (*Gynandrophthalma*) *cyanea garretai*, Chûjô, 1941:454.
Smaragdina semiaurantiaca, Gressitt et Kimoto, 1963:101.
寄 主：梨、杏、蘋果、榆。
分 佈：江蘇、湖北、陝西、山東、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Hispidae 鐵甲科

Anisoderinae 潛甲亞科

1892. **Anisodera propinqua** Baly 毛角潛甲 (Chen, et al.:118; Yunn., 1987:774)
Anisodera propinqua Baly, 1888:657.
=*Lissochila barbicornis* Weise, 1897:119.
寄 主：芭蕉。
分 佈：雲南；中印半島湄公河流域、緬甸、印度。

1893. **Pistosia dactyliferae** (Maulik) 棗椰扁潛甲 (Chen, et al.:136)
Wallacea dactyliferae Maulik, 1919:107.
寄 主：棕櫚科刺葵屬。
分 佈：雲南；印度。

Hispinae 鐵甲亞科

1894. **Brontispa longissima** (Gestro) 椰子紅胸葉蟲 (Chen, 1975:447; 1992:31-41; Chen et Hsieh, 1978:6-15; Chiu et al., 1985:449; 1988:211-219; Gressitt, 1957:224-225; Liu et al., 308-314; Pingtung AC., 1986:55-57; Su, 1997:32; Wu et Tao, 1976:150-155)
Oxycephala longissima Gestro, 1885:162.
=*Brontispa froggatti* Sharp, 1904:924.
Brontispa longissima, Gestro, 1905:455.
=*Brontispa javana* Weise, 1922:62.
=*Brontispa selebensis* Gestro, 1923:16.
=*Brontispa simmondsi* Maulik, 1927:105.
=*Brontispa reicherti* Uhmann, 1929:145.
別 名：*可可椰子扁金花蟲*、*紅胸葉蟲*。

[Coconut leaf bud beetle]

寄 主：可可椰子(心葉)、油椰子、糠榔、大王椰子、亞力山大椰子、岩海棗。

分 佈：臺灣；爪哇、摩鹿加、西里比斯、新幾內亞、所羅門群島、俾士麥群島、新赫布里底群島、新喀里多尼亞島。

天 敵：*Tetrastichus brontispae* Ferrière

1895. **Dactylispa (Triplispa) chinensis** Weise 中華叉趾鐵甲 (Chao, 1982:177; Chen, et al.:296; Gressitt et Kimoto, 1963:926)

Dactylispa chinensis Weise, 1905:102.

=*Dactylispa bindusara* Maulik, 1919:193.

=*Dactylispa insulicola* Chûjô, 1933:326.

=*Dactylisps gestroi* Gressitt, 1938:327.

寄 主：白葉莓(*Rubus innominatis* S. Moore)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖北；越南北部、中南半島。

1896. **Dactylispa (Triplispa) crassicuspis** Gestro 尖齒叉趾鐵甲 (Chao, 1982:177; Chen, et al.:299; Gressitt et Kimoto, 1963:926)

Dactylispa crassicuspis Gestro, 1904:184.

寄 主：杜梨(*Pyrus betulaefolia* Bge.)

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、陝西。

1897. **Dactylispa (Triplispa) higoniae higoniae** (Lewis) 多刺叉趾鐵甲 (Chen, et al., :303; Gressitt et Kimoto, 1963:928)

Hispa higoniae Lewis, 1896:342.

=*Dactylispa asoka* Maulik, 1919:218.

=*Dactylispa corpulentina* Uhmann, 1927:113.

寄 主：懸鉤子、紫珠屬(*Callicarpa* sp.)(馬鞭草科)。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、雲南、西藏、四川；日本、越南北部、泰國、印度。

1898. **Dactylispa (Triplispa) parbatya** Maulik 膨端叉趾鐵甲 (Chao, 1982:178; Chen, et al., :314; Gressitt et Kimoto, 1963:930)

Dactylispa xanthopus, Maulik, 1918:70. (*nec* Gestro, 1898:72)

Dactylispa parbatya Maulik, 1919:65-66.

寄 主：懸鉤子。

分 佈：福建、雲南；印度、錫金。

1899. **Dactylispa (Platypriella) excisa excisa** (Kraatz) 束腰扁趾鐵甲 (Chao, 1982:177; Chen, et al., :335; Gressitt et Kimoto, 1963:927; Hun., 1992:608)

Hispa excisa Kraatz, 1879:140.

=*Dactylispa excisa repanda* Weise, 1922:81.

寄 主：李屬(*Prunus*)、柞樹(櫟屬 *Quarcus*)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、山東、陝西、黑龍江。

1900. **Dactylispa (Platypriella) subquadrata australis** Chen et Tan 鋸肩扁趾鐵甲 (Hun.,1992:608)

Dactylispa (Platypriella) subquadrata australis Chen et Tan, 1964:421, 427.

寄 主：栗屬、櫟屬、栲屬。
分 佈：福建、湖南、雲南。

1901. **Dactylispa (Platypriella) subquadrata subquadrata** (Baly) 鋸肩扁趾鐵甲
(ASZI, 1:665; Chang & Hung, :133; Chen, et al., :343; Gressitt et Kimoto, :933)
Hispa subquadrata Baly, 1874:216.
=*Dactylispa adstricta* Weise, 1922:81.
別 名：*廣肩棘金花蟲*。
寄 主：栗屬(*Castanea* (Tourn.) L.)、櫟屬(*Quercus*)、栲屬(*Castanpsis*)。
分 佈：江蘇、湖北、山東；日本。

1902. **Platypria hystrix** (Fabricius) 闊葉掌鐵甲 (Chen, et al., :221; Gressitt et Kimoto, :938)
Hispa hystrix Fabricius, 1798:116.
=*Platypria erinacea* Olivier, 1808:762. (*nec* Fabricius, 1801).
=*Platypria digitata* Gestri, 1888:178.
=*Platypria echinogale* Uhmann, 1934:30. (*nec* Gestro 1897).
寄 主：楊梅屬、懸鉤子屬、田菁屬、刺桐屬、藊豆屬。
分 佈：海南、雲南；越南、印尼(爪哇)、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

1903. **Platypria melli** Uhmann 棗掌鐵甲 (ASZI, 1986, 1:662; Chao, 1982:178; Chen, et al., :223; Gressitt et Kimoto, 1963:938; Hun., 1992:609)
Plastypria fenestrata, Gressitt, 1945:182. (*nec* Pic)
Plastypria melli Uhmann, 1955:211.
寄 主：棗、拐棗、鼠李科馬甲子。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽。

Cassidinae 龜甲亞科

1904. **Alledoya vespertina** (Boheman) 山楂肋龜甲 (ASZI, 1986, 1:678; Chen, et al., :548; Gressitt et Kimoto, 1963:969; Hun., 1992:611)
Cassida vespertina Boheman, 1862:357.
別 名：*白斂肋龜甲*。
寄 主：山楂、懸鉤子屬、樺木、鐵線蓮屬、白斂屬、打碗花屬。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、西康、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、甘肅、山西、河北、北京、內蒙古、黑龍江；蒙古、朝鮮、西伯利亞東部、日本、琉球群島。

1905. **Aspidomorpha indica** Boheman 印度梳龜甲 (Chen, et al., :584, Gressitt et Kimoto, 1963:952; Yunn., 1987:795)
Aspidomorpha indica Boheman, 1805:318.
寄 主：柑橘、甘薯屬。
分 佈：臺灣、雲南、四川；越南、印度。

1906. **Cassida versicolor** (Boheman) 蘋果龜甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:58)
寄 主：蘋果、沙梨、李屬、細花楸、石楠屬、石斑木。
分 佈：江西。

1907. **Taiwania (s. str.) circumdata** (Herbst) 甘薯臺龜甲 (Chen, et al., :512; Gressitt et Kimoto,1963:970; Hun., 1992:614)

Cassida circumdata Herbst, 1799:268.
=*Cassida trivittata* Fabricius, 1801:397.
=*Cassida U-fuscum* Wiedemann, 1823:74.
=*Metriona circumdata* ab. *pescadorensis* Chûjô, 1934:163.
=*Cassida cuticula* Gressitt, 1938:191.
別 名：*甘薯小龜甲、甘薯綠龜甲*。
寄 主：甘薯屬、臺灣旋花、梨、柑橘、荔枝、龍眼、芭蕉、桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北；日本、菲律賓、越南、中南半島、印度、孟加拉。

1908. **Taiwania** (s. str.) **obtusata** (Boheman) 柑橘臺龜甲 (ASZI, 1986, 1:677; Chen, et al., :527; Gressitt et Kimoto, 1963:972; Huang et Gao, 1996:208; Yunn., 1987:791)
Cassida obtusata Boheman, 1854:405.
=*Cassida juno* Boheman, 1862:324.
寄 主：柑橘、莧菜、雞冠花、蝦鉗菜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南；菲律賓、越南、緬甸、印度。

1909. **Taiwania** (s. str.) **versicolor** (Boheman) 蘋果臺龜甲 (ASZI, 1986, 1:678; Chang & Hung, 1986:133; Chen, et al., :543; Gressitt et Kimoto, 1963:974; Hun., 1992:615; Luo et al., 1996:58; Yunn., 1987:791)
Coptocycla versicolor Boheman, 1855:414.
=*Coptocycla thais* Boheman, 1862:463.
=*Coptocycla crucifera* Kraatz, 1879:271.
=*Metrioma thais crucifera*, Spaeth, 1914:144.
=*Thlaspida chinensis* Gressitt, 1938:385.
=*Cassida versicolor* ab. *cruciferai* Spaeth, 1938:235.
=*Coptocycla crucifera* Kraatz, 1979:271.
別 名：*木瓜龜甲*。
寄 主：梨屬、棠梨、蘋果屬、花楸屬、李屬、車輪梅屬、櫻果、木瓜(果實)、櫻等植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、黑龍江；日本、琉球群島、越南、緬甸。

1910. **Thlaspida biramosa biramosa** (Boheman) 雙枝尾龜甲 (ASZI, 1986, 1:680; Chao, 1982:181; Chen, et al., :561)
Coptocycla biramosa Boheman, 1855:408.
寄 主：柑橘、紫珠屬。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北。

Attelabidae 卷象科

1911. **Apoderus brachialis** Voss 紅捲葉象 (Chen, 1981:41)
別 名：*紅落文、紅搖籃蟲*。
寄 主：蓮霧、番石榴、蒲桃、龍眼、楊梅、臺灣獼猴桃(*Actinidia callossa* Lindl. var. *fromosana* Finet et Gagnep)、茶、大頭茶、九節木、樟、豬腳楠、紅株水木、九芎、臺灣金栗蘭、香港饅頭果、臺灣赤楊、臺灣野薔薇、灰木、臺灣石楠、榕樹、臺灣木薑子、漸尖葉櫧。

分 佈：臺灣。

1912. **Apoderus geniculatus** Jekel 橡果卷葉象 (ASZI, 1986, 1:685; Chao, 1982:185; Hun., 1992:617; Yunn., 1987:798; Zou, :231)
別 名：*膝卷象*。
寄 主：橡果、板栗、雲南松、冬瓜木、毛木樹。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、江蘇、河南。

1913. **Apoderus minimus** Roelofs 桃小卷葉象 (Zhang, 1987[ed.] 2:59)
寄 主：桃。
分 佈：江西。

1914. **Apoderus nigropicatus** Jekel 尖尾卷象 (Chao, 1982:185; Yunn., 1987:798)
寄 主：板栗、烏桕、洋槐。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南。

1915. **Apoderus rugicollis** Schilsky 皺胸卷象 (Chao, 1982:185; Yunn., 1987:797)
寄 主：核桃、冬瓜木、杉木。
分 佈：福建、雲南、河北。

1916. **Apoderus sexguttatus** Voss 黃紋卷象 (Yunn., 1987:798)
寄 主：海南蒲桃、鹽膚木。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南。

1917. **Apoderus sulcicollis** Jekel 溝紋卷象 (ASZI, 1986, 1:686; Huang, 1995, 18(3):4-6; Yunn., 1987:798)
別 名：*螺紋卷葉象*。
寄 主：橡果。
分 佈：雲南、江蘇。

1918. **Aspidobyctiscus lacunipennis** Jekel 葡萄金象 (ASZI, 1986, 1:689; Chao, 1982:181; Hun., 1992:619; Li, 1957:176; Yunn., 1987:799)
別 名：*葡萄卷葉象*。
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、陝西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1919. **Byctiscus betulae** Linnaeus 梨卷葉象 (Huang, 1990[ed.] 2:95-96; Li, 1957:174; Li, 1957:271-272; Xiao, 1992:566; Zhang, 1987[ed.] 2:59; Zhu et al., 1994(3):33-34)
寄 主：梨、蘋果、山楂、白楊、小葉楊、山楊、樺樹。
分 佈：江西、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

1920. **Byctiscus lacunipennis** Jekel 葡萄卷葉象 (Zhang, 1987[ed.] 2:59)
寄 主：葡萄、山毛櫸。
分 佈：江西。

1921. **Byctiscus princeps** (Solsky) 蘋果卷葉象 (ASZI, 1986, 1:689; Li, 1957:176; Xiao,

1992:568)
別 名：*蘋果金象*。
寄 主：蘋果、梨、杏、海棠、小葉楊、榛、椴、榆。
分 佈：河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1922. **Deporaus bicolor** Voss 二色切葉象 (Hun., 1992:620)
寄 主：桃。
分 佈：湖南、江蘇。

1923. **Deporaus manginatus** Pascoe 檬果切葉象 (Zou, :232)
寄 主：檬果。
分 佈：雲南。

1924. **Deporaus marginatus** (Pascoe) 檬果短頸象 (Fu, 1995(1):28-29; 1995(2):43-44; Huang, 1995, 18(3):3-4; Huang et Gao, 1996:281; Luo et Li, 1998:61; Luo et al., 1996:58; Yunn., 1987:799)
別 名：*檬果切葉象*。
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南。

1925. **Hemicolabus** sp. 黑足紅象 (Zhang, 1987[ed.] 2:59)
寄 主：苦莓。
分 佈：江西。

1926. **Isolabus longicollis** Fairmaire 櫟長頸象 (ASZI, 1986, 1:688; Fang, 1982:16-17; Hun., 992:618)
別 名：*長胸唇象、長胸卷象*。
寄 主：中華獼猴桃(*Actinidia chinensis* Planch)、麻櫟、榛。
分 佈：雲南、四川、湖南、江西、安徽、江蘇、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1927. **Mecorhis cumulatus** (Voss) 板栗剪枝象 (ASZI, 1986, 1:691; Wang, 2000(1):46; Yunn., 1987:800)
寄 主：板栗。
分 佈：福建、雲南、江蘇、湖北、河南。

1928. **Parocycnotrachelus longiceps** Motschulsky 栗卷葉象 (Zhang, 1987[ed.] 2:59)
寄 主：油茶、白櫟、茅栗。
分 佈：江西。

1929. **Paroplapoderus pardalis** Snellen et Vollenhoven 花斑切葉象 (Xioa, 1992:600)
寄 主：日本板栗、麻櫟、枹櫟、日本山毛櫸。
分 佈：雲南、江蘇；日本。

1930. **Paroplapoderes semiammulatus** Jekel 圓斑象 (Chao, 1982:185; Hun., 1992:617)
寄 主：馬尾松、楓楊、白櫟、青岡。
分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、河南、河北。

1931. **Rhynchaenus mangiferae** Mashaoe 檬果跳象 (Zoo, :231)
寄 主：檬果。
分 佈：雲南。

1932. **Rhynchites auratus** Gyll. 櫻桃虎象 (Chao et Lee, 1966:249-250; Huang, 1990[ed.] 2:158-159)
寄 主：杏、灌木酸櫻桃、毛櫻桃、西洋李、海棠果、蘋果、李光桃。
分 佈：新疆。

1933. **Rhynchites confragosicollis** Voss 桃虎象 (Chao, 1982:184; Chao et Lee, 1966:249-250; Huang et Gao, 1996:243; Han., 1992:620; Wang et Li, 1996(1):13; Zhang, 1987[ed.] 2:59)
別 名：*桃虎*。
寄 主：桃、李、杏、梅(幼蟲蛀食幼果)。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北。

1934. **Rhynchites faldermanni** Schönherr 杏虎象 (ASZI, 1986, 1:690; Chao, 1982:184; Chao et Lee, 1966: 249-250)
寄 主：杏、桃、櫻桃。
分 佈：福建、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林；蘇聯。

1935. **Rhynchites foveipennis** Fairmaire 梨虎象 (ASZI, 1986, 1:690; Chao et Lee, 1966:249-250; Chen et Wang, 1987:126-127; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:93-94; Huang et Gao, 1996:242; Li, 1994:30-33; Lin, 1986[ed.]:335-337; NZWDI, 1981:1743; Yuan., 1987:799; Zhang, 1987[ed.] 2:59)
別 名：*朝鮮梨象蟲*。
寄 主：梨、蘋果、沙果、桃、李、杏、梅、山楂。
分 佈：福建、江西、雲南、四川、貴州、浙江、山東、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。

1936. **Rhynchites heros** Roelobs 桃實象 (Lin, 1986[ed.]:336)
寄 主：梨、蘋果、桃、李。
分 佈：福建、江西、雲南、四川、貴州、浙江、山東、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。

Curculionidae 象蟲科

1937. **Acidodes fenatus** Faust 檬果長足象 (Huang, 1995, 18(3):1-3)
寄 主：檬果(嫩梢)、腰膚木。
分 佈：雲南。

1938. **Aclees cribratus** Gyllenhyl 篩孔二節象 (Chao, 1982:191; Yuan., 1987:812)
寄 主：柑橘、蘋果。
分 佈：福建、浙江、廣西、雲南、四川。

1939. **Aclees rudirostris** Heller 無花果長目象蟲 (Chang & Hung, 1986:133)
別 名：*無花果長臼象鼻蟲*。
寄 主：無花果(枝)。
分 佈：臺灣。

1940. **Acryptorrhynchus frigidus** Fabricius 果肉象 (Huang, 1990[ed.] 2:297-298)
寄 主：檬果(幼蟲蛀食果肉)。
分 佈：雲南。

1941. **Acryptorrhynchus olivieri** Faust 果實象 (Huang, 1990[ed.] 2:299)
寄 主：檬果(幼蟲爲害種仁、果肉)。
分 佈：雲南。

1942. **Aedenus** sp. 柿花象 (Li et al., 1995(1):5-7)
寄 主：柿。
分 佈：陝西。

1943. **Alcidodes juglans** Chao 核桃長足象 (ASZI, 1986, 1:709; Chao et Wang, 1987:203; Huang, 1990[ed.] 2:338-339; Wang, 1987[ed.]:197-199; Xiao, 1992:561; Yunn., 1987:816)
別 名：*果實象*。
寄 主：核桃、泡核桃、鐵核桃、櫟。
分 佈：雲南、四川、貴州、湖北、河南、陝西。

1944. **Alcidodes waltoni** (Boheman) 甘藷大象蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：桑、甘藷、蕹菜、辣椒、大豆、向日葵、馬鈴薯、苧麻、油桐。
分 佈：江西。

1945. **Anaptovrlainur sineneirs** Waterkoure 杉象 (Liu, 9182[ed.]:266-267)
寄 主：梨、蘋果、板栗、杉、落葉松、櫟。
分 佈：江西、山東。

1946. **Anthonomus pomorum** Linnaeus 梨花象 (Huang, 1990[ed.] 2:96-97; Ma et Du, 1996, 22(1):49-50)
別 名：*蘋花象*。
寄 主：梨、蘋果、桃、沙果、花青、秋子、山荊子、榲桲、檸檬等果樹花蕾。
分 佈：湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、遼寧。

1947. **Anthonomus** sp. 山楂花象 (Huang, 1990[ed.] 2:144-146)
寄 主：山楂、山里紅(嫩芽、花蕾、花和幼果)。
分 佈：山西、遼寧、吉林。
天 敵：寄生蜂(幼蟲，寄生率達 30-34%)
白僵菌
捕食天敵(落地幼蟲)

1948. **Anthonomus** sp. 杏花象 (Sun, 1984:377-378)
寄 主：杏(花)。
分 佈：甘肅。

1949. **Aoryptorrhynchus frigidus** Fabricius 果肉象 (Huang, 1990[ed.] 2:297-298)

寄 主：榛果(幼蟲蛀害果肉)。
分 佈：雲南。

1950. **Bagous** sp. 萍象蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：紅萍、槐葉萍。
分 佈：江西。

1951. **Baris deplanata** Roelofs 桑象 (Chang & Hung, :133; Hung et Hsieh, 1981:283-284; Liu, 1995:46-47; NZWDI, 1981:1084; Suzhou CS, 1985:182-184; Tao, 1980:256; Xiao, :565; Zheng, 1982[ed.]:182-184)
別 名：*桑短象鼻蟲*、*桑象甲*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、廣東、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、山東、遼寧；朝鮮、日本。
天 敵：*Eupelmus* sp. 桑象蟲旋小蜂(老熟幼蟲體外寄生，寄生率達20.6-68.2%)

1952. **Blosyrus asellus** Olivier 寬肩圓腹象 (Yunn., 1987:807)
寄 主：潘桃樹。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南；菲律賓、東埔寨、馬來半島、印尼、緬甸、印度次大陸。

1953. **Byctisus lacunipennis** Jekel 葡萄卷葉象 (Li et Zou, 1994(3):35)
寄 主：葡萄。
分 佈：江西。

1954. **Calomycterus obconicus** Chao 桑小灰象甲 (Guo et Zhang, 1993:302; Liu, 1988:18-19; NZWDI, 1981:1089; Suzhou, CS., 1985:188-189; Zheng, 1982[ed.]:188-198)
別 名：*棉小卵象*、*灰象蟲*。
寄 主：桑、棉、油菜、大豆、甘藷、苧麻、烏桕、楓楊、鐵莧菜及一些雜草。
分 佈：廣東、四川、浙江、江蘇、陝西、山東、河北。

1955. **Chlorophanus lineolus** Motschulsky 隆脊綠象 (Chao, 1982:188; Zhang, 1987[ed.] 2:61)
寄 主：柑橘、梨、桃、棉、向日葵、野薔薇、柳、楓楊。
分 佈：福建、江西。

1956. **Chlorophanus roseipes** Heller 紅足綠象 (Yunn., 1987:807)
寄 主：核桃、青岡。
分 佈：雲南、四川、陝西。

1957. **Cosmopolites sordidus** German 香蕉球莖象 (ASZI, 1986, 1:713; Chao, 1982:200; Chen, 1957:45-54; Huang, 1990[ed.] 2:287; Huang et Gao, 1996:271; NZWDI, 1981:1961; Tsai, 1995:32-34; Yunn., 1987:817; Zhao, 1993, 16(3):42-43; Zhou et Zhang, 1995:37-41)
別 名：*香蕉基象甲*、*香蕉根頸象*、*香蕉黑筒喙*、*香蕉球莖象鼻蟲*。
[Banana corm (root) borer weevil]
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南；菲律賓、馬來半島、澳洲。

1958. **Cryptorrhynchus** (s. str.) **insidiosus** Roelofs 松白星象蟲 (Chung & Hung, 1986:134)

別 名：*松白星象鼻蟲*。

寄 主：臺灣五葉松、琉球松、日本赤松、日本黑松。

分 佈：臺灣、福建、廣東、湖南；日本。

1959. **Cryptorrhynchus mangifera** (Fabricius)

寄 主：檬果。

分 佈：全世界檬果栽培區(除南北美洲外)。

1960. **Curculio arakawai** Matsumura et Kono 櫟實象 (Beijing FC., 1980[ed.]:370-371; Chao, 1982:196; Liu, 1982[ed.]:312-313; Wang, 1987[ed.]:231-233)

=*Curculio dentipes*

寄 主：麻櫟、板栗、栓皮櫟、蒙古柞、青崗櫟等殼斗科種實蛀害。

分 佈：福建、華南、華東、華北、東北。

1961. **Curculio davidi** Fairmaire 栗實象 (ASZI, 1986, 1:707; Beijing FC., 1980[ed.]:369-370; Chao, 1982:196; Chen et Wang, 1987:215; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:297-298; Huang, 1990[ed.] 2:349-351; Huang et Gao, 1996:264; Liu, 1982[ed.]:313-314; Liu et Kuan, 1996(3):44; NZWDI, 1981:1788; Wang, 1987[ed.]:231-233; Wang 1998(3):43-44; Xiao, 1992:571; Zhang, 1987[ed.] 2:62; Zhang et al., 1999:45)

=*Gurcaslis dentipes* Roelofs,

別 名：*栗象，板栗象甲，白花栗實象甲*。

寄 主：板栗、茅栗、錐栗、麻栗、栓皮栗(種實)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、東北。

1962. **Curculio dentipes** (Koelofs) 柞櫟象 (ASZI, 1986, 1:707; Xiao, 1992:573)

寄 主：板栗、柞櫟、麻櫟、栓皮櫟、蒙古櫟、遼東櫟。

分 佈：四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

1963. **Curculio hippophes** Zhang 沙棘象 (Chen, 1993(3):48)

寄 主：沙棘。

分 佈：陝西。

1964. **Curculio** sp. 檬果象 (Huang, 1990[ed.] 2:298-299; Huang, 1995, 18(2):9-10, 30; Luo et Li, 1998:60)

寄 主：檬果(專蛀幼嫩果實果核)。

分 佈：雲南、四川。

1965. **Cyllorhynchites ursulus** (Roelofs) 栗剪枝象 (Huang et Gao, 1996:263; Wang, 1987[ed.]:219-220; Zhang et al., 1999, 21(2):65-69;)

別 名：*剪枝櫟實象*。

寄 主：板栗、櫟類。

分 佈：福建、江西、四川、浙江、河南、山東、河北、遼寧、吉林。

1966. **Diocalandra frumenti** Fabricius 四斑小象 (Pingtung AC., 1986:70)

別 名：*椰子四紋小象鼻蟲*。

寄 主：可可椰子。
分 佈：臺灣。

1967. **Doporaus marginatus** Pascoe 剪葉象 (Huang, 1990[ed.] 2:299-300)
寄 主：橡果(葉)。
分 佈：廣東、廣西、雲南。

1968. **Dyscerus cribripennis** Matsumura et Kono 大粒橫溝象 (Wang, 1987[ed.]:209-210; Xiao, 1992:583; Zhao et al., 1997:189; Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：桃樹、榛、板栗、松樹、苦楝、香椿、油橄欖(廣西)、女貞。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川；日本。

1969. **Dyscerus juglans** Chao 核桃橫溝象 (ASZI, 1986, 1:704; Chen et Wang, 1987:206; Huang, 1990[ed.] 2:339-341; Wang, 1995:30; Xiao, 1992:584; Yunn.,1987:812)
別 名：*核桃根頸象*、*核桃黃斑象*。
寄 主：核桃(根際)、泡核桃、鐵核桃、夾核桃。
分 佈：福建、雲南、四川、河南、陝西、河北。
天 敵：寄生菌
白僵菌
黃蟻
寄生蠅

1970. **Ectatorrhinus adamsi** Pascoe 寬肩象 (Chao, 1982:192; Yunn., 1987:813)
寄 主：板栗、青麩楊。
分 佈：福建、江西、廣西、雲南、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、陝西。

1971. **Enaptorrhinus sinensis** Waterhouse 中華長毛象 (ASZI, 1986, 1:698; Zhang, 1987[ed.] 2:61)
寄 主：板栗、蘋果、梨、杉木、檫木。
分 佈：江西、浙江、山東、河北。

1972. **Episomoides** sp. (Chao, 1982:187)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

1973. **Episomus kwanhsiensis** Heller 灌縣蠣象 (Chao, 1982:187; Hun.,1992:620; Yunn., 1987:804)
寄 主：桑、蘋果樹、棕樹。
分 佈：雲南、廣西、四川、湖南、福建、浙江、江蘇。

1974. **Ergania doriae yunnanus** Heller 高隆象 (Xiao, 1992:589; Yunn., 1987:815)
別 名：*大豆高隆象*。
寄 主：核桃、蘋果、雲南松。
分 佈：廣西、雲南、四川、貴州、陝西。

1975. **Diocalandra frumenti** Fabricius 椰子小象 (Chen, 1975:447)

寄 主：可可椰子(葉柄、果穗)。
分 佈：臺灣。

1976. **Fissodes nitidus** Roelofs 松柏象 (Liu, 1982[ed.]:265-266)
寄 主：紅松、赤松。
分 佈：遼寧、黑龍江。

1977. **Gryllorhnobites ursulus** Roelofs 剪枝象 (Wang, 1998(3):43)
寄 主：板栗。
分 佈：陝西。

1978. **Haplorhynchites coerulens** (De Geer) 杏象 (Sun, 1984:377)
寄 主：杏。
分 佈：甘肅。

1979. **Hylobius abietis** Linnaeus 松大象 (Beijing FC., 1980[ed.]:167-168)
寄 主：落葉松、紅松、紅皮雲杉、雲南松等幼樹，糠椴、色木、槭、大黃柳、山楊、暴馬子等闊葉樹。
分 佈：雲南、四川、陝西、東北等省原始林內。

1980. **Hylobius abietis haroldi** Faust 松樹皮象 (Chan, 1982:191; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:220-221; Liu, 1982[ed.]:262-263; Xiao, 1992:591)
別 名：*松大象鼻蟲*。
寄 主：紅松、落葉松、雲南松、油松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉(幼樹皮部)、糠椴、色木槭、大黃柳、山楊、白丁香。
分 佈：雲南、四川、遼寧、陝西、寧夏、甘肅、新疆、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯亞洲部分。

1981. **Hypomeces squamosus** Fabricius 藍綠象 (ASZL, 1986, 1:699; Chang et Hung, 1986:134; Chao, 1982:188; Chen et al., 1993:34; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:267-268; Huang, 1990[ed.] 2:229; Huang et Gao, 1996:210; Hun., 1992:623; Hung, 1966:295; Liu, 1982[ed.]:171; Liu, 1993(1):13; Liu, 1995:41; Luo, 1991:86; Luo et Jin, 1995:86; Luo et Li, 1998:89; Luo et al., 1996:58; 1996:86; Wan, 1994(1):43; Xiao, 1992:592; Yunn., 1987:808; Zhang, 1985[ed.]:227-228; Zhang, 1987[ed.] 2:61; Zhang et Fu, 1999, 22(3):11-12)
別 名：*棉青大象鼻蟲、綠鱗象、大綠象、綠鱗象鼻蟲、綠絨象甲*。
寄 主：雜食性，柑橘、檸檬、梨、蘋果、桃、李、梅、杏、沙果、櫻桃、枇杷、檬果、蓮霧、葡萄、柿、板栗、酪梨、腰果、桑、咖啡、茶、馬尾松、油茶、銀樺皮樹、櫟、橡膠、榕樹、大葉按、檸檬桉、楓楊、烏桕、油桐、黃檀、牛助巴、臺灣相思、樟、刺槐、苦楝、泡桐、榆、柳、楓香、楊、油茶、瓜類、玉米、大豆、花生、綠豆、高粱、芝麻、向日葵、蓖麻、煙草、馬鈴薯、甘薯、蕹菜、甘蔗、棉花、小麥等百餘種林木、果樹和農作物，野生綠肥及雜草等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南；菲律賓、越南、柬埔寨、馬來半島、印尼、泰國、緬甸、印度次大陸。
天 敵：*Oecephylla smaragdina* Fabricis 黃柑蟻

1982. **Hyposipalus gigaus** Fabricius 松瘤象 (Chang & Hung, 1986:134; Chao, 1982:201; Xiao,

1992:593; Yunn., 1987:817)
Sipalus gigas Fabricius,
=*Spilus hypocrita*
=*Spilus misumensus*
別 名：*大象鼻蟲，臺灣大松象鼻蟲*。
寄 主：板栗、思茅松、馬尾松、赤松、臺灣二葉松、日本冷杉、山毛櫸、櫻、柏、楠、檜、杉等。
分 佈：福建、湖南、江西、廣東、雲南、江蘇；朝鮮、日本、菲律賓、泰國、馬來亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞。

1983. **Involvulus** sp. 蘋果截梢象 (Chen et al., 1988:188)
寄 主：蘋果(新梢)。
分 佈：陝西。

1984. **Involvulus** sp. 檬果藍卷葉象 (Zhou et Wang, 1990:101)
寄 主：檬果(葉片及嫩梢)。
分 佈：廣西。

1985. **Lepropus flavovittatus** Pascoe 黃條翠象 (Hun., 1992:623; Zhang, 1987[ed.] 2:62)
寄 主：柑橘、桑。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川；東南亞、印度。

1986. **Lepropus lateralis** Fabricius 金邊翠象 (Yunn, 1987:808)
寄 主：咖啡、雲南松、臺灣相思、油桐等。
分 佈：雲南、廣西、廣東、江西；柬埔寨、馬來半島、泰國、緬甸、印度次大陸。

1987. **Leptomias longicollis** Chao 長胸喜馬象 (ASZI, 1986, 1:700)
寄 主：蘋果。
分 佈：西藏。

1988. **Lepyrus japonicus** Reolofs 黃星象甲 (Chen et al., 1993:108)
寄 主：嫁苗木根系及插穗愈傷組織及皮層。
分 佈：河南、陝西、山西、河北。

1989. **Macrocorynus discoideus** Olivier 紅褐圓筒象 (Zhang, 1987[ed.] 2:61)
寄 主：松、杉。
分 佈：江西。

1990. **Macrocorynus psittacinus** Redtenbacher 大圓筒象 (ASZI, 1986, 1:694; Chao, 1982:187; Yunn., 1987:805; Zhang, 1987[ed.] 2:61)
寄 主：板栗、栓皮櫟、青岡。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、遼寧。

1991. **Mecyslobus** sp. 核桃果象甲 (Beijing FC., 1980[ed.]:377-378; NZWDI, 1981:1773; Wang, 1987[ed.]:196-197)

寄 主：核桃(嫩梢、果實) 主要害蟲之一。
分 佈：四川、湖北、河南、陝西。

1992. **Myllocerinus aurolineatus** Voss 茶麗紋象 (ASZI, 1986, 1:696; Chao, 1982:187; Hun., 1992:621; Zhang, 1985[ed.]:225-227; Zhang, 1987[ed.] (2):61)
別 名：*黑絲象蟲、小綠象鼻蟲、長角青象蟲*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、海棠、柑橘、栗、白櫟、茶、油茶、山茶、烏桕、洋槐、油桐、大豆、甘蔗、苧麻。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、安徽、江蘇、湖北、山東。

1993. **Myllocerinus vossi** (Lona) 淡褐麗紋象 (Yunn., 1987:805)
寄 主：楊梅、雲南松。
分 佈：雲南、四川、江西、江蘇。

1994. **Myllocerus discolor** Boh. 灰色尖筒象 (Luo, 1991:86; Luo et al., 1996:58)
寄 主：腰果(葉)。
分 佈：海南。

1995. **Neomyllocerus hedini** (Marshall) 鞍象 (ASZI, 1986, 1:694; Xiao, 1992:595; Yunn., 1987:804)
寄 主：核桃、蘋果、梨、棠梨、桃、火棘、麻櫟、青岡櫟、冬瓜木、蕨類、大豆、棉花等。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、陝西；越南。

1996. **Niphades castanes** Chao 板栗雪片象 (ASZI, 1986, 1:704; Henan, 1979:255-256; Huang, 1990[ed.] 2:352-353; Liu et Zhang, 1995, 21(5):51; Wang, 1987[ed.]:231-233; Wang, 1998(3):43-44; Xiao, 1992:596; Yin, 1998, 14(3):141Zhang, 1987[ed.] 2:63)
別 名：*栗雪片象*。
寄 主：板栗、油栗。
分 佈：江西、河南、陝西、甘肅。

1997. **Niphades verrucosus** (Voss) 多瘤雪片象 (Chao, 1982:191; Hun., 1992:628; Xiao, 1992:597; Zhang, 1987[ed.] 2 63)
寄 主：馬尾松、黑松、黃山松、華山松、濕地松、火炬松、金錢松。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、安徽、江蘇；日本。
天 敵：*Dolichomita* sp. 兜姬蜂(幼蟲,蛹)
絨繭蜂(幼蟲)
蟻(捕食地面成蟲)

1998. **Nyphades castanea** Chao 栗雪片象 (Chen et Wang, 1987:216)
寄 主：板栗。
分 佈：陝西。

1999. **Ochyromera miwai** Kono 柿潛葉象 (Chang & Hung, 1986:134)
別 名：*柿潛葉象鼻蟲*。

寄 主：柿。
分 佈：臺灣。

2000 **Odoiporus longicollis** Olivier 香蕉假莖象 (ASZI, 1986, 1:714; Huang, 1990[ed.] 2:288-289; Huang et Gao, 1996:270; Lee, 1959:3-10; Liu et Sun, 1956(4):13; Lo et al., 1986:265-267; Luo et Li, 1998:92; NZWDI, 1981: 1961; Tsai, 1995:35-37; Wang, 1957(3-4):19; Yunn., 1987:817; Zhao, 1993, 16(3):42-43;)
別 名：*香蕉雙帶扁象，香蕉扁黑象甲，香蕉長頸象，香蕉扁象，香蕉假莖象鼻蟲*。
[Banana stem borer weevil]
寄 主：香蕉、芭蕉。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、貴州；南亞、東南亞、東亞各國。

2001. **Peribleptus foveostriatus** (Voss) 窪紋雙溝象 (Yunn., 1987:812)
寄 主：核桃、櫟樹。
分 佈：廣西、雲南、四川、福建、浙江。

1002. **Piazomias lineicollis** Kono et Morimoto 三紋球象甲 (Chen et al., 1993:34)
寄 主：棗。
分 佈：安徽、河南、山東、陝西、山西、河北。

2003. **Piazamias validus** Motschulsky 大球胸象 (ASZI, 1986, 1:700; Chen et al., 1993:33)
寄 主：棗、蘋果、桑、榆、楊、柳、甘薯、大豆、馬鈴薯、檸條、荊條。
分 佈：安徽、河南、山東、陝西、山西、河北。

2004. **Pissodes nitidus** Roelofs 松黃星象 (Chang et Hung, 1986:135; Xiao, 1992:602)
別 名：*松梢象，紅木蠹象，松黃星象鼻蟲*。
寄 主：紅松、油松、樟子松、黑松、赤松。
分 佈：臺灣、河南、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2005. **Pissodes obscurus** Roelofs 松黑黃星象 (Chang et Hung, 1986:135)
別 名：*松黑黃星象鼻蟲*。
寄 主：黑松、赤松。
分 佈：臺灣；日本。

2006. **Pissodes validirostris** Gylllenhyl 樟子松木蠹象 (Beijing FC., 1980[ed.]:365-366; Chen et al., 1990, 1:81-84; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1998[ed.]:194-195; Li et Li, 1992:141-146; Liu, 1982[ed.]:311-312; Sun, 1959, 1:294-300; Wang et al., 1999, 1:27-30; Wang et al., 1990, 1:21-26; Wang et al., 1990, 1:27-30; Xiao, 1992:603; Yue et al., 1990, 1:1-12; Yue et al., 1990, 1:13-20; Yue et al., 1999, 1:31-42; Zhang et al., 1990, 1:75-80)
別 名：*樟子松球果象，松球果象*。
寄 主：樟子松球果(*Pinus sylvestris* L. var. *mongolica* Litv.)。
分 佈：內蒙古(大興安嶺)、海拉爾市；西伯利亞、歐洲北部、中部。
天 敵：*Scambus* sp. 象甲曲姬蜂

2007. **Pissodes** sp. 華山松木蠹象 (Chai et Liang, 1990:352-354)
寄 主：華山松。

分 佈：雲南。

2008. **Platymycteropsis mandarinus** Fairmaire 柑橘斜脊象 (ASZI, 1986, 1:696; Chao, 1982:188; Huang, 1990[ed.] 2:229; Hun., 1992:622; Luo et al., 1996:86; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Wan, 1994(1):43; Zhang, 1987[ed.] 2:61)
別 名：*小綠象蟲*。
寄 主：柑橘、蘋果、梨、桃、蓮霧、荔枝、板栗、桑、花生、大豆、棉花、油茶、油桐、刺槐、黃檀。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、湖北、陝西；越南。

2009. **Platymycterus sieversi** Reitter 長角小綠象 (Chao, 1982:188; Hung, 1966:296)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

2010. **Platymycteropsis walkeri** Marshall 圓窩斜脊象 (Hun., 1992:622)
寄 主：桃。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、上海。

2011. **Prodiocfes formosanus** Heller 臺灣坡象 (Chang & Hung, 1986:135)
寄 主：臺灣赤松。
分 佈：臺灣。

2012. **Rhynchophorus ferrugineus** (Olivier) 椰子象 (Chang & Hung, 1986:135; Luo et Li, 1998:22; Pingtung AC., 1986:65-66; Yunn., 1987:817)
別 名：*椰子大象鼻蟲*。
寄 主：可可椰子、棕櫚。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；菲律賓到斯里蘭卡等東南亞各國。

2013. **Scythropus yasumatsui** Kono et Morimoto 棗飛象 (ASZI, 1986, 1:697; Chen et Wang, 1987:214; Chen et al., 1993:29; Huang, 1990[e.d.] 2:314-415; Huang et Li, 1993:348-350; Niu et Chen, 1998:30; NZWDI, 1981:1783; Xiao, 1992: 607; Zhang et Miao, 1996(3):23)
別 名：*食芽象甲，棗芽象甲*。
寄 主：棗、桃、蘋果、梨、楊、泡桐。
分 佈：江蘇、河南、陝西、山西、山東、河北、甘肅、遼寧。

2014. **Shirahoshizo coniferae** Chao 球果角脛象 (Xiao, 1992:608)
別 名：*華山松球果象蟲*。
寄 主：華山松。
分 佈：四川、陝西。

2015. **Shirahoshizo flavonotatus** (Voss) 馬尾松角脛象 (Hun., 1992:629)
寄 主：馬尾松。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、江蘇、湖北。

2016. **Shirahoshizo patruelis** (Voss) 馬尾松角脛象 (Chao, 1982:183; Xiao, 1992:609; Zhang, 1987[ed.] 2:63)
=*Cryptorrhynchus insidiosus*
寄 主：馬尾松、黑松。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、江蘇、湖北；日本。

2017. **Sipalinus gigas** (Fabricius) 松瘤象 (Hun.,1992:625)
寄 主：板栗、馬尾松、杉、柏、榆。
分 佈：江西、湖南、廣東、江蘇、東北；寮國、緬甸、斯里蘭卡。

2018. **Sipalus hypocrita** Boheman 大抚皮隱頦象 (Zhang, 1987[ed.] 2:60)
寄 主：梨、栗、松、榆、柳、檜、櫸。
分 佈：江西。

2019. **Sitophilus zeamais** Motschulsky 玉米象 (Lan et al., 1998(4):10; Lan et al., 1999:43)
寄 主：蘋果(套袋)。
分 佈：山東。

2020. **Stelorrhinoides freyi** (Zumpt) 鋒喙象 (ASZI, 1986, 1:696; Chen et al., 1993:33)
寄 主：棗樹、高粱、粟、大豆、馬鈴薯、棉花、大麻、甘草。
分 佈：青海、陝西、山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江。

2021. **Sternochetus frigidus** (Fabricius) 果肉檬果象 (ASZI, 1986, 1:706; Huang, 1995, 18(2):3-7;Luo et Li, 1998:57; Wang, 1995, 21(2):33; Yunn., 1987:814)
寄 主：檬果(果肉)。
分 佈：雲南；泰國、印度、巴基斯坦、印尼、巴布亞新幾內亞。

2022. **Sternochetus olivieri** (Faust) 檬果果核象 (ASZI, 1986, 1:707; Huang, 1995, 18(2):7-9; Yunn., 1987:814)
寄 主：檬果。
分 佈：雲南；越南、柬埔寨。

2023. **Styanax apicatus** Heller 梨鐵象 (ASZI, 1986, 1:703; Feng, 1980:209-210, 207; Yunn., 1987:811; Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：梨、核桃、木荷、櫟。
分 佈：江西、雲南、貴州、湖南；柬埔寨。

2024. **Sympiezomias chenggongensis** Chao 呈貢灰象 (Chao, 1977:226)
Sympiezomias chenggongensis Chao, 1977:226.
寄 主：油橄欖。
分 佈：雲南。

2025. **Sympiezomias citri** Chao 柑橘灰象 (ASZI, 1986, 1:700; Ai, 1998(4):23; Chao, 1982:189; Chao, 1977:225; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hung, 1960:16-17; Huang, 1990[ed.] 2:230-232; Huang et Gao, 1996:209; Liu, 1993(1):13; Luo et al., 1996:58; NZWDI, 1981:1944; Wan, 1994(1):43; Wang et al., 1993:25; Ye, 1997, 14(1):44; Zhang, 1987[ed.] 2:62)
Sympiezomias citri Chao, 1977:225.
別 名：*柑橘大灰象甲，灰鱗象甲，泥翅象甲。*
寄 主：柑橘(果、葉)、梨、桃、李、梅、櫻桃、枇杷、檬果、龍眼、荔枝、棗、桑、樟、楊、刺槐、泡桐、油茶、榆、茉莉花、茶、棉、花生、大豆、向日葵、野苧麻等葉。

分 佈：福建、江西、海南、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽、湖北。

2026. **Sympiezomias cribriellis** Kono 細腰葫形象鼻 (Chu, 1971:74)
Sympiezomias cribriellis Kono, 1930:153-237.
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣；日本。

2027. **Sympiezomias guangxiensis** Chao 廣西灰象 (Chao, 1977:225; Hun., 1992:624)
Sympiezomias guangxiensis Chao,1977:225.
寄 主：油橄欖、油茶、十大功勞。
分 佈：廣西、湖南。

2028. **Sympiezomias leweisi** Roel. 大灰象 (Huang, 1966:294; Huang, 1990[ed.] 2:81-82; Zhao et al., 1998(4):29)
寄 主：雜，蘋果、梨、桃、柑橘、栗等果樹苗木，棉、麻、甜菜、糧、豆類、瓜類等。
分 佈：福建、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林。

2029. **Sympiezomias velatus** (Chevrolat) 大灰象 (ASZI, 1986, 1:699; Beijing FC., 1980[ed.]:164-165; Chen et al., 1993:31; Hu et al., 1996(2):52-53; Liu, 1982[ed.]:169-170; Liu, 1996(2):53; Xiao, 1992:610)
寄 主：雜食，蘋果、棗、核桃、板栗、桑樹、紫穗槐、刺槐、洋槐、檸條、荊條、加楊、棉花、榆、甘薯、大豆、馬鈴薯、甜菜幼苗，寄主植物有 41 科 70 屬 101 種。
分 佈：安徽、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本。
天 敵：小蜂(二種,寄生卵,寄生率 60 % 左右)
細蜂(一種,寄生卵)

2030. **Xanthochelus faunus** (Olivier) 大肚象 (Yunn., 1987:810)
寄 主：板栗、石榴樹。
分 佈：福建、浙江、廣東、廣西、雲南、四川。

2031. **Xylinophorus mongolicus** Faust 蒙古象 (ASZI, 1986, 1:699; Beijing, FC., 1980[ed.]:165; Chen et al., 1993:35; Suzhou, CS., 1985:185-186; Xiao,1992:612; Zheng, 1982[ed.]:185-186; Zhu et Lu, 1997(1):25)
別 名：*蒙古土象*。
寄 主：雜食，有 36 科 74 屬約 90 種之多，對板栗、核桃、梨、桃、杏樹、棗、桑、紫穗槐、洋槐、刺槐、加楊、甜菜、大豆、豌豆、花生、棉花、玉米、高粱、瓜類等最喜取食。
分 佈：山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯。

Anthribidae 長角象科

2032. **Araecerus fasciculatus** (De Geer) 長角象 (Chao, 1982:202; Chen et al., 1993:75; Tsai, 1965:148)

別 名：*咖啡豆象，棉鬚象蟲*。
寄 主：柑橘、香蕉、咖啡、可可、紅棗、乾果、樹薯、蒜頭、肉豆蔻、豆類種子、豇豆、甘藷簽、玉米、花生、藥材、倉內、野外都能爲害。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、江蘇、湖北、河南、山東；日本、琉球、越南、印尼、蘇門答臘、印度。

Platypodidae 長小蠹科

2033. **Crossotarsus externe-dentatus** Fai. 黑尾長小蠹 (Chang et Hung, 1986:135)
寄 主：木瓜、柳、杉、樟、烏桕、銀合歡。
分 佈：臺灣、夏威夷、斐濟、大溪地。

2034. **Crossotarsus niponicus** Bdafor 日本長小蠹 (Chang et Hung, 1986:135)
別 名：*谷地柳長小蠹蟲*。
寄 主：胡桃、楓、赤楊、水青岡。
分 佈：臺灣、中國大陸、日本。

2035. **Crossotarsus wallacei** Thomson 華萊斯長小蠹 (Chung et Hung, 1986:136)
寄 主：咖啡、合歡。
分 佈：臺灣、馬來亞、印尼。

2036. **Diapus formosanus** Niijina 臺灣刺長小蠹 (Chang et Hung, 1986:136)
寄 主：番石榴、小西氏石櫟。
分 佈：臺灣。

2037. **Diapus truncatus** Niijima et Murayama 截長小蠹 (Chang et Hung, 1986:136)
寄 主：川上氏錐栗。
分 佈：臺灣。

2038. **Platypus formosanus** Niijima et Murayama 臺灣長小蠹 (Chang et Hung, :136)
寄 主：番石榴、山柏、烏皮九芎。
分 佈：臺灣。

2039. **Platypus niijimae** Murayama 新島氏長小蠹 (Chang et Hung, 1986:136)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

2040. **Platypus solidus** Walker 尖翅長小蠹 (Chang et Hung, 1986:137)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣；朝鮮、菲律賓、巽他群島、摩鹿加群島、西里伯、馬來亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Scolytidae 小蠹科

2041. **Blastophagus minor** Hartig 松小蠹 (Chang et Hung, 1986:137; Wei, 1959:237-238; Zhou,

1983: 136; Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：馬尾松、油松。
分 佈：臺灣、江西、中國大陸。

2042. **Blastophagus pilifer** Spess 紅松切梢小蠹 (Wang, 1981:165-167)
寄 主：紅松。
分 佈：黑龍江。

2043. **Blastophagus piniperda** Linnnaeus 縱坑切梢小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:321-322; Chao, 1982:204; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:218-220; Liu, 1982[ed.]:280-281; Zhou, 1983:136; Zhang, 1987[ed.] 2:63)
寄 主：馬尾松、華山松、雲南松、油松、赤松、黑松、樟子松。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、安徽、河南、陝西、山東、河北、西北、遼寧、吉林、黑龍江。

2044. **Cryphalus (Jugocryphalus) chinlingensis** Tsai et Li 秦嶺梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603, 612)
寄 主：華山松。
分 佈：四川、陝西。

2045. **Cryphalus exignus** Blandfrod 桑梢小蠹 (Chang et Hung, 1986:137; Liu, 1995:50-51; Suzhou, CS., 1985:184-185; Tsai et Li, 1963:603; Zheng, 1982[ed.]:184-'85)
Cryphalus exignus Blandfor, 1894:
別 名：*桑枝小蠹*。
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣、四川、貴州、江蘇、陝西、山東、河北、北京；朝鮮、日本。

2046. **Cryphalus (Jugocryphalus) fulvus** Niijima 黃小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:326; Chang et Hong, 1986:137; Tsai et :Li, 1963:603)
Cryphalus fulvus Niis., 1908:
=*Cryphalus pini* Egg., 1921:
別 名：*黃色梢小蠹*、*馬尾松梢小蠹*。
寄 主：馬尾松、油松、華山松、雲南松、日本黑松、黑皮油松(*Pinus tabulaeformis mukdensis*)、雲杉。
分 佈：臺灣、四川、江蘇、安徽、朝鮮、日本。

2047. **Cryphalus (Jugocryphalus) jeholensis** Mur. 熱河梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603)
Cryphalus jeholensis Mur., 1939:
寄 主：油松。
分 佈：河北；日本。

2048. **Cryphalus** (s. str.) **latus** Egg. 落葉松梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:602)
Cryphalus latus Egg., 1929:
寄 主：落葉松(*Larix dahurica*)。
分 佈：黑龍江；蘇聯。

2049. **Cryphalus (Acryphalus) lipingensis** Tsai et Li 華山松梢小蠹 (Tsai et Li, 1963: 604, 616)

Cryphalus (Acryphalus) lipingensis Tsai et Li, 1959:604.
寄 主：華山松。
分 佈：四川、陝西。

2050. **Cryphalus** (s. str.) **malus** Niis 果木梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:602)
Cryphalus malus Niis, 1909:
寄 主：杏(*Armaniaca* sp.)。
分 佈：遼寧；日本。

2051. **Cryphalus (Jugocryphalus) massonianus** Tsai et Li 馬尾松梢小蠹 (Hun., 1992:633; Tsai et Li, 1963: 603, 613)
Cryphalus (Jugocryphalus) massonianus Tsai et Li, 1963:603, 613.
寄 主：馬尾松、雲南松、思茅松。
分 佈：廣東、四川、湖南、浙江、江蘇。

2052. **Cryphalus piceae** Ratzeberg 唐檜小蠹 (Chang et Hung, 1986:137)
寄 主：松類、檜類。
分 佈：臺灣。

2053. **Cryphalus piceus** Linnaeus 馬尾松梢小蠹 (Liu, 1982[ed.]:280)
別 名：*松黃小蠹*。
寄 主：馬尾松、油松、華山松、雲南松、雲杉。
分 佈：華東、華北、西北。

2054. **Cryphalus (Jugocryphalus) pseudochinlingensis** Tsai et Li 偽秦嶺梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:610)
Cryphalus (Jugocryphalus) pseudochinlingensis Tsai et Li, 1963:610.
寄 主：華山松、油松。
分 佈：陝西。

2055. **Cryphalus (Jugocryphalus) pseudotabulaeformis** Tsai et Li 偽油松梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603, 613)
Cryphalus (Jugocryphalus) pseudotabulaeformis Tsai et Li, 1963:603, 613.
寄 主：油松。
分 佈：陝西、北京。

2056. **Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis** Tsai et Li 雲南松梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603, 614)
Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis Tsai et Li, 1963:603, 614.
寄 主：雲南松。
分 佈：四川。

2057. **Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis tehchangensis** Tsai et Li 德昌雲南松梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603, 615)
Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis tehchangensis Tsai et Li, 1963:603, 615.
寄 主：雲南松。
分 佈：四川(德昌)。

2058. **Cryphalus (Jugocryphalus) tabulaeformis** Tsai & Li 油松梢小蠹 (Tsai & Li, 1963:603)

Cryphalus (Jugocryphalus) tabulaeformis Tsai & Li, 1963:603, 609.

寄 主：油松(*Pinus tabulaeformis*)。

分 佈：河北(秦皇島)。

2059. **Cryphalus tabulaeformis chenzhuangensis** Tsai et Li 建庄油松梢小蠹 (Tsai & Li, 1963:603; Xiao, 1992:615)

Cryphalus (Jugocryphalus) tabulaeformis chenzhuangensis Tsai & Li, 1963:603, 610.

寄 主：油松。

分 佈：陝西(建庄)。

2060. **Cryphalus (Jugocryphalus) pseudochinlingensis** Tsai et Li 偽秦嶺梢小蠹 (Tsai et Li, 1963:603,610; Xiao, 1992:615)

Cryphalus (Jugocryphalus) pseudochinlingensis Tsai et Li, 1963:603, 610.

寄 主：華山松(*Pinus armandi*)、油松。

分 佈：陝西(石泉建庄)。

2961. **Dendroctonus armandi** Tsai et Li 華山松大小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:319-321; Liu, 1982[ed.]:279-280; Xiao, 1992:616; Zhou, 1983:134)

寄 主：華山松、油松、青杆。

分 佈：四川、湖北、河南、陝西、甘肅、。

天 敵：蟎類

步行蟲

郭公蟲

隱翅蟲

閻魔蟲

蟻

食蟲鳥

菌類

線蟲

Braconidae 繭蜂科

Coeloides qinlingensis Dang et Yang 秦嶺鞭繭蜂(幼蟲)

Spathius sp. 松蠹柄腹繭蜂(幼蟲)

大小蠹繭蜂

Torymidae 長尾小蜂科

松蠹長尾金小蜂

Roptrocerus mirus (Walker) 奇異長尾金小蜂(幼蟲)

Roptrocerus qinlingensis Yang 松蠹長尾金小蜂(幼蟲)

Dinotiscus armandi Yang 松蠹狄金小蜂(幼蟲)

Tomicobia liaoi Yang 廖氏截尾金小蜂(成蟲)

2062. **Dryocoetes hectographus** Reitt. 雲杉毛小蠹 (Zhou, 1983:136)

寄 主：青杆、巴山冷杉、華山松、油松。

分 佈：西北。

2063. **Dryocoetes luteus** Blandford 額毛小蠹 (Hua, 1992:635)

寄 主：油松、馬尾松、雲南松、高山松。
分 佈：福建、湖南、廣東、南海、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、河南、陝西；日本。

2064. **Dryocoetes nubilus** Blandford 疊小蠹 (Chang et Hung, 1986:137)
寄 主：松類。
分 佈：臺灣、日本、朝鮮。

2065. **Hylastes parallelus** Chap. 黑根小蠹 (Zhou, 1983:134)
寄 主：華山松、油松、青杆。
分 佈：西北。

2066. **Hylesinus fraxini** Panzer 水曲柳花小蠹 (Xiao, 1992:618)
寄 主：核桃、大葉白蠟、水曲柳、榛子、櫟、山毛櫸及其他闊葉樹。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲。

2067. **Hylurgops longipilis** Reitt. 長毛絨根小蠹 (Zhou, 1983:136)
寄 主：華山松、油松、馬尾松。
分 佈：西北。

2968. **Hylurgops major** Eggers 大幹小蠹 (Hun., 1992:632)
寄 主：華山松、馬尾松、雲南松、高山松。
分 佈：湖南。

2069. **Hypothenemus birmanus** (Eichhoff) 緬甸咪小蠹 (Hun., 1992:634; Yunn., 1987:842)
寄 主：葡萄、枇杷、海棠、石榴、樟、楠、椿。
分 佈：福建、湖南、海南、廣西、雲南、四川、貴州、江蘇；菲律賓、越南、印尼、緬甸、亞洲南部、夏威夷、美國東南部。

2070. **Hypothenemus erectus** Leconte 核桃咪小蠹 (Yunn., 1987:842)
寄 主：核桃、木香。
分 佈：雲南、陝西、河南、河北；美國東部沿海。

2071. **Hypothenemus crudiae** (Panzer) 平額咪小蠹 (Yunn., 1987:841)
寄 主：核桃、桃、桑、印度栲、橡膠、三葉豆、麻、鐵刀木、刺藤。
分 佈：福建、雲南、四川；夏威夷、北美、中美、南美、非洲。

2072. **Hypothenemus eruditus** Westwood 小咪小蠹 (Hun., 1992:634; Yunn., 1987:841)
寄 主：桃、蘋果、核桃、柑橘、葡萄、樟、刺藤、橡膠、楓、鐵刀木、鹽膚木、三葉豆等。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、山東、甘肅、河北；亞洲、澳洲、非洲、歐洲、北美、南美。

2073. **Hypothenemus ingens** Schedl 堤額咪小蠹 (Yunn., 1987:842)
寄 主：腰果、高山松。
分 佈：廣東、雲南；印尼。

2074. **Hypothenemus javanus** (Eggers) 洼額咪小蠹 (Han., 1992:634)

寄 主：檬果、葡萄、樟、楠、櫟、蓖麻等。

分 佈：湖南、海南、廣西、雲南、西藏、四川；越南、印尼。

2075. **Ips acuminatus** Gyllenhal 六齒小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:322; Han., 1992:634; Li, 1959:75; Liu, 1982[ed.]:281-282; Xiao, 1992:619)

寄 主：有 5 屬 21 種，限于紅松、華山松、樟子松、思茅松、高山松、馬尾松、油松、落葉松、雲杉等屬針葉樹。

分 佈：雲南、四川、湖南、陝西、甘肅、河南、陝西、山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

2076. **Ips angulatus** Eichhoff 琉球松小蠹 (Chang et Hang, 1986:137)

寄 主：琉球松、馬尾松。

分 佈：臺灣。

2077. **Ips cembrae** Heer 松幹小蠹 (Chang et Hang, 1986:137)

寄 主：馬尾松、黑松、落葉松。

分 佈：臺灣、東北。

2078. **Ips duplicatus** Sahlb. 重齒小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:325-326; Xiao, 1992:620)

別 名：*復小蠹*、*雙岐小蠹*。

寄 主：雲南松、高山松、紅皮雲杉、興安落葉松、長白落葉松、西伯利亞落葉松。

分 佈：雲南、內蒙古、吉林、黑龍江(東北大小興安嶺和長白山等地原始森林內)；蘇聯。

天 敵：病原菌(一種)

郭公蟲

Braconidae 繭蜂科

絨繭蜂

寄生蜂二種

2079. **Ips mansfieldi** Wachtl. 曼氏重齒小蠹 (Zhou, 1983:136)

寄 主：華山松、青杆、巴山冷杉。

分 佈：西北。

2080. **Ips nitidus** Eggers 光臀八齒小蠹 (Xiao, 1992:623)

寄 主：岷江冷杉、雲杉、青海雲杉、天山雲杉、川西雲杉、高山松。

分 佈：雲南、四川、青海、甘肅、新疆。

天 敵：步甲

郭公蟲

啄木鳥(黑啄木鳥,斑啄木鳥)

菌類

Tabaniidae 寄蠅科

寄蠅(對幼蟲寄生率達 15%)

2081. **Ips sexdentatus** Boerner 十二齒小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:323; Li, 1959:76; Xiao, 1992:625; Zhou, 1983:136)
寄 主：紅松、華山松、樟子松、油松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉、落葉松。
分 佈：雲南、四川、陝西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯、歐洲。

2082. **Ips subelongatus** Motschulsky 落葉松八齒小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:324-325; Li, 1959:76; Liu, 1982[ed.]:282-283; Xiao, 1992:626)
寄 主：落葉松、紅松、雲杉。
分 佈：雲南、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲。
天 敵：肉食蟎
紅胸郭公蟲
條圈閻甲
大斑啄木鳥
線蟲
Braconidae 繭蜂科
Coeliodes sp. 褐絨繭蜂(幼蟲,寄生率可達 28%)
Pteromalidae 金小蜂科
金小蜂(越冬幼蟲寄生率可達 11%)

2083. **Ips typographus** Linnaeus 雲杉八齒小蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:323-324; Liu, 1982[ed.]:283-284)
寄 主：紅皮雲杉、雪嶺雲杉、魚鱗松、紅松、落葉松。
分 佈：四川、山西、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

2084. **Myelophilus piniperda** Linnaeus 松小蠹 (Chang et Hung, 1986:137; Wei, 1959:237-238)
寄 主：日本赤松、馬尾松等松類。
分 佈：臺灣、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、北美洲。

2085. **Orthotomicus erosus** Wollaston 松瘤小蠹 (Hun., 1992:635)
寄 主：油松、馬尾松、雲南松、思茅松。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、江蘇、安徽、山東、河南、陝西、遼寧；阿富汗、伊朗、敘利亞、土耳其、希臘、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙、利南斯拉夫、奧地利、德國、法國、西班牙。

2086. **Orthotomicus laricis** Fabricius 邊齒瘤小蠹 (Zhou, 1983:136)
寄 主：華山松、油松。
分 佈：西北。

2087. **Orthotomicus suturalis** Gyllenhyl 近齒瘤小蠹 (Zhou, 1983:136)
寄 主：華山松、油松。
分 佈：西北。

2088. **Pityogenes chalcographus** Linnaues 中穴星坑小蠹 (Xian, 1992:632)
寄 主：紅松、樟子松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉、雪嶺雲杉、及其它針葉樹。
分 佈：四川、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2089. **Polygraphus sinensis** Eggers 油松四小蠹 (Zhou, 1983:136)
寄 主：華山松、油松、鐵杉。
分 佈：西北。

2090. **Scolytoplatypus mikado** Blandford 大和銼小蠹 (ASZI, 1986, 1:744; Chang et Hung, 1986:138)
別 名：*帝小蠹蟲，水青岡小蠹*。
寄 主：山桃、臺灣蘋果、猴高鐵、潤楠、山茶、柳杉、孟宗竹、樟、栲皮樹、臺灣赤蘭、紅皮、毛水錦樹、竹筍。
分 佈：福建、四川；日本、濟州島。

2091. **Scolytoplatypus pubescens** Hagedorn 深毛小蠹 (Chang et Hung, 1986:138)
寄 主：山紅柿、紅皮、奎寧樹、澀葉榕、水金京。
分 佈：臺灣、印度。

2092. **Scolytoplatypus raja** Blandford 毛刺銼小蠹 (Hun., 1992:639; Yunn., 1987:853)
寄 主：板栗、絲栗、油松、華山松、雲杉、楊柳、香樟、臭樟、潤楠、紅櫟、合歡、五倍子、洋槐、漆樹。
分 佈：湖南、雲南、西藏、四川、貴州、陝西；越南、印度。

2093. **Scolytoplatypus sinensis** Tsai et Hwang 中國對小蠹 (Chang et Hung, 1986:138)
寄 主：桃、楠木、桯木、山茶類。
分 佈：臺灣、中國大陸。

2094. **Scolytus (s. str.) aratus** Blandford 梅小蠹 (Tsai et al., 1962:8)
Scolytus aratus Blandford, 1894:79.
寄 主：梅、榆。
分 佈：黑龍江、朝鮮、日本、蘇聯濱海省。

2095. **Scolytus japonicus** Chapuis 果樹小蠹 (ASZI, 1986, 1:719; Tsai et al., 1962:12)
Scolytus japonicus Chapuis, 1875:199.
寄 主：梨、蘋果、桃、榆葉梅、杏、櫻桃、李。
分 佈：四川、陝西、河北、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蘇聯遠東地區。
天 敵：*Rhaphitelus maculatus* Walker 桃蠹棍角金小蜂
Theocolax phloeosini Yang 柏蠹紋形金小蜂

2096. **Scolytus (Ruguloscolytus) morawitzi** Sem. 落葉松小蠹 (Tsai et al., 1962:9)
寄 主：落葉松。
分 佈：黑龍江；俄羅斯遠東及歐洲部分。

2097. **Scolytus pomi** Yin et Huang 櫻小蠹 (Yin et Huang, 1980:50; Yunn., 1987:836)
Scolytus pomi Yin et Huang, 1980:50.

寄 主：桃、毛櫻桃(*Prunus tomentosa*)、滇池海棠(*Malus yennanensis*)、山荊子(*Malus* sp.)
分 佈：雲南、西藏。

2098. **Scolytus nitidus** Schedl 西藏小蠹 (ASZI, 1986, 1:717)
寄 主：杏。
分 佈：西藏；印度。

2099. **Scolytus rugulosus** Ratzeburg 皺小蠹 (ASZI, 1986, 1:719; Zhao et al., 1984:27-29)
寄 主：蘋果、梨、桃、扁桃、梅、櫻桃、杏、李、海棠、及其他薔薇科果樹。
分 佈：新疆；蘇聯、土耳其、法國、美國、智利、阿根廷、秘魯。

2100. **Scolytus** (s. str.) **seulensis** Murayama 多毛小蠹 (ASZI, 1986, 1:717; Li et al., 1995, 21(1):8-10; Wang et al., 1998(2):11-13; Yang et Zhou, 1998(1):35)
Scolytus seulensis Murayama, 1930:9.
=*Scolytus pubescens* Stark, 1936:141.
=*Scolytus kirsehi* Tsai & Li, 1959:75. (*nec* Skalitzki).
寄 主：杏、桃、李、梨、櫻桃、榆、檸條(*Caragana karshinskii*, 豆科)、錦雞兒。
分 佈：江蘇、河南、陝西、寧夏、甘肅、山東、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、俄羅斯濱海省。
天 敵：*Cheiropachus quadram* (Fabricius) 桃蠹四斑金小蜂(幼蟲)

2101. **Sphaerotrypes coimbatorensis** Stebbing 黃須球小蠹 (ASZI, 1986, 1:724; Beijing FC., 1980[ed.]:181-182; Chen et Wang, 1987:201, Chou, 1983:134, Huang, 1990[ed.] 2:341-342; Hun., 1992:633; NZWDI, 1981:1774; Wang, 1987[ed.]:190-191; Wang, 1995:29; Xiao, 1992:635)
別 名：*核桃小蠹*。
寄 主：核桃(爲害混合芽)、楓楊。
分 佈：四川、湖南、安徽、河南、陝西、山西、河北、遼寧；印度。
天 敵：*Rhaphitelus maculatus* Walker 桃蠹棍角金小蜂(幼蟲)
Rhopalicus brevicrnis Thomson 細角金小蜂(幼蟲)

2102. **Sphaerotrypes juglansi** Tsai et Yin 胡桃球小蠹 (ASZI, 1986, 1:725)
寄 主：胡桃、楓楊。
分 佈：安徽、陝西。

2103. **Sphaerotrypes pyri** Tsai et Yin 杜梨球小蠹 (Yunn., 1987:839)
寄 主：杜梨。
分 佈：雲南。

2104. **Sueus niisimai** Eggers 小毛喙小蠹 (Yunn., 1987:839)
寄 主：核桃、刺藤、蓖麻、橡膠、莽橘子、柞刺。
分 佈：福建、廣東、雲南、四川；印尼。

2105. **Tomicus minor** (Hartig) 橫坑切梢小蠹 (Hun., 1992:632; Xiao, 1992:636)
Blastophagus minor Hartig,

寄　主：紅松、馬尾松、黑松、油松、雲南松、糖松。
分　佈：雲南、四川、湖南、江西、陝西、甘肅、河南、山西、河北；朝鮮、日本、蘇聯、丹麥、法國、北美洲。

2106. **Tomicus pilifer** Spesivtseff 多毛切梢小蠹 (Xiao, 1992:636)
寄　主：紅松、油松。
分　佈：北京、黑龍江；蘇聯。

2107. **Tomicus piniperda** (Linnaeus) 縱坑切梢小蠹 (Hun.,1992:632; Xiao, 1992:637)
Blastophagus piniperda Linnaeus,
寄　主：馬尾松、赤松、華山松、雲南松、油松、黑松、樟子松等。
分　佈：雲南、四川、貴州、湖南、浙江、江蘇、陝西、河南、山東、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)、蒙古、荷蘭、瑞典、芬蘭、北美洲。
天　敵：蛇蛉(一種，捕食卵、幼蟲、蛹)
螻蛄(一種，捕食梢內成蟲)
蠟蜻(一種,主要捕食幼蟲)
隱翅蟲(一種)
閻魔蟲(一種)
郭公蟲(一種)
穀盜(一種，捕食蛹及新成蟲)

2108. **Xyleborus adumbratus** Blandford 棋盤材小蠹 (Hun., 1992:636)
寄　主：松、冷杉、楓、楓楊、楠、木荷等。
分　佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、陝西；日本。

2109. **Xyleborus amputatus** Blanndford 音菩木蠹 (Chung et Hung, 1986:138)
寄　主：山紅柿、樟樹、烏樟、紅皮。
分　佈：臺灣、日本。

2110. **Xyleborus aouilus** Blandford 狹面材小蠹 (Hun., 1992:638)
寄　主：蘋果、馬尾松、楨楠、木荷、油桐。
分　佈：湖南。

2111. **Xyleborus apicalis** Blandford 端齒材小蠹 (Yunn., 1987:851)
寄　主：板栗、無花果、柳、栲、櫟、楨楠、木荷、鵝耳櫪、小蘗、杜鵑。
分　佈：廣西、雲南、西藏、四川、安徽、陝西、河南；日本。

2112. **Xyleborus aquilus** Blandford 橡膠材小蠹 (Luo, 1991:86)
寄　主：腰果(枝)
分　佈：海南。

2113. **Xyleborus atratus** Eichhoff 黑小蠹 (Chang et Hung, 1986:138)
別　名：*桑木蠹蟲*。
寄　主：琉球松、桑、赤楊、榆。
分　佈：臺灣；日本、朝鮮。

2114. **Xyleborus compactus** Eichhoff 小滑材小蠹 (Hun., 1992:636; Yunn.,1987:850)

寄 主：板栗、咖啡、酸棗、鹽膚木、棉屬植物。

分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州；日本。

2115. **Xyleborus discolor** Blandford 雙色材小蠹 (ASZI, 1986, 1:743; Yunn., 1987:852)

寄 主：檬果、絲栗、栲、紅楠、槐、臭椿、鹽膚木。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2116. **Xyleborus dispar** Fabricius 北方材小蠹 (ASZI, 1986, 1:742)

寄 主：胡桃、蘋果、梨、花楸、李、鵝耳櫪、榛、水青岡、麻櫟、槭、水曲柳。

分 佈：黑龍江；亞洲北部、歐洲。

2117. **Xyleborus emarginatus** Eichhoff 凹緣材小蠹 (ASZI, 1986, 1:738; Chao, 1982:205; Hun., 1992:636; Yunn., 1987:847)

寄 主：雲南松、油松、馬尾松、無花果、榕樹、冷杉、楊、栲、櫟、樟。

分 佈：福建、湖南、雲南、西藏、四川、湖北、陝西；越南、緬甸、歐洲。

2118. **Xyleborus fornicatus** Eichhoff 小圓胸木蠹 (Chang et Hung, 1986:138; Luo et He, 1990:95-99)

別 名：*茶材小蠹、茶枝小蠹。*

寄 主：荔枝、咖啡、可可、金寧樹、肉豆蔻。

分 佈：臺灣、廣東、馬來群島、印度、斯里蘭卡。

2119. **Xyleborus germanus** Blandford 光滑材小蠹 (ASZI, 1986, 1:740; Chao, 1982:205; Yunn., 1987:850)

寄 主：山桃、雲南松、絲栗、冷杉、印度栲、櫟、楨楠、潤楠、杓樟、鐵刀木、鹽膚木(五倍子)、槭、鵝耳櫪、酸棗、木荷、木香子、杜鵑、棕櫚。

分 佈：雲南、西藏、四川、湖南、福建、安徽、陝西、河南；朝鮮、日本、歐洲、北美。

2120. **Xyleborus interjectus** Blandford 坡面材小蠹 (Chao, 1982:205; Xiao, 1992:639; Yunn., 1987:849;)

寄 主：無花果、梨、柿、馬尾松、楊、中國梧桐、印度栲、楨楠、樟、鵝兒櫪、棱骨木等。

分 佈：福建、廣東、海南、雲南、四川、貴州、湖南；日本、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

天 敵：真菌

金龜子綠僵菌(5%,寄生幼蟲,蛹,成蟲)

球孢白僵菌(90%,寄生幼蟲,蛹,成蟲)

寄生蟎(一種,寄生成蟲體節間)

2121. **Xyleborus lewisi** Blandford 瘤粒材小蠹 (ASZI, 1986, 1:742; Chang et Hung, 1986:139; Yunn., 1987:851)

別 名：*來維斯木蠹蟲*。
寄 主：無花果、野櫻桃、雲南松、楊、柳、榿、印度栲、櫟、臭椿、毛桐。
分 佈：廣東、雲南、西藏、四川；日本；東洋區、澳洲區。

2122. **Xyleborus morsfatti** Hageman 咖啡黑枝小蠹 (Luo et Li, 1998:37)
寄 主：咖啡、酪梨、可可、檬果、臺灣相思。
分 佈：臺灣、廣東、海南。

2123. **Xyloterus lineatum** Oliv. 黑條木小蠹 (Zhou, 1983:136)
寄 主：華山松、青杄、落葉松、白皮松等。
分 佈：西北。

2124. **Xyleborus mutilatus** Blandford 削尾材小蠹 (Yunn., 1987:853)
寄 主：板栗、紅豆樹、木犀、山茶。
分 佈：雲南、四川、浙江、安徽；日本、東洋區。

2125. **Xyleborus perforans philippinensis** Eichhoff 菲律賓木蠹 (Chang et Hung, 1986:139)
寄 主：椰子。
分 佈：臺灣、菲律賓、印度、波納佩島(Ponape)。

2126. **Xyleborus rubricollis** Eichhoff 瘤胸材小蠹 (ASZI, 1986, 1:743; Yunn., 1987:852)
寄 主：核桃、柿、野桃、樟、洋槐、水白蠟、黑荆樹、楠、野桐、槐、楓楊、白楊、冷杉、杉木、側柏、水冬瓜、木荷、女貞、栲、荆條。
分 佈：雲南、西藏、四川、湖南、福建、浙江、安徽、江蘇、陝西、山東、北京、河北。

2127. **Xyleborus saxeseni** Ratzeberg 小粒材小蠹 (Hun., 1992:635; Yunn., 1987:846)
寄 主：紅松、華山松、無花果、蘋果、柿、山楂、鐵杉、雲杉、楊、櫟、槙楠、漆屬、椴樹、桉等。
分 佈：雲南、西藏、四川、貴州、湖南、江西、福建、浙江、安徽、江蘇、山東、陝西、寧夏、山西、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、越南、印度、蘇聯、北美。

2128. **Xyleborus semiopacus** Eichhoff 暗翅材小蠹 (ASZI, 1986, 1:741; Chao, 1982:205; Yunn., 1987:850)
寄 主：蘋果、桃、野櫻桃、絲栗、楊、榿、栲、樟、楠、接骨木、毛桐、水冬瓜。
分 佈：福建、湖南、雲南、西藏、四川；東洋區、澳洲區、馬達加斯加、非洲熱帶區。

2129. **Xyleborus sexspinosus** Motschulsky 黑刺圓胸木蠹 (Chang et Hung, 1986:139)
寄 主：可可樹、咖啡、梓樹。
分 佈：臺灣、菲律賓、西里伯、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、東非、秘魯。

2130. **Xyleborus validus** Eichhoff 闊面材小蠹 (Chao, 1982:205; Hun., 1992:638)
寄 主：雲南松、高山松、思茅松、杉木。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、安徽；朝鮮、日本、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2131. **Xyleborus** sp. 檬果材小蠹 (Luo et al., 1996:58)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

LEPIDOPTERA 鱗翅目

(Cheng et al., 1994(4):14-15)

Hepialidae 蝙蝠蛾科

2132. **Endoclita excrescens** (Butler) 柳蝙蛾 (ASZI,1987, 2:3; Chu et Wang, 1985:294; Heppner et al., 1992:62; Liu, 1962:321; Liu, 1982[ed.]:270-272; Xiao, 1992:673; Zhang, 1987[ed.] 1:120)
Hepialus excrescens Butler, 1877:
=*Hepialus aemulus* Butler, 1877:
=*Phassus camphorae* Sasaki, 1908:
=*Phassus satsumanis* Yazaki, 1926:
別 名：*疣紋蝙蝠蛾*。
寄 主：雜食，蘋果、梨、桃、枇杷、葡萄、板栗、核桃、銀杏、鼠李、文冠果、獼猴桃、山葡萄、楊、柳、榆、刺槐、槐樹、樺、櫟、楝、桐、赭桐、貞桐、椿樹、白樺、赤楊、楓楊、衛茅、連翹、接骨木、啤酒花、線麻、玉米、茄子、黃蒿、野灌蒿、柳葉蒿、益母蒿、紅蓼、及多種藥用植物。
分 佈：江西、浙江、安徽、湖南、山東、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯。
天 敵：蠼螋
赤胸步甲
白僵菌
蠶飾腹寄蠅
蝙蛾小寄蠅

2133. **Endoclita sinensis** Moore 一點蝙蛾 (ASZI, 1987, 2:3; Chu et Wang, 1985:293; Heppner et al., 1992:62; Huang et Gao, 1996:267; Hun., 1992:666; Xiao, 1992:677; Zhang, 1987[ed.] 1:120; Zhao, 1983:78-80,)
Phassus sinensis Moore, 1877:
=*Phassus herzi* Fixsen, 1887:
=*Phassus formosonus* Shiraki, 1913:
=*Phassus sinensis* var. *kosemponis* Strand, 1916:
寄 主：桃、葡萄、柿、板栗、海州常山(即一種赬桐)、貞桐、杉木、柳杉、側柏、日本花柏、泡桐、白楊、楓楊、鵝掌柴、喜樹、女貞、水臘、杜仲、白榆、柳樹、麻櫟、栓皮櫟、蒙古櫟、合歡、刺槐、香椿等植物的枝幹。
分 佈：江西、華南、華東、華中、華北、東北；日本、印度、斯里蘭卡。
天 敵：白僵菌(寄生幼蟲和蛹,寄生率達 10.98 %)
蠼螋(捕食三齡前生活在林地的幼蟲)
Megalomya hepialivora He 蝠蛾角突盆蜂(幼蟲)
蠶飾腹寄蠅(寄生幼蟲,寄生率 3.5 %)

2134. **Phassus actinidiae** Yang et Wang 獼楚鳩蝠蛾 (Huang et Gao, 1996:292)
寄 主：獼猴桃、二球懸鈴木。
分 佈：福建。

2135. **Phassus minanus** Yang 閩鳩蝠蛾 (Huang et Gao, 1996:232)
寄 主：枇杷、柑橘、茶。
分 佈：福建。

2136. **Phassus ndous** Chu et Wang 癒蝙蛾 (Hun., 1992:667; Xiao, 1992:675; Zhang, 1987[ed.] 1:120)
寄 主：板栗、麻栗、杉木、柳杉、梧桐、楓楊、白楊、泡桐、香樟、臭椿、白榆、白玉蘭、浙江紫楠、火力楠、樂昌含笑、銀種樹、滇楸、枳椇、光皮樺、楷木、木蓮、楝葉吳茱萸、山杜英、臘梅、珊瑚樹八角楓、玉蘭、檵木、藍果樹、銀鵲樹、榔榆、香椿、冬青、枳椇、桐、鵝掌楸等 24 科 44 種。
分 佈：廣西、江西、湖南、浙江、安徽、河南。
天 敵：白僵菌(寄生幼蟲和蛹,寄生率 7.7-11 %)
Ichneumonidae 姬蜂科
懸繭蜂(寄生中齡幼蟲,多寄生,可達 14-212 個繭,寄生率 4.8 %)

2137. **Phassus signifer** Walker 黃斑蝙蝠蛾 (Chang, 1987:40; Liu, 1982[ed.]:272-274; Wu, 1977:80-82)
別 名：*一點蝠蛾*。
寄 主：葡萄、桃、板栗、桐、臭牡丹樹(海山常山)、朮栗、杉、柳杉、臺灣柳、臺灣水柳、木荷、香椿、柄檀、虎杖(黃葉子)、茄、艾、野桐、泡桐、柚木、楝樹、臭梧桐、雜草。
分 佈：臺灣、華南、華東、華北；朝鮮、日本、婆羅洲、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

Nepticulidae 微蛾科

2138. **Sinopticula sinica** Yang 中華微蛾 (Yang, 1989:80)
Sinopticula sinica Yang, 1989:80:
寄 主：紅葉李(*Prunus cerasifera* Ehrh. var. *atropurpurea* Jacg.=*P. cerasifera* var. *pissardii* Bailey)、扁桃(*Prunus amygdalus* Batsch=*Amygdalus communis* L.)、白花碧桃(*Prunus persica* (L.) Batsch. var. *albo-plera* Schneid；幼蟲潛蛀枝條，形成腫瘤狀蟲癭。
分 佈：陝西(西安)。

Tischeriidae 冠潛蛾科

2139. **Tsicheria gaunacella** Duponchel 李冠潛蛾 (ASZI, 1987, 2:8)
寄 主：幼蟲以薔薇科植物葉子為食，尤其是櫻屬的核果類。
分 佈：我國北部；歐洲、小亞細亞。

Tineidae 穀蛾科

2140. **Hapsifera barbata** (Christoph) 刺槐榖蛾 (Xiao, 1992:681)

別 名：*串皮蟲*。

寄 主：板栗、棗、刺槐、旱柳、白榆、栓皮櫟。

分 佈：山東、遼寧；日本、俄羅斯遠東、歐美。

Hieroxestidae 輝蛾科

2141. **Opogona sacchari** (Bojer) 蔗扁蛾 (Yang et Cheng, 1997:24-30)

Alucita sacchari Bojer, 1856.

[Banana moth]

寄 主：巴西木。

國外：香蕉、甘蔗、玉米、土豆、甘薯及多種觀賞花木。

分 佈：北京；馬斯克林群島(Mascarene Is.)(印度洋毛里求斯附近)。

Psychidae 袋蛾科(蓑蛾科)

2142. **Acanthopsyche bipars** Walker 碧皚袋蛾 (ASZL, 1987, 2:171; Hun., 1992:731; Zhang, 1987[ed.] 1:137)

寄 主：桃、蘋果、李、杏、黃刺莓、葡萄、黑棗、栗、核桃、落葉松、松、杉、桑、雲杉、側柏、刺槐、洋槐、榆、丁香、薔薇、枸杞、白菜；幼蟲能捕食桃、李樹上的桃蚜，洋槐樹上的洋槐蚜(*Aphis robiniae* Macchiati)，國槐樹上的國槐蚜(*Aphis sophoricola* Zhang)，黃刺莓、薔薇等樹上的月季長尾蚜(*Longicaudus trirhodus* (Walker)。

分 佈：廣西、江西、浙江、北京；日本、印度。

2143. **Acanthopsyche nigraplaga** Wileman 黑肩袋蛾 (ASZL, 1987, 2:173; Tao, 1980:250; Xiao, 1992: 682)

別 名：*黑翅基蓑蟲、刺槐袋蛾*。

寄 主：柿、黑棗、蘋果、桃、李、杏、葡萄、栗、核桃、落葉松、松、桑、洋槐、刺槐、槐樹、檀樹、柘樹、竹、黃刺莓、榆、楊、丁香、薔薇、枸杞、杉木、雲杉、柏、側柏、白菜、豆類等，同時幼蟲還捕食桃樹、李樹等寄主植物上的桃蚜、洋槐樹上的洋槐蚜、國槐樹上的國槐蚜以及薔薇、月季上的月季長尾蚜。

分 佈：臺灣、浙江、江蘇、山東、河北、北京、遼寧；日本、印度。

天 敵：Virus 病毒(寄生幼蟲)

細菌(寄生幼蟲,與病毒合併寄生占 11.6 %;幼蟲和蛹被寄生占 17.1 %)

真菌

白僵菌(寄生幼蟲,5.8 %)

Ichneumonidae 姬蜂科

Charitopimpla sagrea Vall (幼蟲)

Goryphus basilaris Holmgre 橫帶溝姬蜂(橫帶駝姬蜂)(幼蟲)

Goryphus longicornis Ishida (幼蟲)

蓑蛾瘤姬蜂

Torymidaae 長尾小蜂科

單齒腿長尾小蜂

Eulophidae 釉小蜂科

橫帶駝釉小蜂
鳥類捕食或其它(占 36.2 %)

2144. **Acanthopsyche (Metisa) saccharivora** Sonan 薄翅袋蛾 (Pingtung AC., 1986:69)
別 名：*薄翅避債蛾*。
寄 主：可可椰子。
分 佈：臺灣。

2145. **Acanthopsyche subferalbata** Hampson 桉袋蛾 (ASZI, 1987, 2:175; Chang et Hung, 1986:83, Chen, 1983:168-189; Chen, 1996, 22(2):28; Hun., 1992:734; Xiao, 1992:684; Yunn., 1987:860; Zhang, 1987[ed.] 1:137; Zhao et al., 1997:191)
別 名：*小袋蛾，桉蓑蛾，桉避債蛾*。
寄 主：柑橘、蘋果、李、梂、椰子、龍眼、番石榴、板栗、柿、楊梅、檸檬桉、蒲葵、相思樹、臉香、銀樺。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、安徽、江蘇、湖北；斯里蘭卡。
天 敵：姬蜂和小蜂有 6 種

2146. **Acanthopsyche taiwana** Sonan 臺灣小袋蛾 (Pingtung AC., 1986:69)
別 名：*白腳小避債蛾*。
寄 主：可可椰子。
分 佈：臺灣。

2147. **Acanthopsyche** sp. 茶小袋蛾 (Zhang, 1985[ed.]:203-205)
寄 主：杏、梨、茶、山茶、油茶、白楊、法桐、紫荊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽。
天 敵：*Cremastus flavoorbitalis* Cameron 褐斑瘦姬蜂
Goryphus sp. 駝姬蜂
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂
Limnerium sp. 小袋蛾瘦姬蜂
Philopsyche sp. 袋蛾瘦姬蜂
Brachymeria sp. 闊小蜂

2148. **Amatissa snelleni** Heylaerts 絲脈袋蛾 (ASZI, 1987, 2:175; Chao, 1982:226; Hun., 1992:732; Xiao, 1992:685; Yunn., 1987:860)
別 名：*線散袋蛾，絲脈蓑蛾，橡膠蓑蛾*。
寄 主：柑橘、荔枝、檬果、蘋果、李、桃、梨、枇杷、板栗、相思樹、垂柏、香樟、黃槐等 20 科 30 餘種植物。
分 佈：浙江、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、湖北；印度。

2149. **Canephora asiatica** (Staudinger) 雲杉桿袋蛾 (ASZI, 1987, 2:174)
寄 主：柑橘、蘋果、松、扁柏、茶、油茶、女貞、木麻黃、桉樹、柏、楊、柳、楓楊、烏桕、油桐、樟、榆、麻櫟、竹、石楠、茜草、雲杉。
分 佈：臺灣、福建。

2150. **Chalia larminati** Heylaerts 蠟彩袋蛾 (ASZI, 1987, 2:175; Beijing FC., 1980[ed.]:279-280; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:286-288; Hun., 1992:732; Liu, 1982[ed.]:333-334; Xiao, 1992:686; Yunn., 1987:860; Zhang, 1987ed.(1):138)

別 名：*油桐袋蛾，蠟彩蓑蛾*。

寄 主：柑橘、龍眼、蘋果、板栗、柿、橄欖、檬果、番石榴、水蒲桃、桑、黃檀、千年桐、相思樹、垂柏、玫瑰、陰香、側柏、黃槐、白蘭、鳳凰木、檸檬桉、洋紫荊、茶、油桐。

分 佈：安徽、江西、福建、湖南、廣西、雲南、四川、貴州；日本。

天 敵：小蜂有 3 種

2151. **Chaliodes kondonis** Matsumura 白囊袋蛾 (Chang & Hung, 1986:83; Chao, 1982:226; Chen et al., 1993:26; Helongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:286-288; Huang, 1990[ed.] 2:132-133; Hun., 1992:733; Luo et Jin, 1995:87; 1997:75; Luo et al., 1996:87; Tsai, 1965:109; Xiao, 1992:687; Zhang, 1985[ed.]:206-207; Zhang, 1987[ed.] 1:137; Zhao et al., 1997:191; Zhao et al., 1998(4):28)

別 名：*棉條袋蛾，白蓑蛾*。

寄 主：棗、蘋果、梨、榛、杏、桃、梅、枇杷、柑橘、蓮霧、柿、酪梨、波羅蜜、松、柏、茶、油茶、女貞、木麻黃、桉樹、合歡、重陽木、白榆、懸鈴木、白楊、三角楓、黃檀、槐樹、紫穗槐、南酸棗、側柏、落羽杉、楓楊、楊、柳、烏桕、油桐、樟、榆、麻櫟、竹等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、長江以南各省、河南。

天 敵：*Neophryxe psychidis* Townsend 簡須新怯寄蠅

2152. **Clania crameri** Westwood 松窠袋蛾 (ASZI, 1987, 2:172; Chao, 1982:226; Zhang, 1987[ed.] 1:137)

別 名：*螺絲袋蛾*。

寄 主：核桃、桃、馬尾松、茶、油茶、刺槐、槭。

分 佈：江西、河南；印尼、斯里蘭卡。

2153. **Clania minuscula** Butler 小窠袋蛾 (ASZI, 1987, 2:171; Chang & Hung., 1986:84; Chao, 1982:226, Chen et al., 1993:24; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:286-288, Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:129-131; Hun., 1992:732; Liu, 1982[ed.]:222; Luo, 1991:87; Luo et Jin, 1997:75; Tsai, 1965:109; Xiao, 1992:687; Yunn., 1987:859; Zhang, 1985[ed.]:199-202, Zhang, 1987[ed.] 1:138; Zhao et al., 1998(4):28)

別 名：*茶袋蛾，茶蓑蟲，茶蓑蛾，小蓑蛾，小窠蓑蛾*。

[Tea bag-worm]

寄 主：雜食性，柑橘、柿、桃、梅、梨、蘋果、臺灣蘋果、李、杏、櫻桃、山櫻桃、枇杷、山楂、龍眼、荔枝、石榴、葡萄、棗、榅桲、栗、圓醋栗、木莓、海棠、橄欖、山楂、豆梨、番石榴、核桃、棗、波羅蜜、腰果、馬尾松、咖啡、茶、山茶、樟、櫸、羅漢松、懸鈴木、楊、雪柳、柳、朴、赤楊、槭、榭、白楊、重陽木、烏桕、法國梧桐、油桐、木麻黃、梔子、檜、木瓜、桴、黃檀、相思樹、女貞、柏、千頭柏、垂柏、側柏、黃槐、刺槐、銀樺、木麻黃、楓、三葉橡膠、紫薇、薔薇、玫瑰、月季、珊瑚樹、楓香、楓楊、冬青、栓皮櫟、榆、朴、懸鈴木、蓖麻、棉花、麻、向日葵、蘆葦、律草、烏歛莓、竹等 31 科 72 種植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

天 敵：*Charitopimpla (Philopsyche) sagrae* Vollenhoven 瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus aethiops (Curtis) 滿點黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus carinifrons (Cameron) 脊額黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Echthromorpha notulatoria Fabricius 松毛蟲惡姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(幼蟲)
Iserropus salanas (Morley) 松毛蟲疣姬蜂
Pimpla formosana Cushman (幼蟲)
Pimpla luctuosa Smith (幼蟲)
Sericopimpla sagrae sauteri Cushmen 袋蛾瘤姬蜂(幼蟲)
Theronia atalantae gestator (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)
Theronia zebra diluta Gupta 黑紋黃瘤姬蜂(黑紋囊爪姬蜂)(幼蟲)
Xanthopimpla sp. 黑點瘤姬蜂 (幼蟲)
Xanthopimpla kuchiingensis Cameron 黃瘤姬蜂(幼蟲)
Chalcis mikado Cameron 皇腿小蜂
Brachymeria fiskei Crawford 費氏腿小蜂
Brachymeria spp.
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅
Nealsomyia rufella (Bezzi) 四斑尼爾寄蠅
Neophryxe psychidis Townsend 簡須新怯寄蠅
線蟲
細菌
鳥類

2154. **Dappula tertia** Templeton 黛袋蛾 (ASZI, 1987, 2:174; Hun., 1992:733; Xiao, 1992:691)
寄 主：柑橘、龍眼、荔枝、蘋果、板栗、柿、咖啡、香蕉、黃檀、千年桐、相思樹、垂柏、樟、油桐、相思樹、玫瑰等。
分 佈：浙江、福建、江西、湖南、湖北、廣東、廣西；斯里蘭卡。

2155. **Eumeta hekmeyeri** Heyl 荔枝袋蛾 (Luo et al., 1996:59)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

2156. **Eumeta pryeri** (Leech) 大袋蛾 (ASZI, 1987, 2:172; Beijing FC., 1980[ed.]:277-279; Chang, 1982:288; 1987:40; Chang & Hung, 1986:83; Chen, 9996, 22(2):28; Chen et Chang, 1990:363; Chen et al., 1993:27; Duan et al., 1993(1):30; Han, 1996:39-40; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:286-288; Heppner et al., 1992:65; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:131-132; Huang et Gao, 1996:187; Hun., 1992:731; Liu, 1982[ed.]:222-224; Luo et Jin, 1995:87; Luo et al., 1996:59; 1996:87; Pingtung, AC., 1986:44; Qiao et al., 1996, 12(2):95; Wang et Liu, 1994, 20(5):47; Wang et Shi, 1990:297-298; Wu, 1977:82-83; Xiao, 1992:688; Yu, 1990:299-301; Yunn., 1987: 859; Zhang, 1985[ed.]:202-203; Zhang, 1987[ed.] 1:138; Zhao et Li, 1995(3):17; Zhao et al., 1997:191; Zhao et al., 1998(4):28)
Clania pryeri Leech, 1888:
=*Clania formosicola* Strand, 1915:
=*Clania variegata* Snellen,
別 名：*大窠袋蛾、大窠簑蛾、大避債蛾、大簑蛾、大簑蟲、派氏簑蛾、茶簑蛾。*
[Bag-vorm moth]
寄 主：雜食，柑橘、黃皮、蘋果、梨、桃、李、棕、梅、臺灣蘋果、牛心梨、

枇杷、楊桃、葡萄、咖啡、龍眼、荔枝、橡果、核桃、棗、板栗、錫蘭橄欖、釋迦、酪梨、西印度櫻桃、番石榴、蓮霧、蒲桃、楊梅、木瓜、柿、毛柿、番荔枝、刺番荔枝、楊梅、安石榴、咖啡、酪梨、腰果、松樹、桑、香蕉、茶、油茶、油桐、法桐、泡桐、懸鈴木、烏桕、重陽木、朴樹、胡枝子、麻櫟、刺槐、楊、垂柳、皂角樹、樟、相思樹、刺槐、榆、槭、桉樹、楓楊、松柏、側柏、楓香、鳳凰木、肯氏南洋杉、茄苳、安南漆、木麻黃、槭、銀樺皮樹、木臘樹、通草、甘蔗、蓖麻、榕樹、魚藤、紫薇、棉花、印度田菁、向日葵、薔薇、茉莉花、茄子、番茄、薑、樹薯、酒瓶椰子、木藍等 32 科 65 種植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、安徽、浙江、江蘇、河南、山東、河北；日本、琉球、婆羅洲、西里伯、印尼、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

天 敵：Virus　病毒

EvNPV

CVSHPV

蜘蛛、瓢蟲、蟻(捕食初孵幼蟲)

Casinaria sp. 袋蛾凹眼姬蜂

Celis sp. 簑蛾溝姬蜂(幼蟲,蛹)

Charitopimpla (*Philopsyche*) *sagrae* Vollenhoven　(幼蟲)

Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus luctuosus (Smith)　野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)

Pristomerus erythrothoracis Uchida　紅胸齒腿姬蜂

Sericopimpla sagrae sauteri Cushmen　簑蛾瘤姬蜂(幼蟲)

Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg)　脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)

Apanteles claniae You et Zhou　大簑蛾絨繭蜂(幼蟲)

Chouioia cunea Yang　白蛾周氏嚙小蜂

Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂

Monodontomerus viciella Foerster　斑痣長尾小蜂

Elasmus sp.　袋蛾羅小蜂

Euderastichus sp.　射紋釉小蜂

Telenomus sp.　袋蛾黑卵蜂

Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅(寄生率達 77-94 %)

Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅

Exorista xanthaspis (Wiedemann)　紅尾追寄蠅(寄生雌幼蟲的寄生率有時高達 90 % 以上)

Nealsomyia quadrimaculata Baranoff　四斑尼爾寄蠅

Nealsomyia rufella (Bezzi)　四斑尼爾寄蠅

Neophryxe psychidis Townsend　筒須新怯寄蠅

重寄生：*Dimmockia* sp.　兔唇釉小蜂

Pediobius pyrgo Walker　袋蛾釉小蜂

Tetrastichus sp.　袋蛾嚙小蜂

捕 食：*Hierodula patellifera* Serville　廣腹螳螂

Tenodera aridifolia sinensis (Saussure)　中華大刀螂

Chrysopa pallens (Rambur)　大草蛉

Chrysopa shansiensis (Kuwayama)　晉草蛉

Calosoma maderae chinensis Kirby　中華廣肩步甲
Polyrhachis sp.　黑蟻
Polistes hebraeus Fabricius　亞非馬蜂
Cyanopica cyana intenposita Harter　灰喜鵲
Pica pica sericea　喜鵲
Parus major artatus Thayer et Bongs　大山雀
Passer montanus Linnaeus　麻雀
Cuculus canorus Linnaeus　大杜鵑

2157. **Eumetisa taiwana** (Sonan) 臺灣袋蛾 (Chang & Hung, 1986:83; Chen, 1981:46; Heppner et al., 1992:65; Hsiao, 1982:99; Tsai, 1965:109)
Acanthopsyche taiwana Sonan, 1935:
寄 主：番石榴、茶、樟。
分 佈：臺灣。
天 敵：*Dioctes arisana* Sonan　姬蜂(幼蟲)
Sinophorus psycheae Sonan　姬蜂(幼蟲)

2158. **Eurycytarus nigriplaga** Wileman 桑袋蛾 (Suzhou CS., 1985:246; Zheng, 1982:246)
Eurycytarus nigriplaga Wileman,
寄 主：桑。
分 佈：浙江、江蘇。

2159. **Mahasena colona** Sonan 烏龍墨袋蛾 (ASZI, 1987, 2:173; Chao, 1982:227; Heilongjiang Mudingjiang, FS., 1988[ed.]:286-288; Heppner et al., 1992:65; Luo et Jin, 1997:72; Luo et al., 1996:59; 1996:87; Xiao, 1992:693)
Mahasena colona Sonan, 1935:
別 名：*褐袋蛾、茶褐背袋蛾*。
寄 主：荔枝、龍眼、柑橘、蓮霧、檬果、人心果、茶、油茶、油桐、樟、烏柏、扁柏、刺槐。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽；印度。
天 敵：*Neophryxe psychidis* Townsend　簡須新怯寄蠅

2160. **Mahasena hockingi** Moore 褐墨袋蛾 (Chen et Wang, 1987:63-64)
寄 主：蘋果、梨、楊、柳等。
分 佈：陝西。

2161. **Mahasena nitobei** Matsumura 泥墨袋蛾 (ASZI, 1987, 2:173; Cao et Peng, 1993:24; Wang et Wang, 1999(3):61)
寄 主：蘋果、海棠、黃刺梅、山楂、棗、黑棗、柿、核桃、葡萄、茶、山藥、豆類、月季、香椿、大葉黃楊。
分 佈：山西、河北、北京；日本。

2162. **Mahasena theivora** Dydg. 茶墨袋蛾 (ASZI, 1987, 2:172; Chen, 1983:168)
寄 主：李、垂柏、紫薇。
分 佈：廣西；錫金。

2163. **Mahasena yuna** Chao 燕墨袋蛾 (ASZI, 1987, 2:172; Chao, 1982:436-440)

Mahasena yuna Chao, 1982:439.
寄 主：黃刺梅、蘋果、側柏。
分 佈：北京。

2164. **Oiketicoides larminati** Heylearts 油桐袋蛾 (Chao, 1982:227)
別 名：*油桐尖殼簑蛾*。
寄 主：番石榴、桑、茶、油桐。
分 佈：福建。

2165. **Pachytelia unicolor** Hübner 柿袋蛾 (Chao, 1982:227)
寄 主：柿、茶。
分 佈：福建。

Gracillariidae 細蛾科

2166. **Acrocercops astaurota** Meyrick 梨潛皮蛾 (Chen et Wang, 1987:127-129; Huang, 1990[ed.] 2:116-119; Li et al., 1996, 23(1):91-92; NZWDI, 1981:1693; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Wang, 1998:41-42)
別 名：*梨潛皮細蛾*。
寄 主：蘋果、梨、海棠、李、秋子、榲桲、野山楂、山定子、榆葉梅、紅葉梅等枝條表皮下潛食為害。
分 佈：四川、河南、陝西、山東、河北、西北、遼寧。
天 敵：Ichneumonidae　姬蜂科 (1 種)
Torymidae　長尾小蜂科 (1 種)
Eupelmidae　旋小蜂科
Eupelmus sp.
Eulophidae　釉小蜂科
Pediobius pyrgo Walker　梨潛皮蛾釉小蜂
(在陝西寄生率 10%左右，在河南 20-50%, 在山東可達 73%)

2167. **Acrocercops isonoma** Meyrick 檬果細蛾 (Chang & Hung, 1986:73; Heppner et al., 1992:66)
Acrocercops isonoma Meyrick, 1916:
寄 主：檬果(葉)。
分 佈：臺灣；印度。

2168. **Acrocercops syngramma** Mayr 檬果潛皮細蛾 (Luo et Li, 1998:68; Luo et al., 1996:58)
寄 主：檬果(嫩梢皮下)。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。

2169. **Acrocercops** sp. 腰果細蛾 (Luo, 1991:87)
寄 主：腰果(幼葉)。
分 佈：海南。

2170. **Acrocercops** sp. 蓮霧細蛾 (Chen, 1981:47)
寄 主：蓮霧。
分 佈：臺灣。

2171. **Conopomorpha litchiella** Bradley 荔枝尖細蛾 (Bradley,1986:48; Chen et al., 1996(3):18-19; He et al., 1994(1):40; Heppner et al., 1992:66; Huang, 1990[ed.] 2:279; Huang et Gao, 1996:219; Huang et Hung, 1994:134; 1996:76; Huang et al., 1997:125-29; NZWDI, 1981:1979; Qiu et al., 2000(1):30; Yao & Liu, 1990:209)

Conopomorpha litchiella Bradley, 1986:

寄 主：荔枝、龍眼、蜜脈蒲桃(*Syzygium cumini*)、決明(*Cassia tora*)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西；馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾。

2172. **Conopomorpha sinensis** Bradley 荔枝蒂細蛾 (Bradley, 1986:47; Chen, 1962:193195; Chen et al., 1994:57; Chiean et Chen, 1963:456-458; He et al., 1994(1):40; Heppner et al., 1992:66; Huang, 1987:1-26; 1987:57-59; 1988:33-42; Huang, 1990[ed.] 2:278-279; Huang et Gao, 1996:217; Huang et Hung, 1993:225-238; 1994:134; 1996:76; Huang et Hsieh, 1981:283; 1983:61-63; 1983:296; 1989:387-395; Huang et al., 1994:1-8; 1994:85-95; 1996:129-136; Huang et al., 1997:125-129; Hung et Huang, 1998:430; Hsieh et Huang, 1982:296; Hung et Huang, 1995:201-208; Kuang, 1963:13-18; Liu et Zhang, 1998, 20(2):75-80; Qiu et al., 2000(1):30; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Tang, 1961:207-208; Yao & Liu, 1990:207; Yao et al., 1997(1):35-36)

Conopomorpha sinensis Bradley, 1986:47.

別 名：*荔枝叉紋細蛾*。

寄 主：荔枝、龍眼。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、廣西；泰國、印度、尼泊爾。

天 敵：*Apanteles* sp. 絨繭蜂

Phanerotoma sp. 繭蜂

Tetrastichus sp. 嚙小蜂

Elasmus sp. 羅小蜂

2173. **Parectopa zehntneri** Snell 紅紋細蛾 (Chen, 1981:47)

寄 主：蓮霧(葉)、桑(莖)。

分 佈：臺灣。

2174. **Phyllonorycter ringoniella** (Matsumura) 金紋小潛細蛾 (Chai et al., 1994(3):35; Chen, 1994, 20(3):52; Chen et Wang, 1987:39-40; Dou et al., 1995(3)31-32; Hu et al., 1994(4):41-42; Huang, 1990[ed.] 2:42-43; Jiang et Jiang, 1993(1):51; Jiang et Zhang, 1995(2):31-33; Jiang et al., 1998(1):43-44; Lan, 1994(3):35; Li, 1993:63; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Liang et Xu, 1998(4):17; Liu, 1997:27; Liu et al., 1996:25-27; Liu et al., 1996(1):33, 29; Liu et al., 1996(2):44-45, 1996; NZWDI, 1981:1686; Pan et al., 1994(1):35; Po et al., 2000(2):10; Qin, 1997(4):25; Qiu, 1994, 11(1):59; Qiu et al., 1988(4)32-33; Ren, 1994(2):30-31; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sun, 1994(3):16-17; Sun, 1997:47-48; Sun et al., 1994:30; Sun et al., 1994(4):10-11; Sun et al., 1995(4):47-48; Sun et al., 1999, 21(4):1-5; Wang, 1997(2):49; Wang et Zhang, 1996(4):36; Wang et al., 1994(3):27-28; Wu et al., 1995(2):7; Xiao, 1992:701; Yang et al., 1994(2):26, 40; Zhang et Miao, 1996(3):25; Zhang et al., 1995(2):31-34; Zhao, 1994:22-23; Zhao, 1995(4):20-21; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zhao, 1997(2):45, 57; Zou, 1994(1):45-46; Zou et al., 1995(4):8)

Lithocolletis ringoniella Matsumura (ASZI, 2:10; NZWDI, 1981:1686)

別 名：*金紋細蛾*、*蘋果細蛾*。

寄 主：蘋果、梨、桃、櫻桃、李、海棠等，幼蟲潛害葉肉。

分 佈：安徽、江蘇、陝西、甘肅、山東、山西、河南、河北、遼寧；日本。

天 敵：*Ageniaspis pestaesipes* Rate. 金紋細蛾跳小蜂(多胚生殖)

2175. **Phyllonorycter** sp. 楊梅小細蛾 (Chen, 1994:351-352; Chen, 1996, 22(2):27; Chen et al., 1993, 19(2):21-22)

Phyllonorycter sp. Chen et al, 1993, 19(2):21-22)

寄 主：楊梅(*Myrica rubra* Sieb. et Zucc.)(葉肉)。

分 佈：浙江。

2176. **Spulerina** sp. 橄欖皮細蛾 (Huang et Gao, 1996:276; Huang et al., 1998(4):38)

寄 主：橄欖。
分 佈：福建。

Phyllocnistidae 潛葉蛾科

2177. **Leucoptera scitalla** Zeller 旋紋潛葉蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:40-42)
Leucoptera scitalla Zeller,
別 名：*蘋果潛葉蛾*。
寄 主：蘋果、梨、沙果、海棠、三葉海棠、山荊子。
分 佈：河南、陝西、山東、西北、東北。

2178. **Phyllocnistis citrella** Stainton 柑橘潛葉蛾 (ASZI, 1987, 2:5; Bei et al., 1999(5):23; Cai, 1995(4):36, Cai, 1999(3):12-13; Cao, 1996(1):37, 36; Chang, 1987:40; Chang & Hung, 1986:73; Chao, 1982:254; Chen, 1993, 10(3):169-173; Chen, 1994(4):33; Chen, 1995(3):34-36; Chen, 1996(1):46; Chen, 1998, 15(2):26; Chen et al., 1989:96-105; Chen et al., 1994(2):35; Chen et al., 1995(1):37-39; Chiu et al., 1985:1-8; Deng, 1997, (1):10-12; Deng et Vivas, 1999, 26(2):157-161; Ding et Huang, 1994, 16(2):67-72; Ding et al., 1989:106-113; Ding et al., 1994, 16(3):136-140; Du, 1996(2):31; He et al., 1979, 1(2):57-63; Heppner et al., 1992:66; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:244-246; Huang et Gao, 1996:180; Huang et Huang, 1989:90-95; Huang et Li, 1989:84-89; Huang et al., 1988, 32(1):58-67; Huang et al., 1989:53-75; Huang et al., 1989, 16(3):159-162; Huang et al., 1997, (1):2-9; Hun., 1992:670; Lin, 1986[ed.]:326-329; Lin, 1997:114-120; Ling et al., 1980,(4):33-38; Liu, 1993:275-278; Liu et Zeng, 1980, 1(1):113-120; Luo, 1993(3):22; Min et Shao, 1998, 15(4):22, 45; NZWDI, 1981:1914; Tao et Wu, 1968:58-59; 1969:145-146; Tan et al., 1989:76-83; Tsai, 1965:96; Wan, 1997, 14(2):33; Wang, 1995(2):39-40; Wang et Chen, 1995(4):38, 40; Wang et al., 1994(2):36-38; Wang et al., 1998, 15(1):34-35; Wang et al., 1998, 15(2):24-25; Wu et Tao, 1977:158-168; Ye et al., 1996:40; Ye et al., 1996(3):42; Yu et Tong, 1995(2):41-42; Yu et al., 19993(2):35; Zeng et Zhao, 1995(4):10-13; Zhang et Ren, 1995(1):43; Zhang et al., 1993(3):29-31; Zhang et al., 1999(1):13; Zhang et al., 2000(2):14; Zhou, 1994(4):33)
Phyllocnistis citrella Stainton,
=*Lithocolletis citricola* Shiraki, 1913:
別 名：*柑橘葉蛾*、*柑潛葉蛾*。
[Citrus leaf miner]
寄 主：柑橘、枳殼、葡萄。
分 佈：臺灣、我國柑橘產區；朝鮮、日本、琉球、菲律賓、越南、印尼、印度、斯里蘭卡、大洋洲、非洲、澳洲。
天 敵：*Mallada boninensis* (Okamato) 亞非草蛉
Eulophidae 釉小蜂科 (幼蟲寄生)
Achrysocharellae sp. 潛蛾凹面燦姬小蜂
Apleurotropis sp.
Chrysonotomyia sp.
Sphenolepis (*Geniocerus*) sp. 潛蛾嚙小蜂
Cirrospilus huangyanensis Tseng
Cirrospilus ingennus Gahan
Cirrospilus jiangxiensis Tseng
Cirrospilus lyncus Walker
=*Eulophus unifasciatus* Förster
Cirrospilus nigriscutellaris Tseng
Cirrospilus phyllocnistis (Ishii)
Cirrospilus quadristriatus (Subba Rao et Ramamani) (蛹寄生)
Citrostichus dolichogaster Tseng et Wang
Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan)
Tetrastuchus sp.

2179. **Phyllocnistis wampella** Liu et Zeng 黃皮潛葉蛾 (Du et al., 1989:147-149; Liu et Zeng, 1985: 413)
Phyllocnistis wampella Liu et Zeng, 1985:413.
寄 主：黃皮。
分 佈：廣東(廣州)。

2180. **Phyllocnistis** sp. 潛葉蛾 (Luo et al., 1996:87)
寄 主：蓮霧。
分 佈：海南。

Xyloryctidae 木蛾科

2181. **Aeolanthes semiostrina** Meyrick 梨紅木蛾 (Hun., 1992:677)
寄 主：梨。
分 佈：湖南、安徽。

2182. **Epimactis monodoxa** Meyrick 一點木蛾 (Huang, 1997, in little)
Epimactis monodoxa Meyrick, 1907:
寄 主：荔枝、龍眼(葉)。
分 佈：福建；錫金、不丹。

2183. **Epimactis tolantias** Meyrick 蜜柑落葉蛾 (Chang & Hung, 1986:74; Chao, 1982:255; Tsai, 1965:97; Zhang, 1987[ed.] 1:127)
別 名：*茶堆沙蛀蛾*。
寄 主：柑橘類、茶、棉。
分 佈：臺灣、福建、江西。
天 敵：*Hymenobosmina oditesi* Sonan 盆蜂

2184. **Linoclostis gonatias** Meyrick 茶木蛾 (ASZI, 1987, 2:23; Chang & Hung, 1986:74; Chao, 1982:255)
別 名：*茶堆砂蛀，茶枝木掘蛾，銀翅木掘蛾*。
寄 主：荔枝、茶、油茶、臺灣欖木、古柯樹(樹皮)、黃梔子、苦楝、相思樹。
分 佈：臺灣、福建、華南、中南、華東；爪哇、印度。

2185. **Odites issikii** Takahashi 梅木蛾 (ASZI, 1987, 2:24; Chen et Wang, 1987:58-59; Chen, et al., 1980:208-209; Wang et Zhang, 1995(2):11-13; Xiao, 1992:745; Zhang, 1987[ed.] 1:127)
別 名：*櫻桃堆砂蛀蛾，卷邊蟲，五點木蛾*。
寄 主：蘋果、梅、桃、梨、李、杏、櫻桃、葡萄、山楂、柿、板栗、獼猴桃、榆、柳、梔子、百合科植物等。
分 佈：江西、陝西、山東、河北、遼寧；日本。
天 敵：Formicidae 蟻科
山雀、八哥
青蛙
Brachymeria lasus Walker 廣闊小蜂(和另一種寄生蜂寄生幼蟲和蛹,寄生率達 35-41 %)

2186. **Odites leucostola** Meyrick 蘋果木蛾 (ASZI, 1987, 2:23; Zhang, 1987[ed.] 1:127)

寄 主：蘋果。
分 佈：江西、華北、東北；日本。

2187. **Odites xenophaea** Meyrick 烏桕木蛾 (Xiao, 1992:747)
寄 主：板栗、烏桕、歐美楊、水曲柳、麻櫟等。
分 佈：浙江、四川。

2188. **Odites** sp. 柑橘木蛾 (ASZI, 1987, 2:23; Huang, 1990[ed.] 2:246; Huang et Gao, 1996:184)
Epimactis sp. Huang et Gao, 1996:184.
別 名：*白落葉蛾*。
寄 主：柑橘、荔枝、龍眼、茶。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、四川。
天 敵：*Hockeria* sp. 木蛾凹面闊小蜂(蛹)

Argyresthiidae 銀蛾科

2189. **Argyresthia assimilis** Moriuti 蘋異銀蛾 (Chen et al., 1988:188; Ma & Sun, 1982:315)
Argyresthia assimilis Moriuti, 1977.
寄 主：蘋果(蛀食種子)。
分 佈：陝西、甘肅；日本。

Oecophoridae 織蛾科

2190. **Acria ceramitis** Meyrick 蘋凹織蛾 (ASZI, 1987, 2:23; Hun., 1992:684)
別 名：*蘋凹木蛾*。
寄 主：蘋果等。
分 佈：湖南、華中、華東；日本、印度。

2191. **Psorosticha zizyphi** Stt. 小灰蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:246)
寄 主：柑橘。
分 佈：中國。

Lecithoceridae 祝蛾科

2192. **Odites issikii** Takahashi 梅祝蛾 (Hun., 1992:681)
寄 主：蘋果、櫻桃、梅、梨、葡萄、李、桃、薔薇、梔子及百合科、榆科、楊柳科植物。
分 佈：湖南、華東、華北、東北；日本等地。

Gelechiidae 麥蛾科

2193. **Anarsia lineatella** Zeller 桃條麥蛾 (ASZI, 1987, 2:19, Huang, 1990[ed.] 2:180-182; Xiao, 1992:749)
寄 主：桃、杏、沙果、李、櫻桃、沙棗等果樹。
分 佈：陝西、河北、新疆；小亞細亞、蘇聯、地中海(東部)、歐洲中南部、北美洲。
天 敵：絨繭蜂(幼蟲,單一寄生,寄生率達 10-20 %)

跳小蜂(幼蟲,多胚寄生，一條幼蟲體內可出蜂 58-104 頭,寄生率達 50-60 %)

2194. **Anarsia patulella** Walker 荔枝麥蛾 (Chang & Hung, 1986:75)
寄 主：荔枝、李(新芽)。
分 佈：臺灣；斯里蘭卡。

2195. **Anarsia** sp. 枝葉麥蛾 (Luo, 1991:87)
寄 主：腰果(芽)。
分 佈：海南。

2196. **Compsolechia anisogramma** Meyrick 桃麥蛾 (Huang et Gao, 1996:247)
寄 主：桃、李、榛、梅、杏。
分 佈：福建、華中、華北。

2197. **Compsolechia metagramma** Meyrick 櫻桃麥蛾
[Cherry gelechid]
寄 主：櫻桃。
分 佈：江西、湖南；南斯拉夫。
天 敵：*Paralitomastix variconis* Nees 麥蛾跳小蜂

2198. **Dichomeris ianthes** Meyrick 柿葉麥蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Tsai, 1965:99)
寄 主：柿(葉)、十一葉馬棘、大豆、落花生。
分 佈：臺灣；緬甸、印度、斯里蘭卡。

2199. **Dichomeris intensa** Meyrick 柿麥蛾 (Tsai, 1965:99)
寄 主：柿(新葉、新梢)。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

2200. **Exoteleia dodecella** Linnaeus 松芽麥蛾 (Li et al., 1992:4; Xiao, 1992:753)
Exoteleia dodecella Linnaeus,
Exoteleia sp. Li et al., 1992:4.
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果)
樟子松、歐洲赤松、摩霍松。
分 佈：陝西、山西、內蒙古、黑龍江；歐洲北部、中部和部分西部、俄羅斯歐洲部分、北美。
天 敵：蜘蛛(捕食成蟲及幼蟲)
繭蜂及小蜂爲主，寄生率可達 32.8-50 %

2201. **Gaesa sparsella** Christoph 胡桃麥蛾 (ASZI, 1987, 2:20)
寄 主：胡桃、核桃楸等。
分 佈：東北；西百利亞東部。

2202. **Hypatima longanae** Yong et Chen 龍眼亥麥蛾 (Hu et al., 1994(2):55-56; Huang et Gao, 1996:220; Huang et al., 1997:125; Qiu et al., 2000(1):30)
Hypatima longanae Yong et Chen,
寄 主：龍眼、荔枝(枝梢、花穗、果)。

分 佈：臺灣(及金門)、福建。

2203. **Idiophantis chiridota** Meyrick 蒲桃麥蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Heppner et al., 1992:70)
Idiophantis chiridota Meyrick, 1914:
寄 主：蒲桃。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

2204. **Recurvaria syrictis** Myrick 杏白帶麥蛾 (Cao et Guo, 1987:279-281)
寄 主：杏、桃、李、櫻桃、檳沙果、蘋果，以杏、桃爲主。
分 佈：山西。
天 敵：*Apanteles* sp. 絨繭蜂(幼蟲)
Bracon onukii Watanabe 螟黑紋繭蜂(幼蟲)
Phaenerotoma planifrons (Nees) 食心蟲白繭蜂(幼蟲)
Goniozus japonicus Ashmead 卷蛾腫腿蜂(幼蟲)
Eurytoma monemae Rusch 刺蛾廣肩小蜂(蛹)
Sympiesis sp. 釉小蜂(蛹)

2205. **Stenolechia rectivalva** Kanazawa 栗蛀花麥蛾 (Hou et al., 1993, 10(4):207-210)
寄 主：板栗(花期幼蟲蛀食混合花序的雌花(幼苞)和雄花)。
分 佈：河北。

2206. **Telphusa chloroderces** Meyrick 黑星麥蛾 (ASZI, 1987, 2:22; Chen et Wang, 1987:36-37; Huang, 1990[ed.] 2:179-180; NZWDI, 1981:1685; Zhang, 1998(2):37-38)
別 名：*蘋果黑星麥蛾*、*黑星卷葉牙蛾*。
寄 主：桃、李、杏、蘋果、梨、櫻桃、山定子等果樹，幼蟲在樹梢上吐絲綴葉作巢，群集爲害。
分 佈：江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林。

2207. **Telphusa euryzeucta** Meyrucj 黑帶麥蛾 (Cao et Li, 1980:118-119)
寄 主：核果類果樹葉片。
分 佈：山西。

Coleophoridae 鞘蛾科

2208. **Coleophora dahurica** Falkovitsh 興安落葉松鞘蛾 (Wang et al., 1989, (9):29-31; Wang et al., 1990, 1:107-110; Xiao, 1992:738; Yang et al., 1990, :)
別 名：*落葉松鞘蛾*。
寄 主：興安落葉松、長白落葉松、日本落葉松、華北落葉松。
分 佈：河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯遠東區。
天 敵：蜘蛛類
大腹圓蛛
迷宮漏斗蛛
寄生蜂(有十種以上,各地寄生率在 9-17 %)
Ichneumonidae 姬蜂科
Braconidae 繭蜂科
Pteromalidae 金小蜂科

Eulophidae 釉小蜂科
Formicidae 蟻科(捕食幼蟲)
鳥類(至少有 15 種)
大山雀、沼澤山雀、褐頭山雀、樹麻雀等。

2209. **Coleophora laricella** Hübner 落葉松鞘蛾 (ASZI, 1987, 2:11; Beijing FC., 1980[ed.]:275-276; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]: 208-209; Liu, 1982[ed.]:233-234; Xu, 1960:18-20)
寄 主：落葉松(專食松針葉肉)。
分 佈：山西、西北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、歐洲、北美。

2210. **Coleophora sinensis** Yang 華北落葉松鞘蛾 (Xiao, 1992:739; Zhang et al., 1995, 11(4):145-149)
寄 主：華北落葉松。
分 佈：山西、河北、內蒙古。

Cosmopterigidae 尖翅蛾科(飾翅蛾科)

2211. **Batrachedra arenosella** Walker 椰子飾翅蛾 (Chen, 1975:447; Pingtung AC., 1986:62)
別 名：*淡尖翅蛾*。
寄 主：可可椰子(花穗、幼果)。
分 佈：臺灣。

2212. **Chryoclista basiflavella** Matsumura 桃黑果蛀蟲 (Chao, 1982:257)
寄 主：桃。
分 佈：福建。

Carposinidae 蛀果蛾科

2213. **Asiacarposina niponensis** (Walsingham) 桃蛀果蛾 (ASZI, 1987, 2:26; Cao et al., 1994:26-27; Chen et Wang, 1987:8-15; Chen et al., 1993:54; Gu et Meng, 1994:46-47; He et al., 1993(1):13-14; Hua et al., 1992, 18(2):15-17; Hua et al., 1996:26; Hua et al., 1998, 25(2):141-144; Huang, 1990[ed.] 2:2-7; Huang et Wu, 1957:34-41; Huang et al., 1976, 19(2):149-155; Hun., 1992:687; Jiang et Zhang, 1995(2):31-33; Jiang et al., 1990:359-364; Jiang et al., 1993(2):19-21; Ji et al., 1993(2):21-22; Li, 1984, (4):31-36; Li, 1994:29; Li, 1996(3):35; Li, 1997:45; Li et al., 1993(2):52; Li et al., 1995:24-25; Lin, 1986[ed.]:331-335; Lin, 1997:44-45; Liu, 1982[ed.]:371-372; Liu, 1996(1):52; Liu et Gao, 1999(1):41; Liu et al., 1990:184; Liu et al., 1996(2):44-45; Lu et Wang, 1998(3.4):117; Luo et al., 1991:15; Meng et al., 1994(3):5-7; Niu et Chen, 1999:31; NZWDI, 1981:1662, 1776; Po et al., 2000(2):10; Qiu, 1994, 11(1):58; Qiu et al., 1985, 2(2):38-41; 1987, 4(2):33-35; 1994(2):39, 44; 1989, 6(4):241-243; Song et al., 1993(1):25-26; Sun et al., 1993(2):10-12; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Wang, 1987[ed.]:243-245, 275-278; Wang, 1993(1):40-42; Wang, 1997(2):49; Wang, 1998(3):36-37; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et Zhang, 1996(4):36; Wang et al., 1997:22-23; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu et Hwang, 1955, 1(1):25-29; Xiao, 1992:757; Xu et al., 1991, (1):16-19; Yang, 1982:254; Yang, 1994(3):47; Yang et al., 1994(2):26, 40; Ye, 1999(4):28; Zang et al., 1993:10-12; Zhang et Miao, 1996(3):23; Zhang et Wang, 1996(1):42-43; Zhang et Zhang, 1999:26; Zhang et al., 1993, 10(1):49-50; Zhang et al., 1993(2):21-22; Zhang et al., 1995(2):31-34; Zhao et al., 1991, (4):10-14; Zhao, 1997(2):45, 57; Zhao et Wang, 1996(1)44-46; Zhao et Xu, 1993(2):52; Zhao et al., 1993 10(3):146-149; Zhao et al., 1994(4):26; Zhou et al., 1997:40; Zhou et al., 1997(4):28-29; Zou et al., 1995(4):8; Zhu, 1996(2):53)
Carposina niponensis Walsingham, 1900:121.
=*Carposina sasakii* Matsumura, 1900:198.
=*Carpocapsa persicana* Sasaki, 1905:
Asiacarposina niponensis; Yang, 1982:254.
別 名：*桃小食心蟲、桃小蛀果蛾、蘋果食心蟲、桃小實蛾、桃蛀蟲、桃小*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、梅、杏、海棠、花紅、山楂、檳子、榲桲、木瓜、棗、酸棗等，以蘋果、梨、棗受害最重(幼蟲蛀果)。

分 佈：湖南、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、青海、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞。
天 敵：*Chelomus* sp. 甲腹繭蜂
Pristomerus sp. 齒腿姬蜂
(在遼西梨區寄生率可達 22-30%)

Glyphipterygidae 雕翅蛾科

2214. **Anthophila pariana** Clerck 蘋果雕翅蛾 (ASZI, 1987, 2:11; Chen et Wang, 1987:59; Huang, 1990[ed.] 2:44-45; Wang, 1987[ed.]:261-262)
別 名：*蘋果擬卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、檳沙果、桃、山楂、山定子、海棠等。
分 佈：陝西、山西、河北、甘肅；東西伯利亞、歐洲、北美。

Yponomeutidae 巢蛾科

2215. **Cedestis gysselinella** Duponchel 白頭松巢蛾 (ASZI, 1987, 2:16; Liu, 1982[ed.]:230-231; Xiao, 1992:728; Zhang, 1978:118-119)
別 名：*白頭松針蛾*。
寄 主：油松。
分 佈：山東、山西、西北；歐洲。

2216. **Hyponomeuta padellus** (Linnaeus) 蘋果巢蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:45-48)
寄 主：蘋果、沙果、海棠、山楂、山荊子，也取食櫻桃、梨、杏等。
分 佈：陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

2217. **Ocnerostoma piniariellum** Zeller 油松巢蛾 (ASZI, 1987, 2:16; Liu, 1982[ed.]:229-230; Lu et Liu, 1983:161-162; Xiao, 1992:729)
寄 主：松屬、冷杉屬、檜屬等樹。
分 佈：山東、山西；日本、歐洲、北美。

2218. **Prays alpha** Moriuti 水曲柳巢蛾 (Xiao, 1992:730)
寄 主：核桃、水曲柳。
分 佈：黑龍江；日本。

2219. **Prays oleellus** Fabricius 油橄欖巢蛾 (Wang, 1987[ed.]:210-211)
寄 主：油橄欖(葉、花、果)。
分 佈：地中海沿岸。
附 註：國際重要檢疫害蟲。
天 敵：*Ageniaspis fuscicollis* 暗褐跳小蜂
Elasmus flabellatus 扁形釀小蜂
Bacillus thuringiensis 蘇雲金桿菌

2220. **Swammerdamia pyrella** (de Villers) 淡褐巢蛾 (ASZI, 1987, 2:17; Chen et Wang, 1987:38-39; Huang, 1990[ed.] 2:48-50; NZWDI, 1981:1689; Sun, 1984:352)

別　名：*小巢蛾*。
寄　主：蘋果、梨、山楂、櫻桃等(嫩芽、花蕾、葉片)。
分　佈：陝西、山西、甘肅、遼寧；日本、歐洲。

2221. **Yponomeuta evonymellus** (Linnaeus) 稠李巢蛾 (Hua., 1992:675; Liu, 1982[ed.]:228; Xiao, 1992:731)
寄　主：稠李、西洋桃、酸櫻桃、小花椒、山花椒、夜合花等。
分　佈：湖南、華北、東北；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

2222. **Yponomeuta padella** Linnaeus 蘋果巢蛾 (ASZI, 1987, 2:17; Cai et al., 1997(4):18-19; Chen et Wang, 1987:3738; Liu, 1982[ed.]:228; NZWDI, 1981:1691; Sun, 1984:353; Xiao, 1992:734)
=*Hyponomeuta malinella* Zeller,
別　名：*巢蟲*。
寄　主：蘋果(栽植的和野生的)、紅花、沙果、海棠、山楂、櫻桃、梨、杏、烏荊子和其他木本薔薇科植物。
分　佈：陝西、寧夏、甘肅、青海、山東、山西、河北、內蒙古、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、地中海、歐洲。

Argyresthiidae 食心蛾科

2223. **Argyresthia conjugella** Zeller 蘋果食心蛾 (Chang et Hung, 1986:73; Tsai, 1965:97)
寄　主：臺灣蘋果(果實)。
分　佈：臺灣。

2224. **Argyresthia ornatipennella** Moriuti (Heppner et Inoue., 1992:75)
Argyresthia ornatipennella Moriuti, 1974:
寄　主：
分　佈：臺灣。

2225. **Argyresthia taiwanensis** Moriuti (Heppner et al., 1992:75)
Argyresthia taiwanensis Moriuti, 1968:
寄　主：
分　佈：臺灣。

Lyonetiidae 潛蛾科

2226. **Leucoptera scitella** Zeller 旋紋潛蛾 (ASZI, 1987, 2:4; Chen et Wang, 1987:40-42; Jiang et al., 1998(1):43-43; Jin, 1994(2):40; Li, 1993:30; Liu et Gao, 1999(1):21; NZWDI, 1981:1683; Ren, 1994(2):30-31; Ren, 1994(2):30-31; Sun, 1995:39; Wou, 1961:395; Zhang, 1960:114-116, 125)
別　名：*旋紋潛葉蛾*、*蘋果潛葉蛾*。
寄　主：蘋果(*Malus pumila* Miller)、梨(*Pyrus* spp.)、沙果(*Mulus asiatica* Nakai)、海棠(*M. prunifolia* Borkh.)、三葉海棠(*M. sieboldii* Rehd.)、毛山荊子(*M. manchurica* (Maxim.) Komorov)、洋梨等果樹葉片。
分　佈：華東、華北、陝西、西北、河南、山東、河北、山西、遼寧、吉林；歐洲。
天　敵：*Pediobius* sp.　釉小蜂(越多世代寄生率可達 50%)

2227. **Lyonetia clerkella** (Linnaeus) 桃潛蛾 (ASZI, 1987, 2:5; Chang & Hung, 1986:72; Chen et al., 1997(1):43-44; Du et al., 1995(3):41; Guan, 1996(3):44; Heppner et al., 1992:75; Huang, 1990[ed.] 2:182-183; Huang, 1993:3334; Hun., 1992:670; Li, 1995:30; Liang et Li, 1997(4):30-31; Liu, 1995(3):43; Liu, 1996(4):45; Liu et Bi, 1993(2):26-27; Ren, 1994(2):30-31; Sun, 1984:373; Tsai, 1965:95; Wang et Zhang, 1996(1):12; Xu et Yang, 1994:26, 27; Yang et al., 2000(2):35; Zhang, 1987[ed.] 1:122; Zhang et al., 1998(1):13; Zhao et Wang, 1996(1):44-46)

Phalaena clerkella Linnaeus, 1758:
=*Tinea clerkella* Linnaeus, 1758:
=*Tinea cerasifoliella* Hübner, 1796:
=*Tinea malifoliella* Hübner, 1796:
=*Argyromiges autumnella* Curtis, 1829:
=*Heribeia unipunctella* Stephens, 1829:
=*Elachista aereella* Treitschke, 1833:
=*Argyromiges nivella* Stephens, 1834:
=*Argyromiges semiaurella* Stephens, 1834:
=*Argyromiges phrynella* O. Costa, 1839:
=*Elachista foscolombella* Duponchel, 1840:

別 名：*桃潛葉蛾、桃線潛蛾、桃線潛葉蛾*。
寄 主：桃、李、杏、蘋果、梨、櫻桃、山楂等葉片。
分 佈：臺灣、江西（武夷山）、雲南、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、遼寧；朝鮮、日本、歐洲。

2228. **Lyonetia prunifoliella** Hübner 銀紋潛蛾 (ASZI, 1987, 2:5; Chen et Wang, 1987:42-43)

寄 主：蘋果、海棠、沙果、山荊子、三葉海棠等。
分 佈：華東、華北、西北、東北、遼寧；日本。

Heliodinidae 舉肢蛾科

2229. **Atrijuglans hetaohai** Yang 核桃舉肢蛾 (ASZI, 1987, 2:12; An et Ju, 1993(2):47; Beijing FC., 1980[ed.]:375-377; Chen et Wang, 1987:202; Huang, 1990[ed.] 2:327-329; Liu, 1982[ed.]:377-378; Ma, 2000(2):15; NZWDI, 1981:1764; Sun et al., 1989(3):119; 1990:102-104; Wang, 1987[ed.]:195-196; Wang, 1992:145-147; 1995:29; Wang et al., 1995(1):11-12; Wang et al., 1996(4):12-14; Xiao, 1992:722; Zhang et al., 1992:129-130; Zheng et al., 1992:206)

寄 主：蘋果、山楂、核桃(果實)、核桃楸等。
分 佈：四川、貴州、河南、陝西、山西、河北、北京、西北；日本、西伯利亞東部、歐洲、美洲。
天 敵：Ichneumonidae 姬蜂科
Pristomerus sp. 舉肢蛾齒腿姬蜂(幼蟲,蛹)

2230. **Kakivoria flavofasciata** Nagano 柿蒂蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:378-379; Chang & Hung, 1986:73; Liu, 1982[ed.]:367-368; NZWDI, 1981:1792; Tsai, 1965:97; Wang, 1987[ed.]:253-254)

別 名：*柿舉肢蛾、柿實蛾*。
寄 主：柿(果實)。
分 佈：臺灣、江蘇、安徽、陝西、河南、山東、山西、河北；日本。
天 敵：*Pheropsophus fessoensis* Mor. 短鞘步甲

2231. **Stathmopoda auriferella** (Walker) 桃舉肢蛾 (ASZI, 1987, 2:13; Chang & Hung, 1986:74; Heppner et al., 1992:68; Tsai, 1965:97)

Gelechia auriferella Walker, 1864:
=*Stathmopoda divisa* Walsingham, 1891:
=*Stathmopoda ischnotis* Meyrick, 1897:
=*Stathmopoda crocophanes* Meyrick, 1897:
=*Aeikiscekus theoris* Meyrick, 1906:

=*Stathmopoda tharsalea* Meyrick, 1914:
=*Stathmopoda adulatrix* Meyrick, 1917:
=*Stathmopoda cirrhaspis* Meyrick, 1922:
=*Chrysoclista basiflavella* Matsumura, 1931:
別 名：*黃小舞蛾*。
寄 主：桃、酪梨、可可樹、臺灣蘋果(花)、棉(種子)、蓖麻(花及果皮)。
分 佈：臺灣、華東；日本、印度、斯里蘭卡、澳洲。

2232. **Stathmopoda masinissa** Meyrick 柿舉肢蛾 (ASZI, 1987, 2:13; Chang & Hung, 1986:73; Chen et Wang, 1987:207-208; Heppner et al., 1992:68; Huang, 1990[ed.] 2:316-318; Xiao, 1992:726; Yan, 1995(2):42; Yang et al., 1997(4):27; Yin, 1993(4):33)
Stathmopoda masinissa Meyrick, 1906:
=*Kakivoria flavofasciata* Nagano, 1916:
=*Stathmopoda albidorsis* Meyrick, 193 :
別 名：*柿實蛾*、*柿蒂蟲*。
寄 主：柿子(果實)。
分 佈：臺灣、安徽、江蘇、湖北、陝西、山西、山東、河南、河北；日本、斯里蘭卡。

2233. **Stathmopoda theoris** Meyrick 桃舉肢蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:124)
寄 主：桃。
分 佈：江西。

Thyrididae 網蛾科 (窗蛾科)

2234. **Glanycus foochowensis** Chu et Wang 蟬網蛾 (Hun., 1992:756; Yunn., 1987:897)
寄 主：板栗、櫟樹。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、雲南、西藏。

2235. **Glanycus tricolor** Moore 窗翅蟬網蛾 (Yunn., 1987:897)
寄 主：板栗、櫟樹。
分 佈：雲南。

2236. **Habrosyna derasa** Linnaeus 浩波紋蛾 (ASZI, 1987, 2:176)
寄 主：草莓。
分 佈：河北、遼寧、吉林、黑龍江、朝鮮、日本、印度、歐洲。

2237. **Herdonia osacesalis** Walker 石榴莖窗蛾 (Xiao, 1992:851; Zhang, 1987[ed.] 1:168)
寄 主：石榴(嫩梢)。
分 佈：雲南、浙江、安徽、山東、河南、陝西、山西、河北；日本、印度。

2238. **Rhodoneura exusta** Butler 板栗網蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:169)
寄 主：板栗、毛栗、櫟。
分 佈：江西。

2239. **Rhodoneura vitulla** Butler 褐斑栗網蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:169)
寄 主：栗、櫟。
分 佈：江西。

2240. **Striglina bispota** Chu et Wang 二點斜線網蛾 (Hun., 1992:758)
寄 主：栗、榆葉梅、楊梅、櫟、八寶樹。
分 佈：福建、浙江、江蘇、湖南、廣西、海南、四川、西藏。

2241. **Striglina curvita** Chu et Wang 曲線網蛾 (Hun., 1992:759)
寄 主：栗、櫟樹。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南。

2242. **Striglina scitaria** Walker 一點斜線網蛾 (Chang & Hung, 1986:81; Huang et Gao, 1996:289; Hun., 1992:758; Zhang, 1987[ed.] 1:169)
別 名：*斜線網蛾*。
寄 主：日本板栗、楊梅、梅、茶、麻櫟。
分 佈：臺灣、江西、海南、廣西、四川；朝鮮、日本、緬甸、印度、新幾內亞。

2243. **Striglina susukii** Matsumura 褐點網蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:170)
寄 主：柿。
分 佈：江西。

Pyralidae 螟蛾科

2244. **Acrobasis tokiella** Ragonot 果葉蜂斑螟 (ASZI, 1987, 2:75)
寄 主：梨、海棠、梅。
分 佈：黑龍江；朝鮮、日本。

2245. **Aglossa dimidiata** Butler 栗葉瘤叢螟 (ASZI, 1987, 2:79; Heppner et al., 1992:89; Hun., 1992:709; Yunn., 1987:900)
Crambus dimidiata Haworth, 1810:
=*Aglossa micalialis* Walker, 1859:
=*Pyralis circularis* Motschulsky, 1861:
=*Aglossa achatina* Butler, 1879:
寄 主：板栗、樟。
分 佈：雲南、湖北、上海；朝鮮、日本、印度。

2246. **Agrotera scissalis (Walker)** 褐角須野螟 (Heppner et al., 1992:84; Yunn., 1987:903)
Aediodes scissalis Walker, 1866:
寄 主：蒲桃。
分 佈：臺灣、江西、湖南、海南、雲南；印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

2247. **Anagastria kühniella** (Zeller)地中海斑螟 (ASZI, 1987, 2:78; Chao, 1982:237; Zhang, 1987[ed.] 1:150)
別 名：*地中海粉螟*。
寄 主：麵粉、穀物、種子、乾果、乾菜、糖果、食品、中藥材。
分 佈：江西、廣西、四川、江蘇；世界各地。

2248. **Aneonaepestis bengalella** Ragonot 番荔枝斑螟 (Chu et Shieh, 1989:310; Shieh et Chu, 1990:361)
[Atis moth borer]
寄 主：番荔枝屬(*Annona* spp.)、牛心梨等。
分 佈：臺灣；印度。

2249. **Cadra cautella** (Walker) 乾果斑螟 (ASZI, 1987, 2:77; Heppner et al., 1992:94; Chao, 1982:237; Hun., 1992: 707; Zhang, 1987[ed.] 1:150)
Pempeltia cautella Walker, 1863:
=*Cadra defectella* Walker, 1864:
=*Nephopteryx desuetella* Walker, 1866:
=*Cadra cahiritella* auct., part. (*nec* Zeller, 1867).
=*Ephestia passulella* Barrett, 1875:
=*Cryptoblabes formosella* Wileman & South, 1918: partum.
=*Ephestia rotundatella* Turati, 1930:
=*Ephestia irakella* Amsel, 1959:
別 名：*杏仁蛾、無花果蛾、粉斑螟、葡萄乾蛾*。
寄 主：各種植物種子、乾果、穀物、中草藥材及昆蟲標本。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南；斯里蘭卡、日本、伊拉克、西班牙、葡萄牙、法國、英國、德國、意大利、澳洲等。

2250. **Cadra figulilella** Gregson 葡萄乾果斑螟 (ASZI,1987, 2:78)
寄 主：乾果、核果、種子、麵粉、豆類。
分 佈：廣東、廣西、四川、江蘇；亞洲、歐洲、北非、西非、澳洲、北美、南美。

2251. **Cirrhochrista brizoalis** (Walker) 圓斑黃緣禾螟 (ASZI, 1987, 2:72; Chang & Hung, 1986:78; Heppner et al., 1992:82; Tsai, 1965:103; Yunn., 1987:900)
Margaronia brizoalis Walker, 1859:
=*Cirrhochrista aetherialis* Lederer, 1863:
別 名：*黃紋大螟蛾*。
寄 主：無花果。
分 佈：臺灣、廣東、香港、四川、雲南、湖北；朝鮮、日本、印尼、印度、澳洲。

2252. **Conogethes punctiferalis** (Guenée) 桃蛀野螟 (ASZI, 1987, 2:89; Cai et Mou, 1993(1):33; Chai et He, 1987:99-100; Chang et Hung, 1986:79; Chao, 1982:242; Chen, 1995(1):51; Chen et Wang, 1987:151-152; Di, 1993(1):34-35; Dou et al., 1995(3): 1-32; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1998[ed.]:196-297; Heppner et al., 1992:85; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:150-154; Huang et Gao, 1996:246; Huang et al., 1997:125; Hun., 1992:718; Li, 1994(2):32; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Lin, 1986[ed.]:340; Liu, 1982[ed.]:314-315; Liu, 1994, 20(5):23-24; Luan, 1995:26; Luo et al., 1996:59; NZWDI, 1981:1756; Ren et Sun, 1993(1):32; Song et Wu, 1992:53-55; Tang, 1994(20:30; Tang, 1998:44-45; Wang, 1987[ed.]:233-236; Wang et al., 1996(2):36-37; Xiao, 1992:865; Xue et al., 2000(2):24; Yunn., 1987:902, 910; Zhang, 1987[ed.] 1:161; Zhao et al., 1997:191; Zhao et all., 1998(4):28; Zhou, 1998:43)
Astura punctiferalis Guenée, 1854:
別 名：*桃蛀螟、桃螟蛾、桃斑螟、桃螟、桃蠹螟*。
[Peach pyralid moth]
寄 主：桃、梨、蘋果、臺灣蘋果、杏、李、榛、梅、枇杷、山楂、櫻桃、柑橘、文旦、荔枝、龍眼(果、果穗)、橡果、柿、葡萄、石榴、無花果、板栗、核桃、馬尾松(幼林)、雲南松、高山松、杉、臭椿、棉、姜、向日葵、蓖麻、玉米、高粱、大豆等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、湖北、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲、美國、全世界。
天 敵：蜘蛛(一種,捕食成蟲)
Coccygomimus diaparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Trathala flavorbitalis (Cameron) 黃眶離緣姬蜂 (幼蟲)
Brachymeria lasus Walker 廣闊小蜂(蛹)
Tetrastichus ayyari Rohwer 印度嚙小蜂

2253. **Cryptoblabes gnidiella** (Milliere) 高粱穗隱斑螟 (ASZI, 1987, 2:75)
寄 主：柑橘、葡萄、安石榴、高粱、甘蔗、櫨子、瑞香、蓖麻、玉米、欅椥。
分 佈：廣東、廣西、江蘇；亞洲、太平洋島嶼、非洲、地中海、歐洲、南美洲。

2254. **Cryptoblabes lariciana** Matsumura 落葉松隱斑螟 (Xiao, 1992:861)
寄 主：落葉松。
分 佈：黑龍江；日本。
天 敵：白僵菌(蛹)
寄生蜂(蛹)
(白僵菌及寄生蜂總寄生率 54.7 %)

2255. **Diaphania caesalis** (Walker) 黃翅絹野螟 (ASZI, 1987, 2:91; Luo et Jin, 1997:75; Luo et Li, 1998:86; Wang, 1963:361; Yunn., 1987:912)
寄 主：菠蘿蜜、麵包果樹。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南；菲律賓、越南、新加坡、印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

2256. **Diaphania indica** (Saunders) 瓜絹野螟 (Chang & Hung, 1986:78; Chao, 1982:241; Heppner et al.,1992:87; Hun., 1992:717)
Eudioptis indica Saunders, 1851:
=*Borys hyalinalis* Boisduval, 1834: emend. misid.
=*Eudioptis capensis* Zeller, 1852:
=*Phakellura zygaenalis* Guenée, 1854:
=*Phakellura gazorialis* Guenée, 1854:
=*Phakellura cucurbitalis* Guenée, 1863:
=*Eudioptis hyalinata* Shiraki, 1910: (*nec* Linnaeus, 1758).
別 名：*瓜螟、瓜野螟蛾、瓜絹螟、棉螟蛾、印度瓜野螟*。
寄 主：桑、茶、瓜類、葵葉、棉、木槿、梧桐、泡桐等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本、印尼、澳洲、南非。
天 敵：*Phanerotoma planifrons* Nees 甲腹繭蜂(幼蟲)

2257. **Diaphania nigropunctalis** (Bremer) 白蠟絹野螟 (ASZI, 1987, 2:91; Wang, 1963:362; Yunn., 1987:911)
寄 主：橄欖、白蠟樹、木犀、女貞、梧桐、丁香、紫丁香。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、東北；

朝鮮、日本、菲律賓、越南、印尼、印度、斯里蘭卡。

2258. **Diaphania pyloalis** (Walker) 桑絹螟 (Chao, 1982:242; Lin, 1986[ed.]:368-370; NZWDI, 1981:1109; Suzhou CS., 1985:204-206; Tao, 1980:230; Wang, 1963:362; Zhang, 1987[ed.] 1:160; Zheng, 1982:204-206)
Diaphania pyloalis Walker, 1859:973.
別 名：*桑螟，青蟲，捲葉蟲*。
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京(我國蠶區都有發生)；朝鮮、日本、琉球、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲東部。
天 敵：*Halyomorpha picus* Fabricius 茶翅蝽
Carabidae 步行甲
Vespidae 胡蜂
Coccygomimus aethiops (Curtis) 滿點黑瘤姬蜂(幼蟲)
Epiurus nankingensis Uchida (幼蟲)
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 桑螟聚瘤姬蜂(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *kuwanae* (Viereck) 桑螟聚瘤姬蜂(幼蟲)
Pristomerus erythrothracis Uchida 紅胸齒腿姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla punctata Fabricius 廣黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Apanteles heterusiae Wilkinson 桑螟絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles minor Ashmead
Apanteles stantoni (Ashmed) 絹野螟絨繭蜂(幼蟲)
Aulacocentrus philippinensis (Ashmead) 菲島腔室繭蜂(幼蟲)
Cedria paradoxa Wilkinson 守子蜂(幼蟲)
Macrocentrus abdominalis Fabricius
Macrocentrus philippinensis Ashmead 菲島赤繭蜂(幼蟲)
Macrocentrus japonicus Watanabe
Meterous japonicus Ashmead
Phanerotoma philippinensis Ashmead
Phanerotoma planifrons Nees
Brachymeria lasus Walker 廣闊小蜂(蛹)
Elasmus philippinensis Ashmead 菲島釉小蜂
Sympiesis sp 釉小蜂.(蛹)
Tetrastichus aygari Roh. 大角嚙小蜂(幼蟲)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Zenilbia roseanae B. B. 寄蠅
Hesamerimis microamphides Steiner 線蟲(幼蟲)

2259. **Dichocrocis chlorophanta** Butler 三條蛀野螟 (Zhang, 1987[ed.] 1:161)
寄 主：柿、粟、高粱、大豆、梧桐。
分 佈：江西。

2260. **Dioryctria abietella** (Denis et Schiffermüller) 針葉蛀螟 (Chang & Hung, 1986:79; Heppner et al., 1992:92; Li et Li, 1992:141-146; Li et al., 1992:4; Yunn., 1987:900)
Tinea abietella Denis et Schiffermüller, 1775:
=*Tinea decurtella* Hübner, 1796:
別 名：*雲杉球果螟*。

寄 主：華山松、雲南松、*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果、新梢)、落葉松、冷杉、雲杉。
分 佈：雲南、陝西、山西、黑龍江；西伯利亞、亞洲、歐洲、北美洲。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus nipponicus Uchida 日本黑瘤姬蜂(幼蟲)

2261. **Dioryctria kunmingnella** Wang et Sung 昆明松梢斑螟 (Wang et Sung, 1985:303)
Dioryctria kunmingnella Wang et Sung, 1985:303.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

2262. **Dioryctria mendacella** Staudinger 油松球果螟 (Beijing FC., 1980[ed.]:363-365; Heilongjian Mudingjiang FS., 1988[ed.]:197-198; Liu, 1982[ed.]:241-242; Zhan, 1981:20-22)
寄 主：華山松、白皮松、紅松、油松、黑松、樟子松、馬尾松、赤松(球果及嫩梢)。
分 佈：四川、江蘇、河南、陝西、山東、北京、甘肅、遼寧、吉林。
天 敵：*Phanerotoma kozlovi* Kok. 考氏白繭蜂(幼蟲)(寄生率 10-15 %)

2263. **Dioryctria mongolicella** Wang et Sung 樟子松梢斑螟 (Wang et Sung, 1982:323; Xiao, 1992:866)
Dioryctria mongolicella Wang et Sung, 1982:323.
寄 主：紅松、樟子松。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江。
天 敵：Braconidae 繭蜂科
螟蟲長距繭蜂(寄率可達 30-40 %)

2264. **Dioryctria mutatella** Fuchs 棘鞘斑螟 (Wang et al., 1990, 1:70-74; Yue et al., 1990,1:33; Yue et al., 1990, 1:70-74; Zhang et al., 1990, 1:75-80)
寄 主：*Pinus massoniana* 馬尾松(松果)
Pinus taeda 火炬松(松果)
Pinus armandti 華山松(松果)
Pinus yunanensis 雲南松(松果)
Pinus syovestris var. *mongolica* 樟子松(松果)
國外：*Pinus sylvestris* 歐赤松(松果)
Pinus nigra 南歐黑松(松果)
Pinus strobus 北美喬松(松果)
Pinus griffithii 喬松(松果)
分 佈：福建、雲南、四川、浙江、江蘇、內蒙古；歐洲、美洲。

2265. **Dioryctria (Phycita) pryeri** Ragonot 松果梢斑螟 (ASZI, 1987, 2:76; Chang & Hang, 1986:79; Heppner et al., 1992:92; Li, 1992:47-57; Li et Li, 1992:141-146; Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:13-20; Li et al., 1992:21-25; Li et al., 1992:26-30; Li et al., 1992:31-34; Li et al., 1992:35-39; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:58-61; Li et al., 1992:63; Li et al., 1992:70-72; Li et al., 1992:75-81; Li et al., 1992:82-89; Li et al., 1992:90-96; Li et al., 1992:135-140; Xiao, 1992:868; Yie et al., 1967:1-3)
Dioryctria pryeri Ragonot, 1893:
=*Rhodophaea incertella* Wileman, 1911:
=*Salebria laruata* Heinrich, 1928:
別 名：*果梢斑螟，松斑螟*。

寄　主：華山松、紅松、白皮松、*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(雄花、雌球花、球果、種子、新梢)、馬尾松、火炬松、赤松、黑松、黃山松、樟子松、落葉松、雲杉等球果及嫩梢內。

分　佈：臺灣、四川、浙江、安徽、江蘇、陝西、河南、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、巴基斯坦、土耳其、法國、意大利、西班牙。

天　敵：*Diadegma* sp.　彎尾姬蜂(蛹)

Dolichomitus sp.　兜姬蜂(蛹)

Hyposter sp.　鑲顎姬蜂(蛹)

Pristomerus chinensis Ashmead　中華齒腿姬蜂(幼蟲)

Macrocentrus resinellae (Linnaeus)　球果卷蛾長體繭蜂(幼蟲寄生率一般約 20 % 左右，有時高達 35 %)

Phanerotoma koxlovi Kook.　考氏白繭蜂(幼蟲)

Phanerotoma sp.　愈腹繭蜂

Protomicroplitis spreta Marsh.　斑螟大距側溝繭蜂(幼蟲)

Eurytoma sp.　廣小蜂(幼蟲)

Pediobius sp.　釉小蜂(幼蟲)

Beauveria bassiana　白僵菌(蛹)

2266. **Dioryctria rubella** Hampson 微紅梢斑螟 (ASZI, 1987, 2:76; Chao, 1982:237; Hun., 1992:708; Li et Li, 1992:141-146; Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:13-20; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:63; Wang et Sung, 1985:306; Xiao, 1992:869; Yunn., 1987:899)

Dioryctria rubella Hampson, 1901:533.

=*Dioryctria splendidella* Tsai 1973:213. (*nec* Herrich-Schaeffer).

別　名：*松梢螟，松梢斑螟*。

寄　主：華山松、紅松、白皮松、*Pinus tabulaeformis* Carr.　油松(球果、種子、新梢)、赤松、黑松、馬尾松、黃山松、雲南松、樟子松、火炬松、加勒比松、濕地松、喬松、雪松、雲杉等。

分　佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、陝西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

天　敵：*Itoplectis alternans spectabilis* (Matsumura)　松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)

Macrocentrus resinellae (Linnaeus)　球果卷蛾長體繭蜂(幼蟲)

長距繭蜂(幼蟲,寄生率約 20 %)

Brachymeria lasus Walker　廣闊小蜂(蛹)

Trichogramma chilonis Ishii　螟黃赤眼蜂(卵)

Trichogramma dendrolimi Matsumura　松毛蟲赤蜂(卵)

2267. **Dioryctria splendidella** Herrich-Schaffer 松梢斑螟 (Beijing FC., 1980[ed.]:169-171; Chang & Huang, 1986:79; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:198-199; Liu, 1982[ed.]:239-241; Zhang, 1987[ed.] 1:151)

寄　主：紅松、華山松、馬尾松、火炬松、加勒比松、濕地松、黑松、油松、赤松、黃山松、雲南松、樟子松、雲杉(幼蟲蛀食主梢)。

分　佈：臺灣、江西、全國各地；朝鮮、日本、歐洲。

天　敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2268. **Dioryctria sylvestrella** Ratzeburg 赤松梢斑螟 (Wang et Sung, 1985:309; Xiao, 1992:871)

Phycis sylvestrella Ratzeburg, 1840:242. (partum).
寄 主：紅松、赤松。
分 佈：江蘇、河北、遼寧、黑龍江；日本、芬蘭、意大利。

2269. **Dioryctria yuennanella** Caradja 華山松梢斑螟 (Wang et Sung, 1985:304; Yunn., 1987:899, 909)
Dioryctria yuenanella Caradja et Meyrick, 1937:154.
寄 主：華山松(枝梢或球果)。
分 佈：雲南。

2270. **Ephestia elutella** (Hübner) 煙草粉斑螟 (ASZI, 1987, 2:78)
寄 主：煙草、糧食種子、可可、乾果、糖果。
分 佈：廣東、湖南、江蘇；印尼、印度、斯里蘭卡、歐洲、南非、澳洲、美洲。

2271. **Etiella bollandella** (Ragonot) 果莢斑螟 (ASZI, 1987, 2:76; Zhang, 1987[ed.] 1:151)
寄 主：梨、蘋果、海棠。
分 佈：江西、雲南；朝鮮、日本。

2272. **Etiella zinckenella** (Treitschke) 豆莢螟 (Zhou et al., 1994, 20(2):35)
寄 主：銀杏(果、核仁)。
分 佈：山東。

2273. **Eurhodope tokiella** Raget 枇杷筒斑螟 (Xu, 1995(2):50)
寄 主：枇杷。
分 佈：江西。

2274. **Euzophera alpherakyella** Ragonot 沙棗暗斑螟 (Xiao, 1992:875)
寄 主：沙棗樹。
分 佈：新疆；蘇聯。
天 敵：阿古雷寄蠅(蛹,寄生率爲 34.9-65.8 %)
象甲盆蜂(蛹,寄生率 40-55 %)
Braconidae 繭蜂科 (五種)
小蜂一種

2275. **Euzophera pyriella** Yang 香梨優斑螟 (Meng, 1996(3):43; Song et al., 1994, 20(3):13-15)
寄 主：香梨。
分 佈：新疆。

2276. **Glyphodes nigropunctalis** Bremer 白蠟葉螟 (Chang & Hung, 1986:79)
寄 主：橄欖、白蠟樹、梧桐。
分 佈：臺灣、華北、東北。

2277. **Glyphodes pyloalis** Walker 桑絹野螟 (ASZI, 1987, 2:91; Chang & Hung, 1986:79; Heppner et al., 1992:87; Hun., 1992:720; Liu, 1995:36-37; Yunn., 1987:906, 91)
Glyphodes pyloalis Walker, 1859:
=*Glyphodes sylpharis* Butler, 1878:
別 名：*桑葉螟*、*桑卷葉蟲*、*桑絹螟*、*桑螟*、*桑蛾*、*桑野螟*。

寄 主：桑(葉)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山西、河北、北京；朝鮮、日本、越南、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。
天 敵：*Apanteles* sp.　絨繭蜂
Brachymeria lasus Walker　廣闊小蜂(蛹)

2278. **Herpetogramma luctuosalis** (Guenée) 葡萄卷葉野螟 (ASZI, 1987, 2:86; Chang & Hung, 1986:80; Heppner et al., 1992:88; Hun., 1992:726; Yunn., 1987:904)
Hyalitis luctuosale Guenée, 1854:
=*Botys aemealis* Walker, 1859:
=*Botys cosisalis* Walker, 1859:
=*Coptobasis andamanalis* Moore, 1877:
寄 主：葡萄、野葡萄、桑。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、黑龍江；朝鮮、日本、越南、沙勞越、印尼、安達曼群島、印度、斯里蘭卡、東非、歐洲。

2279. **Lamprosema charesalis** (Walker) 香蕉蛀指螟 (Heppner et Inoue, 1992:289)
Botys charesalis Walker, 1859:
=*Archernis humilis* Strand, 1918:
寄 主：香蕉果指。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、東南亞及一些島嶼、印度北部。

2280. **Locastra muscosalis** (Walker) 綴葉叢螟 (ASZI, 1987, 2:78; Cai et al., 1999(1):70; Chang & Hung, 1986:79; Chao, 1982:238; Chen, 1995, 21(4):24-26; Chen et Wang, 1987:205-206; Gao, 1986, 23(3):122-123; Heppner et al., 1992:91; Huang, 1990[ed.] 2:332-333; Hun., 1992:708; NZWDI, 1981:1769; Wang, 1987[ed.]:186-187, 206; Xiao, 1992:878; Yunn., 1987:910; Zhang, 1987[ed.] 1:152)
Taurica muscosalis Walker, 1866:
=*Taurica sikkima* Moore, 1888:
=*Locastra cristalis* Hampson, 1893:
別 名：*核桃綴葉螟*、*樟巢螟*。
寄 主：核桃、木橑、樟、漆樹、黃連木、楷木、楓香、鹽膚木、陰香。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、天津、河北、北京、遼寧；日本、印度、錫金、斯里蘭卡。
天 敵：擬青霉屬
白僵菌
Isaria farinosa Dicke　蟲花
Tenodera sinensis (Saussure)　中華大刀螂
Coccinellidae　瓢蟲科(卵)
Ichneumonidae　姬蜂科(幼蟲)
Apanteles sp.　絨繭蜂(幼蟲
Phanerotoma flava Ashmead　黃愈腹繭蜂(卵－幼蟲)
Poecilogonalos flavoscutellata Chen　黃盾紋鉤腹蜂(ex *Phanerotoma flava*)
Elasmus sp.　躍小蜂(ex *Apanteles* sp.)
Villa sp.　絨毛蜂虻(前蛹)

Pales pavida (Meigen)　藍黑櫛寄蠅(幼蟲、蛹)
鳥類(幼蟲)：山雀、麻雀、灰喜鵲、劃眉、黃鸝

2281. **Macalla** sp. 腰果溝脛螟 (Luo, 1991:87)
寄 主：腰果(葉芽、花芽)。
分 佈：海南。

2282. **Militene bigidella** Leech 梨捲葉斑螟 (Huang, 1990[ed.] 2:124-126)
別 名：*梨卷葉蟲*。
寄 主：梨(葉)。
分 佈：浙江、江蘇、河南、山東、河北、遼寧。

2283. **Nephopteryx eugraphella** Ragonot 人心果雲斑螟 (Luo et Jin, 1997:72; Luo et Li, 1998:84)
寄 主：人心果(嫩梢、葉片、果實)。
分 佈：海南。

2284. **Nephoterix perivorella** (Matsumura) 梨雲翅斑螟 (ASZJ, 1987, 2:77; Chao, 1982:238; Chen et Wang, 1987:117-119; Huang, 1990[ed.] 2:85-89; Huang et Gao, 1996:247; Li, 1994:33; Li, 1996, 13(4):276; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Li et al., 1996(2):49; NZWDL, 1981:1723; Pang et al., 1998:44; Sun, 1984:360-361; Sun, 1995:38; Wang, 1998:34-35; Wu et al., 1998(4):25; Yin et al., 1994(3):54; Zhang, 1997(3):41-42; Zhao et al., 1998(4):28)
別 名：*梨斑螟蛾、梨大食心蟲*。
[Large pear borer, Pear fruit moth]
寄 主：梨、杜梨、蘋果等。
分 佈：福建、廣西、雲南、四川、陝西、華東、華中、青海、甘肅、寧夏、華北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞。
天 敵：*Trathala flavo-orbitalis* (Cameron)　黃眶離緣姬蜂(幼蟲)
Exeristes sp.　瘤姬蜂
Campoplex sp.　離緣姬蜂
Tachinidae　寄蠅科

2285. **Nephoterix** sp. 腰果雲翅斑螟 (Luo, 1991:87; Luo et Li, 1998:68, 78)
寄 主：腰果(幼果、果)、梨、檬果(果)。
分 佈：海南。

2286. **Nephopterix** sp. 蛀果斑螟 (Luo et al., 1996:59)
寄 主：檬果(果)。
分 佈：海南。

2287. **Orthaga achatina** Butler 樟叢螟 (Jiang, 1990:28-29; Zhang, 1987[ed.] 1:152)
別 名：*栗葉瘤叢螟*。
寄 主：樟、栗。
分 佈：江西。

2288. **Orthaga euadrusalis** Walker 鹽膚木瘤叢螟 (Huang, 1995, 18(4):14-15)
寄 主：檬果、鹽膚木。
分 佈：海南、廣東、廣西、雲南；日本、印度、斯里蘭卡、印尼。

2289. **Orybina flaviplaga** (Walker) 金雙點螟 (Heppner et al., 1992:90; Yunn., 1987:901)

Oryba falviplaga Walker, 1863:

寄 主：柑橘。

分 佈：臺灣、浙江、江西、廣東、廣西、雲南、四川；緬甸、印度。

2290. **Ostrinia furnacalis** (Guenée) 亞洲玉米螟 (Cao et al., 1994, 21(4):345-350; Chang et Chen, 1989:416;Chang & Hung, 1986:80; Chao, 1982:244; Chen, 1997:47-48; Chen et Wang, 1987:18; Chen et al., 1982, 9(4):217-221; Chiu et Chen, 1986:23-30; Chu et Hung, 1991:19-24; Chiu et Chien, 1985:299-316; Chow et al., 1984:389-394; Dai et al., 1997, 24(1):7-12; Du, 1983, (4):44; Gu et al., 1979, 16(3):99-104; 1985, (1):52-59; 1993, (6):6-12; Hsu et Hsieh, 1983:294-295; Hsu et al., 1984:379-388; 1984:432-433; Hsu et al., 1988:1-9; 148-156; Huang et Hung, 1987:416; Huang et al., 1985:451; Hung et Chu, 1987:164; 1989:59-67; Hung et Huang, 1990:89-99; Hung et al., 1988:65-71; 95-103; 1990:109-117; Jia et al., 1987, (2):31-32, Kang et al., 1993, 7(3):175-179; Kui et al., 1991, (1):28-31; Lei et al., 1992-93, 11:51-56; Li et Gao, 1996, 22(4):40-42; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Li et al., 1992, 1:69-72; Liu, 1982, 8(6):6; Liu et Hou, 1997(2):40-41; Lu et Zhou, 1998, 25(3):213-217; Lu et Zhou, 1999, 26(1):1-6; Lu et al., 1993, 20(4):313-318; Lu et al., 1994, 21(3):215-219; Lu et al., 1995, 21(6):588-592; Lu et al., 1996, 23(2):126-130; Ma et al., 1986:117; Mutuura & Munroe, :33; Qiu et al., 1964, 3(3):307-312; Qiu et al., 1999, 26(4):319-323; Song et al., 1999, 26(4):324-328; Sun et al., 1965, 14(5):423-431; Tang et al., 1986, 2(3):27-33; Tseng, 1989:34-43; Tseng et Tu, 1974:34-39; Wang, 1981, 4:72-80; Wang, 1983, 20(5):195; Wang et al., 1994, 21(1):25-31; Wang et al., 1995, 22(1):7-11; Wang et al., 1997, 18(6):270-271; Wen et al., 1992, 25(1):44-49; Wu et al., 1963, 2(2):135-139; Xia, 1994, 20(5):53-54; Xie et al., 1989, 15(4):16-18; Yang et al., 1994, 21(4):333-337; Yu, 1995:515-521; Yu et al., 1992:295-310; Zhai et Chen, 1989, (1):40-46; Zhang et al., 1965, 6:548-556; Zhou et al., 1980, 7(2):113-122; Zhou et al., 1995:85-87)

Botys furnacalis Guenée, 1854:

=*Botys damoalis* Walker, 1859:

=*Botys salentialis* Snellen, 1880:

=*Spilodes kodzukalis* [Holland MS] Matsumura, 1897:

=*Pyrausta polygoni* Dyar, 1905:

=*Pyrausta vastatrix* Schultze, 1908:

Ostrinia furnacalis, Mutuura & Munroe, 1970:

寄 主：蘋果、枇杷、茶、玉米、薑等。

分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、蘇聯、越南、菲律賓、婆羅洲、西里伯斯、印尼、馬來亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、大洋洲、澳洲。

天 敵：*Theronia atalantae gestator* (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)

Trathala flavo-orbitalis (Cameron) 黃眶離緣姬蜂(幼蟲)

Trichomma cnophalocrocis Uchida 姬蜂

Pristomerus chinensis Ashmead 中華齒腿姬蜂(幼蟲)

Xanthopimpla punctata (Fabricius) 廣黑點瘤姬蜂(幼蟲)

Xanthopimpla stemmato Thunberg 螟黑點瘤姬蜂(幼蟲)

Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂(卵)

Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)

Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂(卵)

Trichogramma forcipiformis Zhang et Wang 鋏突赤眼蜂(卵)

Trichogramma ostriniae Pang et Chen 亞洲玉米螟赤蜂(卵)

Trichogramma tielingensis Zhang et Wang 鐵嶺赤眼蜂(卵)

Carcelia kockiana Townsend 善飛狹頰寄蠅

Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅

Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 玉米螟厲寄蠅

Paradrino atrisetosa Shima 黑毛類贅寄蠅

2291. **Picrogama semifoedalis** (Walker) 柑橘果皮螟 (Chang & Hung, 1986:81; Heppner et al., 1992:91)
Botys semifoedalis Walker, 1866:
=*Picrogama anticosma* Meyrick, 1897:
寄 主：柑橘類(果皮)。
分 佈：臺灣；印尼、印度。

2292. **Pleuroptya balteata** (Fabricius) 枇杷捲葉野螟 (ASZI,1987, 2:85; Heppner et al., 1992:86; Yunn., 1987:904, 910)
Phalaena balteata Fabricius, 1798:
=*Botys crocealis* Duponchel, 1831:
=*Botys aurantiacalis* Fischer von Röslerstamm, 1840:
=*Botys accipitralis* Walker, 1866:
=*Botys aurea* Butler, 1879:
=*Hapalia fraterna* Moore, 1886:
=*Syleptа*[sic] *evergestialis* Strand, 1918:
寄 主：枇杷、栗樹、柞樹、橡樹、櫧樹、黃連木、乳香、篤耨香、櫨木。
分 佈：臺灣、雲南、西藏、四川、浙江；朝鮮、日本、越南、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲。

2293. **Pleuroptya chlorophanta** (Butler) 三條蛀野螟 (ASZI, 1987, 2:89; Chang & Hung, 1986:79; Heppner et al., 1992:86; Hun., 1992:718)
Botys chlorophanta Butler, 1878:
寄 主：板栗、柿子、櫻、梧桐。
分 佈：臺灣、福建、廣東、浙江、江蘇、北京、內蒙古；朝鮮、日本。

2294. **Plodia interpunctella** (Hübner) 印度穀螟 (Chao, 1982:238; Chen et al., 1993:73; Wang, 1964:628-631; Zhang, 1987[ed.] 1:151)
別 名：*黃掛穀螟*。
寄 主：糧食、紅棗、乾果、蜜餞、堅果等倉庫貯物、棗鮮果。
分 佈：全世界。

2295. **Prophantis octoguttalis** (Felder et Rogenhofer) 咖啡漿果蛀野螟 (ASZI, 1987, 2:98; Yunn., 1987:909, 913)
Prophantis octoguttalis Felder et Rogenhofer, 1875: (*nec* Ischnurges *octoguttlis* Shibuya, 1928)
寄 主：咖啡漿果。
分 佈：臺灣、廣東、雲南、四川；日本、越南、印尼、馬來西亞、印度、錫金、斯里蘭卡、澳洲、剛果、肯尼亞、坦桑尼亞。

2296. **Pseudonoorda minor** Munroe 檬果小齒螟 (Luo et Li, 1998:68; Teng et Shu, 1995(4):12-14, 22)
寄 主：檬果(果)。
分 佈：海南、廣西。

2297. **Plodia interpunctella** (Hübner) 印度穀螟 (Chao, 1982:238; Wang, 1964:628-631)
別 名：*黃掛穀螟*。
寄 主：糧食、乾果、蜜餞、堅果等倉庫貯物、棗鮮果。
分 佈：全世界。

2298. **Rhodophaea pirivorella** Matsumura 梨大食心蟲 (Wang et al., 2000(2):22; Xing et al., 1986:165-169; Zhang, 1987[ed.] 1:151)

[Pear fruit moth]
別 名：*梨雲翅斑螟*。
寄 主：梨(果實、芽)。
分 佈：遼寧；朝鮮、日本。
天 敵：*Gregopimpla himalayensis* Cameron 喜馬拉雅聚瘤姬蜂
黃眶離緣姬蜂
Braconidae 繭蜂科
Eurytomidae 廣肩小蜂科
Syrphidae 食蚜蠅科
Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker) 稻苞蟲賽寄蠅

2299. **Scirpophaga praelata** (Scopoli) 荸薺白螟 (Zhong et al., 1995, 21(4):28-29)
寄 主：荸薺。
分 佈：臺灣、福建、浙江。

2300. **Sylepta balteata** (Fabricius) 枇杷螟 (ASZI, 1987, 2:85; Chao, 1982:245; Zhang, 1987[ed.] 1:166)
別 名：*枇杷卷葉野螟，茶卷葉螟*。
寄 主：枇杷、栗樹、茶、柞樹、橡樹、楓楊、白櫟、櫧、黃連木、乳香、篤耨香、橡木、鹽膚木。
分 佈：臺灣、福建、江西、四川、雲南、西藏；朝鮮、日本、越南、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲。

2301. **Sylepta luctuosalis** Guenée 葡萄葉螟 (ASZI, 1987, 2:86; Chao, 1982:245; Zhang, 1987[ed.] 1:167)
別 名：*葡萄卷葉野螟*。
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西、黑龍江；西伯利亞、日本、越南、印尼、印度、斯里蘭卡、非洲(東部)、歐洲(南部)。

2302. **Sylepta** sp. 粗腳姬捲葉蛾 (Ho, 1985:57; 1988:45-51)
寄 主：楊桃(果)。
分 佈：臺灣。

2303. **Tirathaba mundella** Walker 椰綴蛾 (Chen, 1975:447; Pingtung AC., 1986:60-61)
Tirathaba mundella Walker, 1864:
寄 主：可可椰子(果穗、幼果、心葉)。
分 佈：臺灣；沙勞越。

2304. **Tirathaba rufivena** (Walker) 紅脈穗螟 (ASZI, 1987, 2:68; Luo et Li, 1998:25, 100; Xiao, 1992:883)
別 名：*紅脈穗螟*。
寄 主：檳榔、椰子、油棕等棕櫚科植物(花穗、幼果)。
分 佈：海南；馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡、澳洲。

2305. 皮暗斑螟 (Yang et al., 1994(2):31)
寄 主：棗(甲口)。

分 佈：河北。

Pterophoridae 羽蛾科

2306. **Diacrotricha fasciola** Zeller 楊桃羽蛾 (Heppner et al., 1992:96; Ho, 1986:57)
Diacrotricha fasciola Zeller, 1851:
寄 主：楊桃。
分 佈：臺灣；印尼(爪哇)。

2307. **Nippoptilia minor** Hori 小褐羽蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:137)
寄 主：烏蘞梅、葡萄。
分 佈：江西。

2308. **Nippoptilia vitis** (Sasaki) 葡萄羽蛾 (Chang, 1987:40; Chang & Hung, 1986:78; Heppner et al., 1992:95; Tsai, 1965:102; Zheng et al., 1993, 19(5):15-16)
Stenoptilia vitis Sasaki, 1913:
=*Oxyptilus mycites* Meyrick, 1914:
=*Stenoptilia vitata* Takahashi, 1017:
=*Oxyptilus formosanus* Matsumura, 1931:
寄 主：葡萄、山葡萄。
分 佈：臺灣、吉林；朝鮮、日本。

2309. **Oxyptilus periscelidactylus** Fitch 羽蛾 (He, 1995(3):41)
寄 主：楊桃。
分 佈：廣西。

Sessidae 透翅蛾科 (Aegeriidae)

2310. **Aegeria molybdoceps** Hampson 栗透翅蛾 (Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:356-358; Huang et Gan, 1996:265; Liu, 1982[ed.]:365-366; NZWDI, 1981:1787; Wang, 1987[ed.]:226-227; Zhang, 1987[ed.] 1:122)
別 名：*赤腰透翅蛾*。
寄 主：板栗。
分 佈：福建、江西、浙江、江蘇、山東、河北；日本。

2311. **Conopia hector** Butler 蘋果透翅蛾 (ASZL 1987, 2:100; Chen et Wang, 1987:47-48; NZWDI, 1981:1696; Yin et Run, 1995:42; Zhang, 1997(3):41-42)
別 名：*小透羽*。
寄 主：蘋果、桃、梨、杏、李、梅、櫻桃等主枝、主幹皮下蛀食皮層。
分 佈：浙江、陝西、山東、西北、甘肅、遼寧；日本。

2312. **Paradoxecia pieli** Lieu 桑透翅蛾 (ASZL 1987, 2:101; NZWDI, 1981:1120; Suzhou CS., 1985:229-231; Tao, 1980:251; Zheng, 1982:229- 231)
別 名：*桑蛀蟲*。
寄 主：桑樹。
分 佈：貴州、四川、浙江、江蘇。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2313. **Paranthrene actinidiae** Yang et Wang 獼猴桃准透翅蛾 (Huang et Gao, 1996:291; Jiang et al., 1991:16-17; Yang et al., 1993:346-347)

寄 主：*Actinidia chinensis* Planch 中華獼猴桃
Actinidia eriantha Benth. 毛花獼猴桃
Actinidia fulvicoma Hance. 棕毛獼猴桃

分 佈：福建、貴州、四川、湖北。

2314. **Paranthrene regalis** Butler 葡萄透翅蛾 (ASZI, 1987, 2:101; Chen et Wang, 1987:179; Ge, 1998(4):45; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:374-375; Huang et Gao, 1996:285; Hun., 1992:728; Jian, 1982:37-38; Jiang et Su, 1996(3):55-57; Liu, 1997(2):46; Lu, 1996(2):48-49; NZWDI, 1981: 1747; Su et al., 1999(1):60; Xu, 1988, 6(1,2):52; Yang et Dong, 1995:45-46; Zhang, 1987[ed.] 1:122; Zhao et Zhou, 1993, 30(2):93-94; Zhou, 1991, 18(1):45-48; Zhou, 1996, 33(2):90-92; Zhou, 1998, 35(2):79-82; Zhou et Zhang, 1996(3):50; Zhou et al., 1999, 26(2):167-170;)

寄 主：葡萄、蛇葡萄(*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv.)。

分 佈：福建、江西、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、遼寧；朝鮮、日本。

2315. **Sacada erythrocephala** Wu et al. 紅頭螟蛾 (Wu et al., 1996, 18(3):116-120)

Sacada erythrocephala Wu et al., 1996, 18(3):116-120.

寄 主：荔枝。

分 佈：廣東。

2316. **Sesia molybdoceps** Hampson 赤腰透翅蛾 (Xiao, 1992:711)

寄 主：板栗、美國山核桃、歐洲栓皮櫟、麻櫟、栓皮櫟。

分 佈：江蘇、山東。

2317. **Sesia rhynchioides** (Butler) 黑赤腰透翅蛾 (Xiao, 1992:713)

寄 主：板栗。

分 佈：山東；日本。

2318. **Synanthedon castanevora** Yang et Wang 板栗興透翅蛾 (Li et Cai, 1996(4):20; Xiao, 1992:716)

寄 主：板栗。

分 佈：河北、北京。

天 敵：真菌
白僵菌
絨繭蜂(幼蟲寄生率約為 17 %)
中華棱角腫腿蜂(寄生率約為 1-2 %)
金色賴斯寄蠅(寄生率約為 10 %)
啄木鳥

2319. **Synanthedon haitongrora** Yang 海棠透翅蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:66)

寄 主：海棠。

分 佈：華東、華北、西北、東北。

2320. **Synanthedon hector** (Butler) 蘋果透翅蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:65-67)

寄 主：蘋果、沙果、桃、梨、李、杏、梅、櫻桃等果樹。

分 佈：華東、河北、西北、遼寧；日本。

2321. **Synanthedon unocingulata** Bartel 單環透翅蛾 (Zhu, 1980:286-290)
寄 主：西府海棠(*Malus spectabilis* Borkh. var. *riversii* Nash.)。
分 佈：天津。

2322. 茶藨透翅蛾 (Zhang et Bai, 1987(1):16-18; Zhang et al., 1994(2):10-11)
別 名：*茶藨透羽蛾*。
寄 主：黑穗醋栗。
分 佈：黑龍江。

Zygaenidae 斑蛾科

2323. **Campylotes desgodinsi** Oberthür 馬尾松旭錦斑蛾 (ASZI, 1987, 2:102; Zhang, 1987[ed.] 1:139)
寄 主：馬尾松。
分 佈：江西、雲南、西藏、四川；印度。

2324. **Elcysma westwoodi** Vollenhoren 李拖尾錦斑蛾 (ASZI, 1987, 2:102; Hun., 1992:736; Yunn., 1987:894, 896; Zhang, 1987[ed.] 1:139)
寄 主：李、梅、桃、蘋果、櫻桃。
分 佈：江西、雲南、東北；朝鮮、日本、俄羅斯遠東地區。

2325. **Eterusia aedea** Linnaeus 茶柄脈錦斑蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:139)
寄 主：板栗、麻櫟、茶、油茶、刺槐。
分 佈：江西。

2326. **Eterusia leptalina** Koll. 松針斑蛾 (Xiao, 1992:798)
寄 主：華山松、雲南松、高山松。
分 佈：雲南、四川。

2327. **Illiberis nigra** Leech 桃斑蛾 (Cao et Li, 1980:258; Chen et Wang, 1987:157; Zhang, 1987[ed.] 1:140)
別 名：*梅薰蛾、杏星毛蟲、杏葉斑蛾*。
寄 主：杏、李、桃、梅、櫻桃、梨、柿、葡萄等果樹。
分 佈：江西、陝西、山西。

2328. **Illiberis pruni** Dyar 梨葉斑蛾 (ASZI, 1987, 2:103; Chen et Wang, 1987:124-125; Huang, 1990[ed.] 2:123-124; Huang et Gao, 1996:254; Hun., 1992:738; Lin, 1986[ed.]:340; Liu, 1982[ed.]:366-367; Liu, 2000(2):11; Ma, 1998:47; NZWDL, 1981:1729; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sun, 1984:355-356; Sun, 1995:38; Wang, 1987[ed.]:269-271; Wu et al., 1998(4):25; Zhang, 1987[ed.] 1:140; Zhang, 1997(3):41-42; Zhang et Miao, 1996(3):23; Zhao et al., 1998(4):28)
別 名：*梨星毛蟲*。
[Pear leaf worm]
寄 主：梨、蘋果、沙果、海棠、李、杏、桃、櫻桃、山楂、榅桲、枇杷等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：*Coccygomimus desparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2329. **Illiberis psychina** Oberthur 杏星毛蟲 (Huang, 1990[ed.] 2:183-184)
別 名：*桃斑蛾，梅薰蛾*。
寄 主：杏、桃、李、梅、櫻桃、梨、柿(芽、花、嫩葉)。
分 佈：上海、長江流域、河南、陝西、山西、河北、西北。

2330. **Illiberis tenuis** Butler 葡萄葉斑蛾 (ASZI, 1987, 2:103; Zhang, 1987[ed.] 1:140)
寄 主：葡萄、野葡萄。
分 佈：江西、四川；朝鮮、日本、西伯利亞、印度。

2331. **Phauda triadum** (Walker) 黑斑紅毛斑蛾 (Heppner et al., 1992:100; Hun., 1992:738)
Euchromia triadum Walker, 1854;
寄 主：薜荔。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇；印度。

2332. **Theresimima ampelophaga** Boyle 劍角錦斑蛾 (ASZI, 1987, 2:103)
寄 主：葡萄。
分 佈：江蘇；歐洲(南部)。

Cossidae 木蠹蛾科 (Zeuzeridae)

2333. **Cossus chinensis** Rothschild 黃胸木蠹蛾 (Hun., 1992:667)
寄 主：柑橘、柳樹。
分 佈：福建、湖南、雲南、四川、江蘇、山東、陝西、甘肅。

2334. **Cossus cossus** Linnaeus 芳香木蠹蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:346-348)
寄 主：核桃、蘋果、梨、桃、杏、楊、柳、榆、樺、榛等。
分 佈：華北、西北、東北。

2335. **Cossus cossus mongolicus** Erschoff 芳香木蠹蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:346-347)
別 名：*蒙古木蠹蛾*。
寄 主：核桃、稠李、山定子、楊、柳、榆、槐、丁香等多種葉樹。
分 佈：華東、華北、西北、東北。

2336. **Cossus cossus orientalis** (Gaede) 芳香木蠹蛾 (Chen et Wang, 1987:199; Hun., 1992:668; Fang et al., 1984:257-259; Wang, 1995:30; Xiao, 1992:759)
別 名：*東方木蠹蛾、楊木蠹蛾*。
寄 主：蘋果、梨、桃、稠李、核桃、丁香、大官楊、小青楊、北京楊、旱柳、垂柳、龍爪柳、國槐、榆、麻櫟、柳、樺、榛、山荊子、沙蘭楊、漠楊、白蠟等。
分 佈：貴州、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、甘肅、寧夏、陝西、山西、山東、河南、河北、天津、北京、西北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞。
天 敵：*Aspilota* sp. 反顎繭蜂(幼蟲)
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2337. **Cossus monglicus** Ersch 蒙古木蠹蛾 (Wang, 1987[ed.]:193-195; Zeng, 1995(2):14)

寄 主：蘋果。
分 佈：山東。

2338. **Dyspessa monicola** Gr-Grsh. 山地木蠹蛾 (Chen, 1980:263-264)
寄 主：荔枝、龍眼、豆科的牛肋巴(*Dalbergia obtusifolia*)、秧青(*Dalbergia yunnanensis*)、南嶺黃檀(*Dalbergia balansae*)、翅莢木(*Zenia insignis*)、梧桐科的泡火繩(*Eriolaena spectabilis*)、大戟科的長橢圓葉巴豆(*Groton oblongifolius*)、無患子科的久樹(*Schleichera oleosa*)等。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南等。

2339. **Holcocerus insularis** Staudinger 小木蠹蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:146-147; Hun.,1992:668; Xiao, 1992:762; Zhang, 1987[ed.] 1:121)
別 名：*小褐木蠹蛾、山楂木蠹蛾*。
寄 主：蘋果、海棠、山楂、榆葉梅、銀杏、懸鈴木、國槐、枸樹、榆、白蠟樹、丁香、柳樹、麻櫟、白玉蘭、懸鈴木、元寶楓、櫧、冬青、衛矛、檉柳、香椿、麻葉繡球。
分 佈：福建、江西、湖南、安徽、陝西、寧夏、江蘇、上海、山東、山西、河北、天津、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

2340. **Holcocerus japonicus** Gaede 日本木蠹蛾 (Hun., 1992:669; Xiao, 1992:764)
寄 主：桃、核桃、柳樹、榆樹、麻櫟、白蠟樹、國槐、大官楊、沙蘭楊、滇楊、沙蘭楊、青杠、桉樹、馬掛木、鵝掌楸等。
分 佈：四川、貴州、湖南、江西、浙江、安徽、河南、江蘇、上海、山東、天津、北京、遼寧；日本。

2341. **Holcocerus orientalis** Goeole 小木蠹蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:121)
寄 主：桃、梨、板栗、櫟、柳、榆、槐。
分 佈：江西。

2342. **Holcocerus vicarius** (Walker) 柳幹蠹蛾 (ASZI, 1987,2:3; Beijing FC., 1980[ed.]:347-348; Chang & Hung, 1986:72; Heppner et al., 1992:100; Hun., 1992:668; Liu, 1982[ed.]:301-302; Xiao, 1992:765; Yunn., 1987:1096)
Cossus vicarinus Walker, 1865;
別 名：*柳幹木蠹蛾、柳木蠹蛾、柳烏蠹蛾、大褐木蠹蛾*。
寄 主：核桃、板栗、蘋果、銀杏、柳、楊、赤楊、麻櫟、花椒、金銀花、刺槐、楝、榭、櫸、枹、榔榆、白蠟樹、菩提樹等。
分 佈：臺灣、雲南、四川、江蘇、上海、安徽、陝西、甘肅、寧夏、山東、山西、河南、河北、天津、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、越南。

2343. **Zeuzera coffeae** Nietner 咖啡豹蠹 (Beijing FC., 1980[ed.]:183-184; Chang, 1982:288; 1983:295; 1984:145-153; 1984:431; 1987:40, 53-60; 51-64; 157-164, 173; 411; 1988:38-44, 105-111; Chang et Chu, 1986:421; Chang et al., 1960:192; Chang & Hung, 1986:72; Chao, 1982:225; Chen, 1999(4):28; Chen et al., 1993:76; Heppner et al., 1992:100; Huang, 1990(ed.) 2:281; Huang et Gao, 1996:224; Hun., 1992:669; Ji et al., 1995:27-28; Luo et Li, 1998:39, 91; Song, 1998(4):16; Xiao, 1992:768; Yunn., 1987:1095; Zheng, 1985[ed.]:235-236; Zhang, 1987[ed.] (1):121; Zhang, 1999(5):28; Zhou, 1993, 19(6):45-46)
Zeuzera coffeae Nitner, 1861;
別 名：*咖啡黑點蠹蛾，豹蠹蛾，咖啡木蠹蛾，咖啡木蠹，咖蠹，咖啡蠹蛾*，

咖啡豹紋木蠹蛾，小包熱蠹豹。
[White borer, Coffee borer]
寄 主：核桃、薄殼山核桃、蘋果、梨、桃、李、梅、枇杷、牛心梨、檬果、刺番荔枝、柑橘、荔枝、龍眼、蛋黃果、番石榴、蓮霧、石榴、蒲桃、棗、葡萄、柿、栗、咖啡、可可樹、油橄欖、茶、杜仲、水杉、喜樹、烏桕、刺槐、楓楊、懸鈴木、黃檀、桃花心木、鐵刀木、柚木、洋紫荊、無患子、油茶、羊蹄甲、鳳凰木、木麻黃、楓香、臺灣櫸、美洲合歡、銀樺、香椿、貝殼杉、柳杉、奎寧、櫻、相思樹、石斑木類、白千層、茶、玉米、棉花、魚藤、蓖麻等 24 科 34 種以上植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、華北；婆羅洲、印尼、印度、斯里蘭卡等。
天 敵：Virus 病毒 (寄生幼蟲,寄生率低)
串珠鐮刀菌(寄生率 16.6-29.5 %)
Pristomerus erythrothracis Uchida 紅胸齒腿姬蜂(幼蟲)
Bracon sp. 繭蜂(幼蟲,多寄生, 5-10 頭,寄生率 9.1-16.8 %)
蟻(捕食幼蟲)

2344. **Zeuzera leuconotum** Butler 樑幹木蠹蛾 (Cao, et al., 1978:120; Chang & Hung, 1986:72; Huang, 1990[ed.]:2:309310; Liu, 1982[ed.]:302-303; Niu et Chen, 1999:30)
別 名：*白背蠹蛾，六星黑點蠹，豹紋蠹蛾，棗樹鑽幹蟲，棗豹蠹蛾。*
寄 主：棗樹、石榴、梨、蘋果、梨、桃、杏、核桃、茶、洋槐、黑榆、赤楊、山毛櫸類、櫟、榆、茶花、楊類、野茉莉。
分 佈：臺灣、江西、雲南、華東各省、陝西、河南、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

2345. **Zeuzera multistrigata** Moore 木麻黃豹蠹蛾 (Xiao, 1992:770)
別 名：*多紋豹蠹蛾。*
寄 主：龍眼、荔枝、梨、芭蕉、木麻黃、黑荆樹、南嶺黃檀、臺灣相思、銀華、絲棉木、白玉蘭、余甘子、日本柳杉、檀香、冬青。
分 佈：福建、廣西；緬甸、孟加拉、印度。
天 敵：細菌
白僵菌
蜘蛛
廣腹螳螂
黑蟻
棕色小蟻

2346. **Zeuzera pyrina** Staudinger et Rebel 梨豹蠹蛾 (Chao, 1982:225; Han., 1992:670; Luo et Jin, 1995:87; Luo et Li, 1998:82; Yunn., 1987:1095; Zhang, 1987[ed.] 1:121; Zhao et al., 1998(4):28)
別 名：*大豹紋木蠹蛾。*
寄 主：梨、桃、蘋果、杏、櫻桃、柿、酪梨、茶、榆、白楊、柳。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、雲南、四川；亞洲(北部)、印尼、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲、美洲。

Metarbelidae 擬木蠹蛾科

2347. **Squamura discipuncta** (Wileman) 相思擬木蠹蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:350-352; Chao, 1982:225; Chien, 1964:165; Heppner et al., 1992:100; Huang, 1990[ed.] 2:283-284; Huang et Gao, 1996:223; NZWDI, 1981:1973; Xiao, 1992:775)

Arbela discipuncta Wileman, 1915:
=*Arbela baiharana* Matsumura, 1927:
=*Squamura dea* Sonan, 1938: (*nec* Swinhoe, 1890).
=*Squamura discinpuncta* Sonan, 1938: missp.

寄 主：柑橘、荔枝、龍眼、木麻黃、臺灣相思、樟、重陽木、母生、大葉合歡、銀合歡、紫荊、刺槐、懸鈴木、水柳、旱柳、無患子等。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南。

2348. **Squamura dea** (Swinhoe) 荔枝擬木蠹蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:350-352; Chang & Hung, 1986:84; Chao, 1982:225; Chen et al., 1994:57; Chien, 1964:159; Heppner et al., 1992:100; Huang, 1990[ed.] 2:282-283; Huang et Gao, 1996:222; Luo, 1991:87; Luo et Jin, 1997:72; Luo et al., 1996:59NZWDI, 1981:1971; Qian, 1964, 13(2):159-171; Xiao, 1992:776; Xu. 1983, 2:53; Xu et Xie, 1997, 24(2):150-154; Xu et Yang, 1992, 19(3):217-222; Yang et al., 1992, 19(1):37-40; Zhang, 1987[ed.] 1:141)

Lepidarsela dea Swinhoe
Arbela dea Swinhoe, 1890:

寄 主：荔枝、龍眼、紅毛榴連、蘋果、梨、桃、梅、枇杷、柑橘、番石榴、楊桃、楊梅、人心果、檬果、腰果、橄欖、石榴、咖啡、茶、木麻黃、臺灣相思、柳屬、木力楠、蛮寧、側柏、烏桕、九芎、木荷、無患子、楓楊、重陽木、樟、合歡、大葉合歡、洋槐、刺槐、法國梧桐、楠木、懸鈴木、桉、木芙蓉、榕樹、山茶等，已知寄主植物有 24 科 50 多種
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、湖北；緬甸、印度。

Limacodidae 刺蛾科 (Eucleidae, Cochlidiidae)

2349. **Altha adala** (Moore) 四痣麗刺蛾 (Hun., 1992:741; Yunn., 1987:891)

寄 主：釋迦屬、羊蹄甲屬植物。
分 佈：雲南、湖南、江西、山東；越南、印尼、印度、斯里蘭卡。

2350. **Altha lacteola melanopsis** Strand 大白刺蛾 (Chang & Hung, 1986:81; Heppner et Inoue, 1992:101; Tsai, 1965:107)

Altha lacteola melanopsis Strand, 1915:

寄 主：柑橘類、茶樹。
分 佈：臺灣。

2351 **Apoda dentatus** (Oberthür) 鋸紋岐刺蛾 (ASZI, 1987, 2:107)

寄 主：梅、梨、李、櫻桃、栗、茶、櫟、榛、柳。
分 佈：貴州、浙江、河北；日本、西伯利亞東南。

2352. **Birthamoides junctura** (Walker) 肖帛刺蛾 (Yunn., 1987:890)

寄 主：荔枝、檬果。
分 佈：雲南；緬甸、加里曼丹島。

2353. **Cania heppneri** Inoue 灰雙線刺蛾 (ASZI, 1987, 2:106; Chang & Hung, 1986:81; Heppner et Inoue, 1992:101; Hun., 1992:742; Tsai, 1965:107 Yunn., 1987:889; Zhang, 1987[ed.] 1:141)

Cania heppneri Inoue, 1992:

=*Cania bilinea* auct. (*nec* Walker, 1855).
=*Cania bilineata*, B. S. Chang, 1989: missp.
別 名：*雙條刺蛾*。
寄 主：香蕉、柑橘、龍眼、枇杷、茶、油茶、樟、榆、柚木、石梓、油桐、楷木、楓楊、棉。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；越南、馬來西亞、印尼、印度。
天 敵：*Buysmania oxymora robusta* (Uchida) 壯隆緣益蜂

2354. **Cania robusta** Hering 椰刺蛾 (Holloway et al., 1987:23)
Cania bilinea robusta Hering, 1931:
=*Cania bilinea pallida* Hering, 1931:
寄 主：可可椰子、油椰子、香蕉、蓮霧(*Eugenia* sp.) 茶。
分 佈：華西南、馬來西亞、泰國、緬甸。

2355. **Chalcoscelidea albiguttata** (Snellen) 白痣姹刺蛾 (ASZI, 1987, 2:106; Huang et Gao, 1996:189; Hun., 1992:743; Luo et Li, 1998:41; Xiao, 1992:778; Yunn., 1987: 886; Zhang, 1987[ed.] 1:142)
寄 主：柑橘、李、梨、大花枇杷、柿、咖啡、可可、茶、油茶、刺桐屬、石楠、油桐、刺桐、八寶樹、秋楓等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州；新加坡、印尼、緬甸、印度、巴布亞新幾內亞。
天 敵：Mantidae 螳螂(捕食幼蟲)
刺蛾隆緣益蜂(蛹)

2356. **Cnidocampa flavescens** (Walker) 黃刺蛾 (ASZI, 1987, 2:104; Bai, 1998(4):12; Beijing FC., 1980[ed.]:288-289; Chang & Hung, 1986:81; Chao, 1982:229; Chen et Wang, 1987:162; Cheng et Duan, 1991, 9(2):122; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:288-289; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:50-51; Huang et Gao, 1996:190; Hun., 1992:748; Jin, 1999(2):58; Li, 1993:30; Liu, 1982[ed.]:224-225; Luo et al., 1996:59; Niu et Chen, 1999:31; NZWDI, 1981: 1733; Suzhou CS., 1985:208-209; Tsai, 1965:108; Xiao, 1991:779; Xue et Zhang, 1997, 14(2):37; Yunn., 1987: 892; Zhao et al., 1998(4):28; Zhang, 1985[ed.]:212- 213; Zhang, 1987[ed.] (1):142; Zhao et al., 1996(2):49-50; Zhao et al., 1977:190; Zheng, 1982:208-209; Zheng et al., 1993, 9(2):94-95)
別 名：*黃刺毛*、*紅背刺蛾*。
寄 主：雜食性，蘋果、臺灣蘋果、沙果、梨、桃、杏、李、榛、梅、櫻桃、山楂、榅桲、枇杷、柿、棗、板栗、石榴、柑橘、核桃、樣果、番石榴、楊梅、醋栗、板栗、桑、榛等果樹，以及茶、油茶、楊、柳、榆、楓、櫟、樟、楓楊、懸鈴木、楓香、梧桐、油桐、楷木、烏桕、苦楝。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、除甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏和貴州尚未記錄外，幾乎遍布全國；朝鮮、日本、西伯利亞。
天 敵：NPV 核型多角體病毒
Arma chinensis Fallo 蠋蝽
螳螂
Chlorcryptus coreanus Szépligeti 朝鮮紫益蜂(幼蟲,蛹)
Cryptus sp.
Eurytoma monemae Ruschka 刺蛾肩黑小蜂
Eurytoma monemae flavescens Walker 刺蛾肩小蜂
Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂(卵)

Trichogramma ivolae Pang et Chen　毒蛾赤眼蜂(卵)
Trichogramma ostriniae Pang et Chen　亞洲玉米螟赤眼蜂(卵)
Chrysis shanghaiensis Smith　上海青蜂（主要種類，寄生率 20%）
Chaetexorista eutachinoides (Baranov)　健壯刺蛾寄蠅
Chaetexorista javana Brauer et Bergenstamm　爪哇刺蛾寄蠅

2357. **Contheyla taihokuana** Shiraki 黑翅刺蛾 (Chang & Hong, 1986:82; Tsai, 1965:107)
別 名：*黑齒刺蛾*。
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣。

2358. **Darna (Oxyplax) pallivitta** (Moore) 斜紋刺蛾 (ASZI, 1987, 2:107; Heppner et Inoue, 1992:102; Holloway et al., 1987:96; Hun., 1992:750)
Miresa pallivitta Moore, 1877:
=*Darna (Oxyplax) ochracea* auct. (*nec* Moore, 1883).
寄 主：柑橘、可可椰子、檳榔、油椰、茶、榕樹、紅仔珠、玉米、雜草等。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北；印尼、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Buysmania oxymora robusta* (Uchida)　壯隆緣姬蜂(蛹)

2359. **Darna (Orthocraspeda) furva** (Wileman) (Holloway et al., 1987:104)
Natada furva Wileman, 1911:
=*Thoseoides fasciata* Shiraki, 1913:
寄 主：可可椰子、油椰子、沙拉加椰子、五月茶等。
分 佈：臺灣、香港、華南；泰國、喜馬拉雅東北。

2360. **Darna (Orthocraspeda) trima** (Moore) 帶刺蛾 (Chang & Hong, 1986:82; Chao, 1982:229; Heppner et Inoue, 1992:102; Hun., 1992:743; Tsai, 1965:108; Xiao, 1992:780; Yunn., 1987:885; Zhang, 1987[ed.] 1:142)
Parasa trima Moore, 1860:
別 名：*蘇達刺蛾、茶淡黃刺蛾、茶刺蛾*。
寄 主：柑橘、核桃、柿、咖啡、茶、油茶、米老桃、桂花、石梓、火力楠、香梓楠、荷木、山桑、重陽木、面盆架、山蒼子、楠木、小牛奶果、烏桕、白木、山黃麻、葛藤等。
分 佈：臺灣、浙江、江西、廣東、廣西、雲南、貴州；馬來西亞、印尼(爪哇)、緬甸、印度。
天 敵：蜘蛛
螳螂
中黃獵蝽
多變齒脛獵蝽
Ichneumonidae　姬蜂科
Eulophidae　釉小蜂

2361. **Iragoides conjuncta** (Walker) 褐刺蛾 (Chao, 1982:229; Xiao, 1992:781; *Zhang et al.*, 1981: 113-114; Zhang, 1987[ed.] 1:142)
別 名：*棗奕刺蛾、臺灣刺蛾、褐刺蛾*。
寄 主：棗、柿、核桃、蘋果、沙果、梨、杏、桃、梅、枇杷、核桃、茶、鹽膚木、油桐、楓楊、刺槐、染豆。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、越南、泰國、印度、錫金。

2362. **Iragoides fascista** (Moore) 茶刺蛾 (Zhang, 1985[ed.]:209-210)

別 名：*茶角刺蛾*。

寄 主：柑橘、咖啡、茶、油茶。

分 佈：江西、湖南、貴州、浙江、安徽。

2363. **Latoia consocia** (Walker) 褐邊綠刺蛾 (ASZI, 1987, 2:105; Huang, 1990[ed.] 2:51-52; Hun., 1992:744; Jin, 1999(20:58; Qian et al., 1996, 22(3):30; Suzhou CS., 1985:210; Wang et al., 2000(2):22; Xiao, 1992:784; Zhao et al., 1998(4):28)

別 名：*青刺蛾、四點刺蛾、曲紋綠刺蛾*。

寄 主：梨、蘋果、海棠、杏、桃、李、棕、梅、櫻桃、山楂、柑橘、棗、柿、栗和核桃等果樹，以及榆、白楊、柳、楓、槭、桑、茶、油茶、梧桐、泡桐、白蠟、紫荊、刺槐、烏桕、冬青、喜樹、枳椇、懸鈴木、楓楊、麻櫟、沙朴等 54 種林木果樹植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、江蘇、山東、河南、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東南部。

2364. **Latoia hilarata** Staudinger 雙齒綠刺蛾 (Zhao et al., 1998(4):28)

寄 主：梨、桃、李、棕、棗、板栗。

分 佈：福建。

2365. **Latoia lepida** (Cramer) 麗綠刺蛾 (ASZI, 1987, 2:106; Hun., 1992:745; Luo, 1991:87; Luo et al., 1996:59, 1996:87; Suzhou CS., 1985:210-211; Wu et Huang, 1982:36-41; Xiao, 1992:785; Yunn., 1987:887)

別 名：*青刺蛾、綠刺蛾*。

寄 主：蘋果、梨、紅葉李、大花枇杷、蓮霧、檬果、柿、板栗、核桃、楊桃、咖啡、腰果、鳳梨、椰子、茶、油茶、桂花、楊、柳、水翁、油桐、櫟、刺槐、楓楊、楓樹、烏桕、懸鈴木、喜樹、苦楝、八寶樹、人面子、塞楝、相思樹、母生、白千層、大葉紫薇等。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、江西、浙江、江蘇、河北；日本、越南、印尼、印度、斯里蘭卡。

天 敵：*Cantheconidea concinna* Walker 海南蝽(寓蝽)

Buysmania oxymora robusta (Uchida) 壯隆綠盜蜂(蛹)

Eurytoma monemae flavescens Walker 刺蛾肩小蜂

2366. **Latoia ostia** (Swinhoe) 邊綠刺蛾 (Hun., 1992:745; Liu, 1984:255-257; Xiao, 1992:787; Yunn., 1987:888)

寄 主：核桃、柑橘、蘋果、花紅、梨、桃、李、杏、柿、板栗、海棠、棠梨、櫻桃、茶、刺槐、楊、柳、榿木、山定子、核桃等。

分 佈：湖南、雲南、四川；印度。

2367. **Latoia pseudorepanda** (Hering) 背娟綠刺蛾 (Yunn., 1987:887)

寄 主：蘋果、茶。

分 佈：廣東、雲南、四川。

2368. **Latoia repanda** Walker 媚綠刺蛾 (Hun., 1992:746)
寄 主：板栗、茶、懸鈴木、樟、楓楊、油桐。
分 佈：福建、江西、廣東、湖南；越南、印度、錫金。

2369. **Latoia sinica** (Moore) 中國綠刺蛾 (ASZI, 1987, 2:105; Chen et al., 1993:20; Hun., 1992:747)
別 名：*中華綠刺蛾*。
寄 主：蘋果、梨、杏、桃、李、梅、枇杷、柑橘、棗、柿、櫻桃、核桃、栗、烏桕、油桐、梧桐、喜樹、楓、楊、柳、黃檀、刀豆、算盤子、紫藤、梔子、刺槐、榆、茶。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東部。
天 敵：*Buysmania oxymora robusta* (Uchida) 壯隆綠益蜂(蛹)

2370. **Microleon longipalpis** Butler 長鬚刺蛾 (Chang & Hung, 1986:82; Heppner et Inoue, 1992:102, Tsai, 1965:108)
Microleon longipalpis Butler, 1885:
寄 主：柿、臺灣蘋果、梅、櫻。
分 佈：臺灣、華北；朝鮮、日本。

2371. **Miresa bracteata** Butler 葉銀紋刺蛾 (ASZI,1987, 2:108; Yunn., 1987:887)
寄 主：檬果、咖啡、奎寧樹屬。
分 佈：雲南；馬來西亞、印尼、印度、錫金、尼泊爾。

2372. **Miresa fulgida** Wileman 閃銀紋刺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:101; Huang, 1990[ed.] 2:301; Yunn., 1987:887; Zhang, 1987[ed.] 1:144)
Miresa fulgida Wileman, 1910:
=*Miresa fulgida* var. *orientis* Strand, 1915:
=*Miresa fulgida* ab. *kagoshimensis* Strand, 1915:
寄 主：橄欖、茶。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南；日本、越南。

2373. **Miresa inornata** Walker 跡銀紋刺蛾 (ASZI, 1987, 2:108; Chang & Hung, 1986:82; Zhang, 1987[ed.] 1:144)
別 名：*大豆刺蛾*。
寄 主：蘋果、梨、柿、茶、豆類、樟、槭。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、四川、貴州、河北、遼寧；克什米爾地區。

2374. **Nagadopsis shirakiana** Matsumura 柑橘刺蛾 (Chang & Hung, 1986:82; Heppner et Inoue, 1992:102; Tsai, 1965:108)
Nagodopsis shirakiana Matsumura, 1931:
=*Nagodopsis nigricans* Shiraki, 1913: (*nec* Moore, 1887).
寄 主：柑橘類、茶。
分 佈：臺灣。

2375. **Narosa corusca** Wileman 波眉刺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:144)
寄 主：梨、沙果、桃、李、梅、櫻桃、松、茶、油桐、楓楊、榆、楊、烏桕、

刺槐 。
分 佈：江西。

2376. **Narosa edoensis** (Kawada) 白眉刺蛾 (ASZI, 1987, 2:107; Chen et al., 1993:20; Hun., 1992:749)
別 名：*櫻桃白刺蛾*、*小白刺蛾*。
寄 主：核桃、棗、櫻桃、梅、柿、櫟、茶、紫荊、郁李、楊柳、榆。
分 佈：貴州、湖南、江西、浙江、河南、山東、山西、河北、遼寧；日本。

2377. **Narosa nigrisigma** Wileman 龜形小刺蛾 (Liu, 1993(3):17-18; Zhang, 1985[ed.]:210-211)
別 名：*黑紋白刺蛾*，*灰白小刺蛾*，*櫻桃白刺蛾*，*楊梅刺蛾*，*白眉刺蛾*，*長須刺蛾*，*小刺蛾*，*小白刺蛾*，*紅點龜形小刺蛾*。
寄 主：石榴、蘋果、櫻桃、梨、梅、李、柿、棗、楊梅、板栗、茶、油茶、櫟類、紫荊。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河北、北京。

2378. **Narosa nitobei** Shiraki 無毛白刺蛾 (Chang & Hung, 1986:82; Heppner et Inoue, 1992:101; Tsai, 1965:108)
Narosa nitobei Shiraki, 1913:
寄 主：柑橘類、茶。
分 佈：臺灣。

2379. **Narosoideus flavidorsalis** (Staudinger) 梨娜刺蛾 (ASZI,1987, 2:108; Chang & Hung, 1986:82; Chen et Wang, 1987:162; Hun., 1992:749; Zhang, 1987[ed.] 1:144)
=*Thoseoides fasciata* Shiraki,
別 名：*梨刺蛾*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、梅、柿等核果類及楓香、楓、櫟。
分 佈：臺灣、江西、廣東、湖南、浙江、江蘇、陝西、山西、河北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞東南部。

2380. **Parasa bicolor** (Walker) 綠刺蛾 (Chang & Hung, 1986:82; Chao, 1982:229; Heppner et Inoue, 1992:102; Xiao, 1992:782)
別 名：*兩色綠刺蛾*。
Neaera bicolor Walker, 1855:
寄 主：柑橘類、柿、竹類、通草、相思樹、茶。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、安徽、江蘇；印尼、印度。
天 敵：*Chrysopa carnea carnea* (Stephens) 中華草蛉(捕食率 25 %)
黃獵蝽
小室盆蜂(寄生率 50 % 左右)

2381. **Parasa bicolor virescens** Matsumura (Heppner et Inoue, 1992:102)
Monema bicolor virescens Matsumura, 1911:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2382. **Parasa consocia** Walker 青刺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:290; Chang & Hung, 1986:82; Chao, 1982:229;

Chen et Wang, 1987:162; Chen 1993:16, Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:288-289, Liu, 1982[ed.]:225-226, NZWDI, 1981:1734; Tsai, 1965:108; Zhang, 1985[ed.]:211-212; Zhang, 1987[ed.] 1:143; Zhao et al., 1997:190; Zheng, 1982:210)
=*Parasa tessellata* Moore,
=*Heterogenea princeps* Staudinger,
別 名：*褐邊綠刺蛾*、*四點刺蛾*、*綠刺蛾*。
寄 主：柑橘類、梨、沙果、桃、李、榛、杏、梅、蘋果、臺灣蘋果、山楂、棗、柿、板栗、核桃、桑、茶、柏、油茶、油桐、烏桕、相思樹、蓖麻、懸鈴木、柳、楓、楓楊、白楊、重陽木、厚朴、梧桐、法國梧桐、喜樹、麻櫟、紫荊、枳椇、沙朴、棉等 54 種林果植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、阿穆爾。
天 敵：*Chlorocryptus purpuratus* Smith 刺蛾紫益蜂(幼蟲)
Apanteles parasae Rohwer 綠刺蛾絨繭蜂(幼蟲)
Spinaria armator Fabricius (幼蟲)
Pales pavida (Meigen) 藍黑節寄蠅

2383. **Parasa hilarata** (Staudinger) 雙齒綠刺蛾 (ASZI, 1987, 2:105; Beijing FC., 1980[ed.]:291-292; Chang & Hung, 1986:82; Chao, 1982:229; Heppner et Inoue, 1992:101; Hun., 1992:745; Tsai, 1965:108; Xiao, 1992:785; Yunn.,1987:888; Zhang, 1987[ed.] 1:143)
Heterogenea hilarata Staudinger, 1887:
別 名：*上黃青刺蛾*、*棕邊青刺蛾*、*四點刺蛾*。
寄 主：蘋果、梨、李、杏、桃、櫻桃、枇杷、黑刺李、柿、核桃、棗、茶、烏桕、油桐、梧桐、楓楊、白楊、柳、櫟、槭和樺屬等。
分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、陝西、河南、山西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；阿穆爾、烏蘇里、日本。

2384. **Parasa lepida** (Cramer) 麗綠刺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:291-292; Chao, 1982:230; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:288-289; Holloway et al., 1987:28; Xiao, 1992:785; Zhang, 1987[ed.] 1:143; Zheng, 1982:210-211)
Noctua lepida Cramer, 1779:
=*Limacodes graciosa* Westwood, 1848:
=*Nyssia latifascia* Walker, 1855:
=*Neaera media* Walker, 1855:
Parasa lepida lepida, Seitz, 1933:
別 名：*青刺蛾*、*綠刺蛾*。
寄 主：柑橘、梨、沙果、桃、李、杏、梅、枇杷、檬果、板栗、可可、咖啡、香蕉、紅葉李、茶、油茶、香樟、竹、懸鈴木、楓楊、楊、柳、烏桕、櫟、油桐、刺槐、泡桐、蓖麻等闊葉樹木及大豆。
分 佈：江西、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、河北；日本、東南亞、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Buysmania oxymora robusta* (Uchida) 壯隆綠益蜂(蛹)
Chlorocryptus purpuratus Smith 刺蛾紫益蜂(蛹)

2385. **Parasa pastoralis** Butler 跡斑綠刺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:101; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hun., 1992:746; Xiao, 1992:788; Yunn., 1987:887)
Parasa pastoralis Butler, 1880:
別 名：*樟刺蛾*。

寄 主：板栗、梨、櫻花、樟、重陽木、楓楊、雞爪槭、七葉樹、沙朴。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖南、江西、浙江、吉林；越南、馬來西亞、印尼、印度、錫金、不丹、尼泊爾、巴基斯坦、克什米爾。

2386. **Parasa shirakii** Kawada 素木刺蛾 (Holloway et al., 1987:32)
Parasa shirakii Kawada, 1930:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2387. **Parasa sinica** Moore 中國刺蛾 (Chang & Hung, 1986:83; Chang & Wong, 1953:61-76; Chao, 1982:230; Chen et Wang, 1987:162; Liu, 1982[ed.]:227)
=*Parasa sinensis* Pryer,
別 名：*綠刺蛾、四點刺蛾、褐邊青刺蛾、中國綠刺蛾。*
寄 主：李、杏、梅、梨、枇杷、櫻桃、桃、棗、柿、栗、桑、茶、梧桐、油桐、烏桕、楓楊、黃檀、喜樹、刺槐、榆、櫟、榛、楊類、柳、梔子花、紫藤。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江。
天 敵：*Eurytoma monemae* Rusch 刺蛾廣小蜂
Cryptus sp. 紫光盆蜂
Chrysis shanghaiensis (Smith) 上海青蜂
Chaetexorista javana Brauer et Bergenstamm 爪哇刺蛾寄蠅

2388. **Parasa tessellata** Moore (Heppner et Inoue, 1992:101)
Parasa tessellata Moore, 1877:
=*Parasa consocia* Kawada, 1930: (*nec* Walker, 1865).
=*Latoia consocia* B. S. Chang, 1989: missp.
寄 主：
分 佈：臺灣、江蘇、上海。

2389. **Phlossa conjuncta** (Walker) 棗奕刺蛾 (ASZI, 1987, 2:107; Chen et al., 1993:19; Heppner et Inoue, 1992:102; Hun., 1992:744; Xiao, 1992:781; Yunn., 1987:891)
Limacodes conjuncta Walker, 1855:
=*Phlossa fimbriares* Walker, 1858:
別 名：*棗刺蛾。*
寄 主：榛果、蘋果、梨、杏、桃、櫻桃、棗、核桃、柿、茶、油茶、油桐、楊柳。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、越南、馬來西亞、泰國、印度、錫金。

2390. **Phlossa thaumasta** Hering 奇奕刺蛾 (Yunn., 1987:892)
寄 主：核桃、刺梨、茶、油茶、刺槐、桐子等。
分 佈：雲南、貴州、江西、江蘇。

2391. **Phocoderma velutina** Kollar 絨刺蛾(ASZI, 1987, 2:108; Huang, 1995, 18(3):6-8, 35; Yunn., 1987:883)
寄 主：橡果、茶、麻櫟、雞尖欖仁樹。

分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、吉林；馬來西亞、印尼、緬甸、印度、尼泊爾、克什米爾地區。

2392. **Quasithosea obliquistriga** (Hering) 斜斑刺蛾 (Holloway et al., 1987:68)
Thosea obliquistriga Hering, 1931:
=*Thosea curvistriga* Hering, 1931:
Quasithosea obliquistriga, Holloway, 1987:68.
寄 主：黃椰子、黃梔花、棕竹。
分 佈：華南；越南北部。

2393. **Scopelodes contracta** Walker 縱帶球鬚刺蛾 (ASZI, 1987, 2:108; Heppner et Inoue, 1992:101; Hun., 1992:751; Xiao, 1992:790)
Scopelodes contracta Walker, 1855:
=*Scopelodes venosa* auct. (*nec* Walker, 1855).
寄 主：柿、櫻、板栗、八寶樹、烏桕、油桐、人面果、大葉紫薇、三球懸鈴木、楓香等。
分 佈：廣東、浙江、江蘇、河北、北京；日本、錫金。
天 敵：核多角體病毒
螳螂
草蛉
蠼螋
繭蜂(寄生率常達 20-30 %, 甚至達 90 % 以上)

2394. **Scopelodes contractus kwngtungensis** Hering 顯脈球鬚刺蛾 (ASZI, 1987, 2:108; Hun., 1992:751; Yunn., 1987:882)
別 名：*廣東油桐刺蛾*。
寄 主：棗、柿、咖啡、油桐、玫瑰。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、雲南。種的分布包括臺灣、福建、浙江；印尼、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、斯里蘭卡。

2395. **Scopelodes ursina** Butler 小黑刺蛾 (Hun., 1992:751)
寄 主：核桃、柿、楓香、楓楊、紫荊、櫻花、懸鈴木、枳椇等。
分 佈：廣東、湖南、浙江、江蘇、河北；印度、錫金、克什米爾。

2396. **Scopelodes venosa kwangtungensis** Hering 廣東油桐黑刺蛾 (Chao, 1982:230; Luo et al., 1996:87; Zhang, 1987[ed.]:1:145)
寄 主：棗、柿、蓮霧、咖啡、玫瑰、三年桐。
分 佈：福建、江西、廣東、海南。

2397. **Setora baibarana** (Matsumura) 褐刺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:291-292; Holloway et al., 1987:82)
Thosea baibarana Matsumura, 1931:
=*Setora suberecta* Hering, 1931:
=*Setora suberecta kwangtungensis* Hering, 1931:
=*Setora mongolica* Hering, 1933:
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、華南；緬甸、印度。

2398. **Setora flatcheri** Holloway 弗萊奇刺蛾 (Holloway et al., 1987:82)

Setora flatcheri Holloway, 1987:
寄 主：
分 佈：四川(瀘縣)；泰國、緬甸、印度。

2399. **Setora nitiens** (Walker) 銅斑褐刺蛾 (ASZI, 1987, 2:109)
寄 主：香蕉、咖啡、茶等經濟作物。
分 佈：廣西、雲南；印尼。

2400. **Setora sinensis** Moore 桑褐刺蛾 (ASZI, 1987, 2:109; Baijing FC., 1980[ed.]:290-291; Chao, 1982:230; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:288-289; Heppner et Inoue, 1992:102; Hollowya et al., 1987:87; Hun., 1992:752; Liu, 1982[ed.]:226; Xiao, 1992:792)
Setora sinensis Moore, 1877:
=*Thosea postornata* Hampson, 1900: repl. name.
=*Thosea postornata* f. *hampsoni* Strand, 1922:
別 名：*褐刺蛾*。
寄 主：銀杏、蘋果、海棠、梨、桃、梅、李、櫻桃、柿、棗、柑橘、石榴、板栗、核桃、葡萄、桑、可可、茶、油茶、油桐、樟、苦楝、木荷、麻櫟、懸鈴木、油茶、杜仲、七葉樹、烏桕、喜樹、楊、垂柳、重陽木、無患子、白楊、楓楊、法國梧桐、厚朴、冬青、臘梅、紫薇、玉蘭、紅葉李、月季等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北；馬來西亞、印度、錫金。
天 敵：*Chlorocryptus purpuratus* Smith 刺蛾紫益蜂(幼蟲)

2401. **Susica pallida** Walker 素刺蛾 (ASZI, 1987, 2:106; Hun., 1992:752; Yunn., 1987:886; Zhang, 1987[ed.] 1:145)
寄 主：梨、榛果、茶、油茶、刺槐。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江；日本、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

2402. **Thosea bicolor** Shiraki 雙色刺蛾 (Chang & Hung, 1986:83; Heppner et Inoue, 1992:102; Tsai, 1965:108)
Thosea bicolor Shiraki, 1913:
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣。

2403. **Thosea postornata** Hampson 褐刺蛾 (Chang & Hung, 1986:83; Heppner et Inoue, 1992:102; Suzhou CS., 1985:209-210; Tao, 1980: 249; Zhao et al., 1998(4):28; Zheng, 1982:209-210)
Thosea posternata Hampson, 1900:
=*Thosea sinensis* Moore, 1877: (*nec* Walker, 1855).
=*Contheyla brunnea* Shiraki, 1913:
別 名：*桑刺蛾*、*桑褐刺蛾*。
寄 主：梨、桃、李、榛、棗、板栗、桑、茶、油茶、香樟、苦楝、楓楊、油桐、麻櫟、杜仲、烏桕、喜樹、重陽木、楊類、柳。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河北；印度。
天 敵：*Chlorocryptus purpuratus* Smith 刺蛾紫益蜂

2404. **Thosea sinensis** (Walker) 扁刺蛾 (ASZI, 1987, 2:104; Beijing FC., 1980[ed.]:291-292; Chao, 1982:230;

Chen et Wang, 1987:162; Chen et al., 1993:17; Heppner et Inoue, 1992:102; Holloway et al., 1987:49; Huang, 1990[ed.] 2:52-54; Huang et Gao, 1996:188; Hun., 1992:752; Liu, 1982[ed.]:226-227; NZWDI, 1981:1735; Suzhou CS., 1985:209; Wong & Chang, 1955:309-318; Xiao, 1992:793; Yunn., 1987: 884; Zhang, 1985[ed.]:207-209; Zhang, 1987[ed.] 1:146; Zheng, 1982:209)

Anzabe sinensis Walker, 1855:
=*Susica taiwana* Shiraki, 1913:
別 名：*黑點刺蛾，圓刺毛*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、梅、櫻桃、枇杷、柑橘、棗、柿、葡萄、核桃、銀杏、板栗、咖啡、桑等果樹，茶、油茶、梧桐、油桐、泡桐、喜樹、烏桕、楓香、苦楝、相思樹、大豆、刀豆、楓楊、白楊、大葉黃楊、柳、喜樹、香樟、樟、茶、油茶、榆、刺槐、蓖麻、桂花等 種林木和果樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、遼寧、吉林；朝鮮、越南、印尼、印度。
天 敵：NPV 核型多角體病毒(病亡率達 40 %左右)
GV 顆粒體病毒
真菌寄生(僵死率高達 70-90%)
Chlorocryptus purpuratus Smith 刺蛾紫益蜂

Cochylidae 細捲蛾科

2405. **Eupoecilia ambiguella** (Hübner) 葡萄細捲蛾 (Chang, 1987:40; Heppner et Inoue, 1992:103; Tsai, 1965:102)
Tinea ambiguella Hübner, 1796:
=*Clysia turbinaris* Meyrick, 1935:
[Vine moth]
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、歐洲。

2406. **Stenodes jacucana** Snellen 沙果細捲蛾 (ASZI,1987, 2:28)
寄 主：沙果。
分 佈：西南、東北；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

Tortricidae 捲蛾科

(Liu, 1996(2):48-49; Zhang et al., 1996(2):22)

2407. **Ackerus comariana** Zeller 草莓長翅捲蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:129)
寄 主：草莓。
分 佈：江西。

2408. **Acleris crocopepla** (Meyrick) 黃斑捲蛾 (Hwang, 1974:36)
Peronea crocopepla Meyrick,
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、歐李。
分 佈：

2409. **Acleris enitescens** (Meyrick) 懸鉤子長翅捲蛾 (Heppner et Inoue, 1992:104; Hun., 1992:690; Zhang, 1987[ed.] 1:129)

Peronea enitescens Meyrick, 1912:
寄 主：懸鉤子。
分 佈：臺灣、江西、湖南；朝鮮、日本、印度。

2410. **Acleris fimbriana** Thunberg 黃斑長翅捲蛾 (ASZI, 1987, 2:30; Chen et Wang, 1987:29-30; Huang, 1990[ed.] 2:39-40; Liu et al., 1996(2):44-45; NZWDI, 1981:1684; Sun, 1984:351; Tang, 1994(2):30; Wang, 1987[ed.] 262-266; Xiao, 1992:804; Zhao et al., 1997:191)
别 名：*黃斑卷葉蛾、桃卷葉蛾、梨黃卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、梨、桃、杏、李、榛、山荊子、海棠、杜梨、檳子、沙果。
分 佈：福建、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧；日本、西伯利亞、歐洲。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2411. **Acleris kodomai** Yasuda 紅松長翅捲蛾 (Jiang & Bai, 1990:156)
Acleris kodamai Yasuda, 1965:16.
寄 主：紅松。
分 佈：遼寧；日本。

2412. **Acleris latifasciana** Haworth 杜鵑長翅捲蛾 (ASZI, 1987, 2:30)
寄 主：越橘、杜鵑、柳、繡線菊。
分 佈：山東、黑龍江、西伯利亞、歐洲。

2413. **Acleris submaccana** (Filipjev) 毛赤楊長翅捲蛾 (ASZI, 1987, 2:30; Heppner et Inoue, 1992:103)
Peronea submaccana Filipjev, 1962:
=*Acleris simplex* Razowski & Yasuda, 1964:
寄 主：醋栗、蛇莓、毛赤楊、柳、楊、樺、杜鵑、莢蒾。
分 佈：黑龍江；日本、西伯利亞、亞洲中部、歐洲。

2414. **Acroclita corinthia** Meyrik 荔枝捲蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Heppner et Inoue, 1992:108; Tsai, 1965:99)
Acroclita corinthia Meyrick, 1912:
别 名：*荔枝捲葉蛾*。
寄 主：荔枝(葉)。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

2415. **Adoxophyes fasciculana** (Walker) 柑橘褐帶捲蛾 (ASZI, 1987, 2:31; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Fu, 1995(3):43; Heppner et Inoue, 1992:105; Huang, 1990[ed.] 2:246-248, 275-276; ; Hun., 1992:690; Liu, 1958:293-316; 1960:223; 1964:145-158, NZWDI, 1981:1909, 1977; Wen, 1994(3):43; Zhong et al., 1999(6):21)
Tortrix fasciculana Walker, 1866:
=*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick, 1886:
=*Tortrix luzonica* Sauber, 1902:
=*Adoxophyes epipepla* Lower, 1908:
别 名：*擬小黃卷葉蛾、柑橘卷蛾*。
寄 主：柑橘、檸檬、荔枝、龍眼、楊桃、楊梅(頂梢爲主)、桑、花生、茶、向日葵、蓖麻、玫瑰等 16 科 27 種植物。
分 佈：江西、湖南、廣東、浙江；菲律賓、印尼、東加、澳洲、南太平洋等地區。
天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama 晉草蛉(幼蟲)

Calleida spplendisula Fabricius 燦麗步甲(綠邊步甲)
Xanthandrus comtus Harris 食蚜蠅
Itoplectis alternans spectobilis (Matsumura) 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Rhaeogenes sp. 姬蜂(蛹)
Bracon sp. 繭蜂(幼蟲)
Apanteles sp. 絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus Walker 廣闊小蜂(蛹)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Trichogramma ostriniae Pang et Chen 亞洲玉米螟赤眼蜂(卵)
Xanthandvus comius Harris 食蚜蠅
Nemorilla floralis maculosa Meigen 寄蠅

2416. **Adoxophyes fasciata** Wals. 小黃捲蛾 (Chien, 1955:138; Huang, 1990[ed.] 2:246; Tsai, 1965:101)
別 名：*小黃捲葉蛾*。
寄 主：荔枝、柑橘。
分 佈：臺灣、福建、浙江。
天 敵：*Brachymeria lasus* Walker 廣闊小蜂(蛹)
Trichogramma ostriniae Pang et Chen 亞洲玉米螟赤眼蜂(卵)

2417. **Adoxophyes orana** Fischer von Rösterstamm 棉褐帶捲蛾 (ASZI, 1987, 2:32; Chang & Hung, 1986:76; Chen, 1981:46; Chen et Wang, 1987:2528; Cheng et al., 1998(4)21; Chu et Lo, 1995:179-188; 255-263; Chu et al., 1993:27-32; Di, 1993(1):34-35; Feng, 1997(1):47-49; Fu, 1995(3):43; Han et al., 2000(2):57-58; Heppner et Inoue, 1992:105; Hsiao, 1989:27-35; 1990:443-450; Huang, 1990[ed.] 2:33-36; Huang et al., 1997:125; Huang et al., 1998(4):38; Hun., 1992:690; Hwang, 1974:35; Jiao, 1997:26-27; Li et al., 1995:24-25; Liu et Bai, 1980:32-35; NZWDI, 1981:1679; Qiu, 1994, 11(1):59; Qu et al., 1996, 23(3):263-268; Sun, 1984:350-352; Tang, 1994(2):30; Tsai, 1965:101; Wang, 1987[ed.]:262-266; Wang et al., 1990, (2):38-45; Wen, 1994(3):43; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Xiao, 1992:806; Yunn., 1987:870; Zhang, 1985[ed.]:213-216; Zhang, 1987[ed.] (1):129; Zhang et Zhang, 1999:26; Zhang et al., 1982:13-15; Zhao et al., 1997:191; Zhao et al., 1998(4):28)
Adoxophyes orna Fischer von Röslerstamm, 1834:
=*Tortrix reticulana* Hübner, 1819: preocc. (*nec* Haworth, 1811).
=*Tortrix tripsiana* Eversmann, 1844:
別 名：*蘋葉蛾、蘋果小卷蛾、蘋小卷葉蛾、橘(小黃)卷葉蛾、茶小卷葉蛾、棉小卷葉蛾、小角紋捲葉蛾*。
[Citrus leaf-roller]
寄 主：雜食，柑橘、蘋果、梨、山楂、梨、桃、李、榛、杏、梅、櫻桃、枇杷、石榴、銀杏、柿、荔枝(果、嫩葉、梢)、龍眼、橄欖、棗、葡萄、懸鉤子、咖啡、越橘、桑、茶、油茶、榆、楊、柳、醋栗、草莓、棉、甘薯、小麥、豌豆、苜蓿、大豆、赤豆、綠豆、菜豆、花生、馬鈴薯、茄子、甜椒、芝麻、亞麻、蓖麻、向日葵、蘿蔔、結球白菜、花椰菜、甘藍、芥菜、蘿蔔、瓜類、薔薇、牡荊、奎寧、苦楝、油茶、烏桕、樺、忍冬、葎草、楓楊、赤楊、楊、柳、水杉、杉、羅漢松等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、以及全國各省區(除西藏、甘肅、新疆外)；日本、印度、歐洲。
天 敵：蜘蛛
Chrysopa shansiensis Kuwayama 晉草蛉
Orius minutus Linnaeus 小黑花蝽(卵)

Exochus scutellaris Chiu 黃盾凸臉姬蜂(幼蟲)
Itoplectis naranyae (Ashmead) 螟蛉埃姬蜂(幼蟲)
Pristomerus chinensis Ashmead) 中華齒腿姬蜂(幼蟲)
Pristomerus erythrothracis Uchida 紅胸齒腿姬蜂(幼蟲)
Apanteles conspersae Fish 茶毛蟲絨繭蜂(皖南在第三代寄生率可達 50-60%)
Apanteles sp. 卷蛾絨繭蜂
Microbracon hebator Say 捲蛾繭蜂
Brachymeria lasus Walker 廣闊小蜂(蛹)
Trichogramma evanescesn Westwood. 廣赤眼蜂(卵塊寄生率為 27 %)
寄蠅(幼蟲)
鳥類

2418. **Adoxophyes privatana** Walker 荔枝花捲葉蛾 (Shih et Chow, 1984:128; Tang, 1961:207-208)
寄 主：荔枝(花序)。
分 佈：臺灣。

2419. **Ancylis comptana** (Frolich) 草莓鐮翅小捲蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:132)
寄 主：草莓、懸鉤子、薔薇、百里香。
分 佈：江西。

2420. **Ancylis sativa** Liu 棗鐮翅小捲蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:379-380; Chen et al., 1993:11; Huang, 1990[ed.] 2:306-309; Wang, 1987[ed.]:237-238; Xue et al., 1997, 14(1):35-36; Xue et Zhang, 1997(2):37; Yue, 1995(4):20; Zhang, 1987[ed.] 1:132)
別 名：*棗粘蟲*。
寄 主：棗、酸棗(幼蟲為害芽、花、葉、果實)。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北。

2421. **Ancylis** (s.str.) **selenana** Guenée 蘋鐮翅小捲蛾 (ASZI, , 2:42)
寄 主：蘋果、山楂、梨樹和核果類果樹。
分 佈：東北；日本、歐洲。

2422. **Ancylis (Anchylopera) sativa** Liu 棗鐮翅小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:43; Chen et Wang, 1987:212; Liu, 1979:90; NZWDI, 1981: 1777; Xiao, 1992:809)
=*Cerostoma sasakii* Mutsumura,
Ancylis (Abcgtkioera) sativa Liu, 1979:90.
別 名：*棗粘蟲、棗小蛾、棗實菜蛾*。
寄 主：棗(花蕾、花、葉及棗果)、酸棗。
分 佈：湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、華北、西北地區棗樹上一大害蟲。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2423. **Ancylis (Anchylopera) unculana** Howarth 鼠李鐮翅小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:43)
寄 主：李、越橘、鼠李、懸鉤子、楊、柳、燈台樹。
分 佈：東北；朝鮮、小亞細亞、歐洲。

2424. **Archips asiaticus** (Walsingham) 後黃捲蛾 (Chao, 1982:232; Huang, 1997:125; Hun., 1992:691; Wen, 1994(3):43)

寄 主：蘋果、梨、李、花楸、川鄂櫻花、柑橘、荔枝、龍眼(果、葉、芽、幼莖)、板栗、銀杏、柿、茶、柳、防己(金粟蘭科)、蕺菜(三白草科)、木通(木通科)。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、安徽、江蘇、山東、甘肅、北京、吉林；朝鮮、日本、蘇聯。

2425. **Archips breviplicana** Walsingham 梨黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:32)

寄 主：梨、蘋果。

分 佈：東北；朝鮮、日本、西伯利亞。

2426. **Archips crataegana** (Hübner) 山楂黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:33; Liu et Bai, 1980:32-35)

寄 主：梨、山楂、蘋果、李、雲杉、魚鱗松、櫟、椴、楊、櫻、花楸、樺、榆、柳。

分 佈：東北；日本、西伯利亞、小亞細亞、非洲、歐洲。

2427. **Archips decretana** Treitschke 樺黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:33)

寄 主：蘋果、楊梅、懸鉤子、珍珠梅、越橘、樓骨木、毛榛子、柳葉繡線菊、紫花忍冬、黃花忍冬、樺、櫟、山花楸等。

分 佈：東北；西伯利亞、歐洲。

2428. **Archips eucroca** Diakonoff 柑橘黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:33; Huang, 1990[ed.] 2:246; Hun., 1992:692)

別 名：*褐卷葉蛾*。

寄 主：柑橘、蓖麻、霍香薊、一點紅、飛揚草。

分 佈：廣東、湖南。

2429. **Archips ingentana** Christoph 蘋黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:33; Chang & Hung, 1986:77; Chao, 1982:232; Tsai, 1965:101)

別 名：*蘋果卷蛾*、*大后黃卷蛾*

寄 主：蘋果、臺灣蘋果、梨、柿、柑橘、楊類、山櫻花、茶、日本冷杉、兒百合、款冬、蕺菜。

分 佈：臺灣、華南、華中、華北；朝鮮、日本、西伯利亞、印度、阿富汗、巴基斯坦。

2430. **Archips micaceanus** (Walker) 擬後黃捲蛾 (Yunn., 1987:882)

寄 主：柑橘。

分 佈：廣東、雲南、四川、上海；越南、緬甸、印度。

2431. **Archips micaceana** var. **compacta** Meyrick 擬後黃捲葉蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:246)

寄 主：柑橘。

分 佈：中國。

2432. **Archips oporanus** (Linnaeus) 雲杉黃捲蛾 (Xiao, 1992:811; Yunn., 1987:872)

別 名：*松梢卷葉蛾*、*松芽卷葉蛾*。

寄 主：紅松、粗榧、落葉松、雲杉、冷杉、鐵杉、檜柏等。
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(歐洲部分和中部地帶、西伯利亞)、西歐(向北山脈中)。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2433. **Archips piceana** (Linnaeus) 雲杉黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:34; Chao, 1982:232; Liu et al., 1974:166; 1980:32-35)
Tortrix piceana Linnaeus,
Archipus piceanus
別 名：*松粗卷葉蛾、松芽卷葉蛾、松後黃卷蛾*。
寄 主：粗榧、紅松、落葉松、雪松、松、茶、雲杉、冷杉、鐵杉、檜、柏。
分 佈：西南、華南、華中、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲等地。
天 敵：*Apophua* sp. 卷蛾曲脊姬蜂(幼蟲)
Theronia atalantae gestator (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)

2434. **Archips seminubilus** (Meyrick) 柑橘黃捲蛾 (Fu, 1995(3):43; Heppner et Inoue, 1992:104; Yunn., 1987:871; Wen, 1994(3):43;)
寄 主：柑橘、紅棟子。
分 佈：浙江、江西、廣東、雲南、四川；越南、爪哇、印度。
天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama 晉草蛉(幼蟲)。

2435. **Archips similis** Butler 松黃捲蛾 (Hun., 1992:692; Zhang, 1987[ed.] 1:130)
寄 主：松樹、雪松、雲杉、冷杉、鐵杉、柳杉、紫杉。
分 佈：福建、江西、廣東、湖南、江西、安徽、江蘇、山東。

2436. **Archips tabescens** Meyrick 白點褐黃捲蛾 (ASZI, 1987, 2:34; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Huang, 1990[ed.] 2:246)
別 名：*白點褐黃卷葉蛾*。
寄 主：柑橘、龍眼。
分 佈：華南地區。

2437. **Archips xylosteana** (Linnaeus) 角紋捲蛾 (ASZI, 1987, 2:35; Hwang, 1974:33; Liu et al., 1974:167; Xiao,1992:812)
Cacpecoa xylosteana Linnaeus,
別 名：*雜色金卷葉蛾、梣黃卷蛾、梣粗卷葉蛾、梨葉卷葉蛾、角紋卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、梨、杏、李、山楂、櫻桃、柑、柿、懸鈎子、核桃、楊梅、松、茶、長梗柞、毛赤楊、水曲柳、櫟、花楸樹、金銀花、椴、柳、梣、金絲桃、楊、榆、樺等。
分 佈：華中、華北、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、小亞細亞、歐洲中、南部、斯堪的納維亞。

2438. **Archippus asiaticus** (Walsingham) 後黃捲蛾 (Hwang, 1974:35; Huang, 1990[ed.] 2:246; Wen, 1994(3):43; Zhang, 1987[ed.] 1:129)
Archips asiaticus Walsingham,
別 名：*后黃卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、桃、梨、李、梅、枇杷、銀杏、柿、柑橘、荔枝、龍眼、板栗、

荼、柳、花楸、木通。
分 佈：福建、江西、浙江。

2439. **Archippus breviplicanus** (Walsingham) 短褶捲蛾 (Hwang, 1974:34)
Archips breviplicanus Walsingham,
=*Cacoecia crsiticana* Kennel,
別 名：*短褶卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、梨、櫻桃、桑、赤楊、大豆等。
分 佈：

2440. **Argyroploce aprobola** Meyruck 灰白捲蛾 (Liu, 1964:157)
Argyroploce aprobola Meyrick,
別 名：*灰白條小卷蛾*。
寄 主：荔枝，龍眼(幼蟲卷嫩葉及蛀果)。
分 佈：福建、廣東；印尼、伊里安島、澳洲、印度、斯里蘭卡。

2441. **Argyroploce hemiplaca** Meyrick 花捲葉蛾 (Suzhou CS., 1985:212-213; Zheng, 1982:212-213)
Argyroploce hemiplaca Meyrick,
別 名：*桑芽卷葉蟲*、*黑頭卷葉蟲*、*黑頭青蟲*。
寄 主：桑(頂芽及嫩芽)。
分 佈：貴州、四川、浙江、江蘇、遼寧。

2442. **Argyroploce illepida** Bustler 黑點捲蛾 (Chan, 1982:231; Chien, 1955:139)
寄 主：荔枝。
分 佈：福建、廣東；爪哇、印度、斯里蘭卡、夏威夷。

2443. **Argyroploce lacunana** Denis et Schiffermüller 白樺條小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:44; Chang & Hung, 1986:75)
寄 主：懸鈎子、樺、柳、薄荷、驢蹄草、蕁麻、藜、野芝麻、薊、母菊、峨參、沼委陵菜、排草。
分 佈：東北、西伯利亞、小亞細亞、歐洲。

2444. **Cacoecia tabescens** Meyrick 白點褐捲蛾 (Liu, 1964:145-158)
Cacoecia tabescens Meyrick,
寄 主：荔枝(嫩葉及幼果)、柑橘。
分 佈：廣東、福建。

2445. **Capriconrnia boisduvaliana** Duponchel 羊角小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:46)
寄 主：松、雲杉。
分 佈：東北；歐洲。

2446. **Carpocapsa pomonella** (Linnaeus) 蘋果蠹蛾 (ASZI, 1987, 2:54; Chang, 1957:467-472; Chang et al., 1958: 136-151; 1960:40-53; China AFM Res. Group, 1994, 21(2):169-175; Huang, 1990[ed.] 2:10-15; Jin et al., 1995, 21(6):23, 封底; Jin et al., 1996, 23(2):191-192; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Liu et al., 2000(2):20; Long et Zhang, 1996(4):48-49; NZWDI, 1981:1669; Sandong et al. CM. DSG, 1992, 19(4):345-349; Shen et al., 1993:25-26; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Xiong, 1997(4):37-38; Xu et al., 1989, 16(1):61-66; Yin et al., 1998(3):9-11; Zhang, 1957, 7(4):467-472; Zhang et He, 1986, 12(6):33-34; Zhang et Miao, 1996(3):23; Zhang et al., 1995(2):31-34; Zhou et Liu, 1997(2):22)
=*Cydia pomonella* (Linnaeus)

=*Laspeyresia pomonella* (Linnaeus)
[Codling moth]
別 名：*蘋果小捲蛾、蘋果小捲葉蛾*。
寄 主：蘋果、沙果、庫爾勒香梨(主要寄主)、桃、杏、榅桲、核桃、石榴等。
分 佈：新疆(天山南北水果產區)、吉林；蘇聯、歐洲、美洲、澳洲等果區。
附 註：本蟲被列為世界最嚴重果蟲之，幼蟲蛀果。
天 敵：*Lycorina spilonotae* Chao 梢蛾壕姬蜂(幼蟲)
Lycorina spilonotae Chao 梢蛾壕姬蜂(幼蟲)
Brachymeria excarinata Gahan 無脊闊小蜂(蛹)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Macrocentrus linearis (Nees) 黃長體繭蜂(幼蟲)
Trichogramma sp. 赤眼卵蜂 (在新疆各地寄生卵，寄生率達 50%)

2447. **Carposina niponensis** Walsingham 桃小食心蟲 (Chang, et al., 1977:170-176; Chen, 1994(4):28; Feng, 1997(1):47-49; Gao et al., 1993:20; Hu et al., 1997(3):22; Hua et Ma, 1993:22-24; Lee, et al., 1963: 423-431; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Sun, 1984:373-375; Wang, 1998:34-35; Xing, et al., 1986:67-70; Yin et al., 1994(3):54; Zhang, 1985:6-7; Zhang et al., 1982:13-15)
[Peach fruit moth]
別 名：*桃蛀果蛾*。
寄 主：桃、蘋果、棗、酸棗、梨。
分 佈：陝西、山東、河北、甘肅、遼寧；日本。
天 敵：*Orius minutus* Linnaeus 小黑花蝽(卵)
Chelonus chinensis Zhang 桃小甲腹繭蜂(幼蟲)
Macrocentrus sp. 長距繭蜂
Pristomerus sp. 齒腿姬蜂

2448. **Carposina sasakii** Matsumura 蘋果食心蟲 (Wu & Hang, 1955:344)
別 名：*桃蛀蟲、桃小實蛾、桃小食心蟲*。
寄 主：蘋果、桃。
分 佈：遼寧。
天 敵：*Microdus* sp. 食心蟲縱條繭蜂(幼蟲)

2449. **Celypha pseudalarixicola** Liu 金錢松小捲蛾 (Han., 1992:690)
寄 主：金錢松。
分 佈：湖南。
天 敵：*Itoplectis alternans spectabilis* Matsumura 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)

2450. **Cerace stipatana** Walker 龍眼裳捲蛾 (ASZI, 1987, 2:36; Chao, 1982:232; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Han et Shen, 1993:153-156; Heppner et Inoue, 1992:104; Huang et al., 1997:125; Han., 1992:694; Xiao, 1992:814; Yunn., 1987:869)
Cerace stipatana Walker, 1863:
別 名：*樟絲葉蟲、龍眼卷蛾、白裳真珠蛾*。
寄 主：龍眼、荔枝、油梨、茶、楓香、香樟、雲南樟、四川大葉樟、灰木蓮。
分 佈：福建、雲南、四川、湖南、江西、福建、浙江；日本、印度。
天 敵：龍眼裳卷蛾黑瘤姬蜂
舞毒蛾黑瘤姬蜂
繭蜂

絨繭蜂
Brachymeria excarinata Gahan　無棱脊闊小蜂(蛹)
Brachymeria lasus Walker　廣闊小蜂(蛹)
Elasmus sp.　(幼蟲)
大山雀、黃鶯(捕食幼蟲)
(以廣闊小蜂及龍眼裹卷蛾黑瘤姬蜂寄生率最高,二者共約占寄生率的 70-80 %)

2451. **Cerace stipatana formosana** Diakonoff (Heppner et Inoue, 1992:104)
Cerace stipatana formosana Diakonoff, 1950.
寄 主：
分 佈：臺灣。

2452. **Choristoneura diversana** (Hübner) 異色捲蛾 (Liu et Bai, 1980:32-35)
寄 主：落葉松、魚鱗松、雲杉、稠李、柳、柞、樺、山毛櫸、櫻、鼠李、楊等。
分 佈：東北。

2453. **Choristoneura lafauriana** Ragonot 角色捲蛾 (Xiao, 1992:815)
寄 主：楊梅、落葉松、各種闊葉喬灌木。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯、歐洲。
天 敵：益蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂(蛹)

2454. **Choristoneura longicellana** (Walsingham) 蘋大捲蛾 (Chen et Wang, 1987:28-29; Huang, 1990[ed.] 2:37-39; Hwang, 1974:33; Jiang et al., 1998(1):43-44; NZWDI, 1981: 1679; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Wang, 1987[ed.]:252-266; Zhang, 1987[ed.] 1:131; Zou et al., 1995(4):8)
Archips longicellanus Walsingham,
=*Cacoecia disparana* Kennel,
別 名：*蘋果卷葉蛾*、*黃色卷蛾*。
寄 主：蘋果、梨、杏、山楂、櫻桃、核桃、柳、國槐、櫟。
分 佈：江西、華中、華北、西北、東北、遼寧。

2455. **Clepsis (Siclobola) imitator** Walsingham 櫻桃雙斜捲蛾 (ASZI, 1987, 2:37)
寄 主：櫻桃、蘋果。
分 佈：東北；西伯利亞、日本

2456. **Croesia crataegi** (Kuznetsov) 山楂弧翅捲蛾 (Hun., 1992:695)
寄 主：山楂(山里紅)。
分 佈：湖南；日本、蘇聯。

2457. **Croesia tigricolor** (Walsingham) 虎色弧翅捲蛾 (Hun., 1992:696)
寄 主：小蘋果、楷木、鵝耳櫪等。
分 佈：湖南；日本、蘇聯。

2458. **Cryptophlebia illepida** Butler 羅望子蝕心蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Tsai, 1965:100)
寄 主：荔枝、羅望子、鳳凰木(果實)。

分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡、澳洲、非洲、夏威夷。

2459. **Cryptophlebia ombrodelta** (Lower) 荔枝異形小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:46; Chen et al., 1994:57; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Heppner et Inoue, 1992:108; Ho, 1985:53-62; Huang, 1990[ed.] 2:276-277; Huang, 1997:125; Huang et Gao., 1996:221; Huang et al., 1987:321-323; Hung et Huang, 1991:438; Hung et al., 1997:410; 1998:297-307; Hun., 1992:699; Liu, 1964:147; Xiao, 1992:816; Yunn., 1987:864; Zhan, 1997, 20(4):25; Zhang, 1987[ed.] 1:132)

Arothrophoa ombrodelta Lower, 1898:

=*Cryptophlebia carpophaga* Walsignham, 1899:

別 名：*荔枝小卷蛾，荔枝黑褐卷蛾，皂莢食心蟲，黑點褐卷葉蛾，粗腳姬捲葉蛾，澳洲核桃(堅果)螟*。

寄 主：荔枝(蛀果，早熟品種白臘子、玉荷包、三月紅等早期落果)、橙、楊桃(果)、扁葉軸葉、阿勃勒(又稱牛角樹)，臘腸樹、萡豆樹，蘇木科)、羊蹄甲、金合歡、決明屬、皂莢屬、槐樹。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、湖南、河南、遼寧；日本、馬來西亞、印度、澳洲、大洋洲。

2460. **Cydia coniferana** (Ratzeburg) 松枝小捲蛾 (Xiao, 1992:827)

寄 主：紅松、油松、樟子松、冷杉。

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、西伯利亞。

天 敵：二種寄生蜂(蛹)

2461. **Cydia glandicolana** (Danil) 栗黑小捲蛾 (Xiao, 1992:817)

寄 主：栗、胡桃、櫟、山毛櫸、榛(果實)。

分 佈：華東、華北、西北、東北；歐洲。

2462. **Cydia gruneriana** (Ratzeburg) 松皮小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:54; Xiao, 1992:828)

寄 主：落葉松。

分 佈：遼寧、黑龍江；歐洲。

2463. **Cydia notanthes** (Meyrick) 楊桃花捲蛾 (Chen et Chang, 1989:309; He, 1995(3):41; Heppner et Inoue, 1992:108; Ho, 1985:44; 1988:23-31; 45-51; Huang et Hung, 1994:31-40; 1996:382-383; 1997:151-164; 275-280; Huang et al., 1987:321-323; 1995:219-222; 1996:119-127; 2000 (2):97-107; Hung et Huang, 1988:192-193; 1991:204-212; 1993:171-186; 1996:382; Hung et al., 1997:265-274)

Eucosma notanthes Meyrick, 1936:

[Carambola fruit borer]

別 名：*楊桃花姬捲葉蛾，楊桃果蛀蟲*。

寄 主：楊桃。

分 佈：臺灣，廣西。

2464. **Cydia splendana** (Hübner) 栗小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:55; NZWDI, 1981:1748)

別 名：*栗實蛾，栗子小卷蛾*。

寄 主：栗樹、胡桃、櫟實、山毛櫸、榛樹。

分 佈：華北、西北、東北；歐洲。

2465. **Cydia strobilellia** (Linnaeus) 雲杉球果捲蛾 (Li et Li, 1992:141-146)

Cydia strobilellia (Linnaeus)

Laspeyresia strobilella Linnaeus,

寄 主：雲杉(球果)。

分 佈：

2466. **Cydia zebeana** (Ratzeburg) 松瘿小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:55; Xiao,1992:829)
寄 主：落葉松，油松。
分 佈：華北、吉林、黑龍江；西伯利亞，歐洲。

2467. **Dactylioglypha tonica** (Meyrick) 橄欖捲蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965:100)
Argyroploce tonica Meyrick, 1090:
寄 主：錫蘭橄欖(葉)。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

2468. **Dudua aprobola** Meyrick 灰白條小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:44; Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965:101)
Eccopsis aprobola Meyrick, 1886:
=*Temnolopha metallota* Lower, 1901:
別 名：*馬來蒲桃卷蛾，馬來蒲桃捲葉蛾*。
寄 主：檬果(花)、荔枝、馬來蒲桃(葉)。
分 佈：臺灣、華南、印尼、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、伊里安島、東加、澳洲、大洋洲。

2469. **Eboda celligera** Meyrick 圓角捲蛾 (ASZI, 1987, 2:38; Chang & Hung, 1986:77; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Heppner et Inoue, 1992:103; Liu, 1964: 154)
Eboda celligera Meyrick, 1918:
=*Paratorna glaucoprosopis* Meyrick,193:.
寄 主：荔枝、龍眼。
分 佈：臺灣、福建、華南；印尼、印度。

2470. **Eoinotia (Panoplia) rubiginosana** Herrich-Schaffer 松針小捲蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:133)
寄 主：黃山松。
分 佈：江西。

2471. **Epinotia (Panoplis) rubiginosana** Herrich-Schäffer 松葉小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:47; Beijing FC., 1980[ed.]:274-275; Xiao, 1992:818; Yunn., 1987:865)
別 名：*松針小卷蛾*。
寄 主：油松。
分 佈：雲南、陝西、河南、河北、西北、遼寧；蘇聯、歐洲。

2472. **Eucoenogenes** sp. (Ho, 1985:53)
寄 主：楊桃(果)。
分 佈：臺灣。

2473. **Eucosma melanoneura** Meyrick 檬果黑捲蛾 (Chang & Hung, 1986:75; Heppner et Inoue, 1992:107; Tsai, 1965:100)
Eucosma melanoneura Meyrick, 1912:
別 名：*檬果黑捲葉蛾*。
寄 主：檬果(新芽、花)。

分 佈：臺灣；印度。

2474. **Eudemis gyrotis** Meyrick 楊梅捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:105; Tsai, 1965:100; Zhang, 1987[ed.] 1:133)
Argyroploce gyrotis Meyrick, 1090:
別 名：*楊梅捲葉蛾*、*楊梅圓點小卷蛾*。
寄 主：楊梅(葉)。
分 佈：臺灣、江西；印度。

2475. **Eudemis porphyrana** Hübner 櫟圓點小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:49)
寄 主：蘋果、山楂、稠李、櫟。
分 佈：東北；日本、歐洲。

2476. **Eudemopsis purpurissatana** Kennel 圓斑小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:49)
寄 主：獼猴桃。
分 佈：東北；西伯利亞。

2477. **Gatesclarkeana idia** Diakonoff 楊桃小捲蛾 (Heppner et Inoue, 1992:105; Xiao, 1992:819; Yunn.,1987 : 866; Zhang, 1987[ed.] 1:134)
Gatesclarkeana idia Diakonoff, 1973:
寄 主：楊桃、柑橘、茶、油桐、烏桕、蓖麻、紫蘇。
分 佈：雲南、江西、浙江；印尼(爪哇)、東南亞各國。
天 敵：菱室益蜂(幼蟲)
長興絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria excarinata Gahan 無棱闊小蜂(蛹)
Eurytoma sp. 肩小蜂(蛹)
(幼蟲被寄生率以第一代為最高,可達 31 %;蛹期則以第四代為最高,達 27.5 %)

2478. **Grapholitha funebrana** Treitschke 李小食心蟲 (ASZI, 1987, 2:50; Huang, 1990[ed.] 2:154-156; Kang et al., 1989:142-145; Mu, 1999(1):63; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Woo, 1961:397)
別 名：*李小蠹蛾*。
寄 主：李、杏、櫻桃等。
分 佈：華北、西北、遼寧、吉林、黑龍江；歐洲。

2479. **Grapholitha inopinata** Heinrich 蘋小食心蟲 (ASZI, 1987, 2:50, Chen et Wang, 1987:15-17; Huang, 1990[ed.]: 2:88-10, Li, 1996(3):35; Lin, 1986[ed.]:331-335; NZWDI, 1981:1666; Sun, 1984:354-355; Wang, 1987[ed.]:275-278; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu & Hwang, 1955, 1(1):25-29 ; 1955:339-347; Zhang et Miao, 1996(3):23)
別 名：*蘋蛀蟲*、*蘋果小蛀蛾*、*蘋果小果蠹蟲*、*東北蘋果小食心蟲*、*東北小食心蟲*、*東小*、*蘋小*。
寄 主：蘋果、梨、桃、紅花、山楂、榅桲、沙果、海棠、山荊子等。
分 佈：華中、華北、西北、東北；朝鮮、日本。
天 敵：*Microdus* sp. 食心蟲縱條繭蜂(幼蟲)

2480. **Grapholitha molesta** (Busck) 梨小食心蟲 (ASZI, 1987, 2:51; Chang et al., 1960:192; Chang et Hung, 1986:76; Chen et Wang, 1987:114-116; Di, 1993(1):34-35; Feng, 1997(1):41-43; Feng, 1997(1):47-49; Heppner et Inoue, 1992:109; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:89-93; Hun., 1992:702; Li, 1996(3):35; Li, 1996, 13(4):276;

Li et Wu, 1994, 11(3):194; Lin, 1986[ed.]:331-335; Liu et Gao, 1999(1):21; 41; Ma, 1998:47; Meng, 1987, 5:217-228; NZWDI, 1981:1727; Sun, 1984:356-360; Tang, 1993:23-24; Tang, 1994(2):30; Tsai, 1965:101;Wang, 1987[ed.]:276-279; Wang, 1997(2):49; Wang, 1998:34-35; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et al., 1996(2):36-37; Wang et al., 1997:22-23; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu & Hwang, 1955 1(1):25-29; 1955, 5(3):335-347; Wu et al., 1998(4):25; Zhang, 1987[ed.] 1:134; Zhang, 1997(3):41-42; Zhao et al., 1994(4):26; Zhao et al., 1997:191; Zhao et al., 1998(4):28)

Laspeyresia molesta Busck, 1916:

別 名：*東方果蛾，東方蛀果蛾，東方果蠹蛾，桃折心蟲，桃折心蛾、小食心蟲，梨小，梨折心蟲。*

[Oriental fruit moth]

寄 主：根據幼蟲在不同植物上的不同爲害部位可歸納以下三類：(1)爲害楊梅、桃、櫻桃、杏、李、梅、海棠等新梢；(2)爲害梨、蘋果、臺灣蘋果、桃、枇杷、李、榛、榲桲、杏、梅、山楂、木瓜等果實；(3)爲害枇杷枝幹。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、湖北、安徽、山東、河南、陝西、山西、河北、天津、北京、遼寧；日本、歐洲、澳洲、北美。

天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama　晉草蛉

Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus nipponicus Uchida　日本黑瘤姬蜂(幼蟲)

Eriborus sp.　鈍唇姬蜂

Itoplectis alternans spectabilis (Matsumura)　松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)

Lycorina spilonotae Chao　梢蛾壕姬蜂(幼蟲)

Pristomerus chinensis Ashmead　中華齒腿姬蜂(幼蟲)

Trathala flavo-orbitalis (Cameron)　黃眶離緣姬蜂(幼蟲)

Macrocentrus ancylivorus Roh.　小繭蜂(幼蟲)

Microdus sp.　食心蟲縱條繭蜂(幼蟲)

Brachymeria exarinata Gahan　無棱闊小蜂(蛹)

Trichogramma chilonis Ishii　螟黃赤眼蜂

Trichogramma evanescens Westwood　廣赤眼蜂 (卵生率可達 50 % 左右)

Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker)　稻苞蟲賽寄蠅

2481. **Gravitarmata margarotana** (Heineman) 油松球果小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:52; Beijing FC., 1980[ed.]:361-363; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:195-197; Hun., 1992:702; Lee, et al., 1974:16-28; Li et Li, 1992:141-146; Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:13-20; Li et al., 1992:21-25; Li et al., 1992:26-30; Li et al., 1992:31-34; Li et al., 1992:40-43; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:62; Li et al., 1992:70-72; Li et al., 1992:75-81; Li et al., 1992:82-89; Li et al., 1992:90-96; Li et al., 1992:107-116; Li et al., 1992:135-140; Sun et al., 1992:97-106; Sun et al., 1992:117-126; Sun et al., 1992:127-131; Xiao, 1992:821)

寄 主：*Pinus tabularformis* Carr.　油松(雌球花、球果、種子、新梢)、華山松、白皮松、紅松、赤松、馬尾松、黑松、賓浃失徥濕地松、雲南松、雲杉、冷杉等球果及嫩梢。

分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山西、甘肅；日本、蘇聯、歐洲、蘇格蘭。

天 敵：*Phanerotoma kozlovi* Kok.　考氏白繭蜂

Macrocentrus resinellae (Linnaeus)　球果捲蛾長體繭蜂(幼蟲)

Apanteles sp.　卷蛾絨繭蜂

Eurytoma appendigaster Swederus　懸腹廣肩小蜂(亦寄生絨繭蜂)

Elasmus albipennis Thomson　白翅躍小蜂

Trichogramma dendrolimi Matsumura　松毛蟲赤眼蜂

2482. **Hedya ignara** Falkovitsh 三角廣翅小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:52)

寄 主：梨。

分 佈：東北；西伯利亞。

2483. **Homona coffearia** (Nietner) 柑橘長捲蛾 (ASZI, 1987, 2:38; Chang & Hung, 1986:77; Chao, 1982:232; Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Heppner et Inoue., 1992:104; Huang, 1990[ed.] 2:248-251, 274-275; Huang et Gao, 1996:183; Huang et al., 1997:125; Hun., 1992:696; Liu, 1964:154; Luo et Jin, 1995:87; NZWDI, 1981:1911, 1976; Shih et Chow, 1984:128; Tsai, 1963:102; Wang, 1987[ed.]:332-333; Wen, 1994(3):43; Yunn., 1987:871; Zhang, 1985[ed.]:216-217; Zhang, 1987[ed.] 1:131)

Tortrix coffearia Nietner, 1811:
=*Homona fasciculana* Walker, 1863:
=*Pandemis menciana* Walker, 1863:
=*Godana simulana* Walker, 1866:

別 名：*褐帶長捲葉蛾，茶捲葉蛾，茶淡黃捲葉蛾，褐帶人捲葉蛾，褐黃捲葉蛾，後黃捲葉蛾*。

寄 主：柑橘、荔枝、龍眼(梢、果)、楊桃(葉、花、果實)，鄧氏胡頹子、柿、李、桃、梨、臺灣蘋果、枇杷、楊桃、石榴、柿、銀杏、板栗、酪梨、咖啡、茶、油茶、臭茉莉、茉莉、菊、艾、茄子、茼蒿、大豆、樟、大葉羅漢松、烏桕、柳、茄苳、樟、鹽膚木、大紅心、九芎、臺灣楤木、饅頭果、細葉桉、苦楝、合歡、玉蘭、血桐、金寧、黃荊、牡荊、婆婆針、剪刀股、大頭茶、長葉茶梅、榕樹、紫薇、蓖麻、鵲豆、亞麻、長葉茶梅。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、華北也有發生；日本、印尼、印度、斯里蘭卡。

天 敵：*Anomalon discoidellum* Sonan 姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Epiurus heichinus Sonan 姬蜂(幼蟲)
Eulimneria homonae Sonan 姬蜂(幼蟲)
Iseropus (Gregopimpla) kuwanae (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂(幼蟲)
Itoplectis homonae Sonan 姬蜂(幼蟲)
Itoplectis naranyae (Ashmead) 螟蛉瘤姬蜂(幼蟲)
Nesopimpla naranyae Ashmead 姬蜂(幼蟲)
Phytodietus spinipes Cameron 姬蜂(幼蟲)
Pimpla luctuosa Smith 姬蜂(幼蟲)
Teleutaea gracilis Cushman 姬蜂(幼蟲)
Apanteles heichinensis Sonan 絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles theae Sonan 茶絨繭蜂(幼蟲)
Ascogaster reticulatus Watanabe 网皺革腹繭蜂
Bracon adoxophyesi Minamikawa 茶小卷蛾繭蜂(幼蟲)
Macrocentrus homonae Nixon 茶卷蛾長體繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣腿小蜂(蛹)
Elasmus homonae Ferrière 捲蛾躍小蜂(幼蟲)
Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)

2484. **Homona magnanima** Diakonoff 茶長捲蛾 (ASZI, 1987,2:39; Heppner et Inoue, 1992:104; Hun.,

1992:696; Zhang, 1987[ed.] 1:131)
Homona magnanima Diakonoff, 1948:
寄 主：梨、蘋果、桃、櫻桃、石榴、柿、柑橘、核桃、茶、山茶、大豆、薔薇、落葉松、冷杉、紫杉、衛矛、牡丹、樟、女貞、櫟、椴、苦楝、紫藤、衛茅。
分 佈：江西、湖南等省；日本。

2485. **Hoshinoa longicellena** (Walsingham) 黃色捲蛾 (ASZI, 1987, 2:37; Heppner et Inoue, 1992:104; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Xiao, 1992:826; Zhang et Miao, 1996(3):23)
Archips longicellana Walsingham, 1900:
別 名：*蘋果大卷葉蛾、蘋大卷葉蛾、南川卷蛾*。
寄 主：蘋果、梨、杏、櫻桃、山楂、柿、鼠李、栗、柳、櫟、山槐。
分 佈：湖南、湖北、陝西、山西、江蘇、安徽、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。
天 敵：*Itoplectis naranyae* (Ashmead) 螟蛉瘤姬蜂(幼蟲)

2486. **Lasiognatha mormopa** (Meyrick) 圓紋捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Chen, 1981:41; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965:101; Yunn., 1987:867)
Platypeplus mormopa Meyrick, 1906:
別 名：*圓紋捲葉蛾、毛顎小卷蛾*。
寄 主：蒲桃、蓮霧(果實、葉)。
分 佈：臺灣、雲南；印度、斯里蘭卡。

2487. **Laspeyresia grunertiana** (Ratzeburg) 松皮小捲蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:342-343; Liu, 1982[ed.]:243-244; Liu, et al. 1974:171)
Grapholitha grunertiana
寄 主：落葉松(*Larix dahurica* Turcz.)。
分 佈：遼寧、黑龍江；歐洲中、北部。
天 敵：Pteromalidae 金小蜂科(幼蟲)
Tachinidae 寄蠅科(蛹)

2488. **Laspeyresia splendana** (Hübner) 栗實蛾 (Chen et Wang, 1987:217-218; Huang, 1990[ed.] 2:353-356; Wang, 1987[ed.]:216-217; Wang, 1998(3):43-44; Zhang, 1987[ed.] 1:134)
別 名：*栗子小卷蛾*。
寄 主：蛀食栗實、胡桃、榛、櫟、山毛櫸。
分 佈：江西、江蘇、陝西、華北、西北、遼寧；歐洲。

2489. **Lobesia aelopa** Meyrick 黃斑小捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:105; Tsai, 1965:101)
Lobesia aelopa Meyrick, 1907:
別 名：*黃斑小捲葉蛾*。
寄 主：荔枝(葉)、茶(種子)。
分 佈：臺灣、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2490. **Lozotaenia forsterana** (Fabricius) 二點捲蛾 (Liu et Bai, 1980:32-35)
寄 主：茶藨子、落葉松、冷杉、雲杉、越橘、常春藤、忍冬、女貞等。
分 佈：東北。

2491. **Olethreutes lenoaspis** Meyrick 三角新小捲蛾 (Chen et al., 1997(4):19-21, 3; Tan et al., 1999, 26(3): 213-218)
別 名：*黃三角黑卷葉蛾*。
寄 主：龍眼、荔枝。
分 佈：福建、廣西。

2492. **Orthotaenia undulana** (Denis et Schiffermüller) 直帶小捲蛾 (Liu et Bai, 1980:32-35)
寄 主：懸鉤子、松、檜、柳、樺、毛榛子、柳葉菜。
分 佈：東北。

2493. **Pammene** sp. 油松超小捲蛾 (Li et al., 1992:4)
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果)
分 佈：陝西、山西。

2494. **Pandemis cinnamomeana** (Treitschke) 松褐捲蛾 (ASZI, 1987, 2:39; Hua., 1992:697; Liu et Bai, 1980:32-35; Yunn., 1987:871; Zhang, 1987[ed.] 1:131)
寄 主：蘋果、梨、稠李、櫻桃、花楸、越橘、落葉松、柳、櫟、樺、槭、冷杉。
分 佈：江西、湖南、雲南、四川、湖北、浙江、山西、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲。

2495. **Pandemis corylana** (Fabricius) 榛褐捲蛾 (ASZI, 1987, 2:39; Hua., 1992:697; Liu et Bai, 1980:32-35; Liu, et al. 1974:172; Xiao, 1992:830)
寄 主：懸鉤子、櫻、鼠李、落葉松、杞柳、蒿柳、大黃柳、三蕊柳、水曲柳、柞、榛、山毛櫸、樺及草本植物。
分 佈：湖南、華中、華北、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲。

2496. **Pandemis dumetana** Treitschke 桃褐捲蛾 (ASZI, 1987, 2:40; Yunn., 1987:871)
寄 主：蘋果、胡桃楸、柳葉繡線菊、鼠李、水曲柳、蕁麻、藜、地麻、地榆、白蘚、唐松草、常春藤、珍珠菜、野藿香、薄荷。
分 佈：雲南、四川、湖北、北京、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、印度、歐洲。

2497. **Pandemis heparana** Denis & Schiffermüller 蘋褐捲蛾 (ASZI, 1987 2:40; Huang, 1990[ed.] 2:36-37; NZWDI, 1981:1679; Sun, 1984:350-352; Wang, 1987[ed.]:262-266; Xiao, 1992:831; Zhang, 1987[ed.] 1:132; Zhang et Miao, 1996(3):23)
別 名：*蘋果褐卷蛾*、*蘋果褐卷葉蛾*、*褐帶卷蛾*、*柳曲角卷蛾*。
寄 主：蘋果、梨、杏、桃、櫻桃、桑、楊、柳、榛、鼠李、水曲柳、櫟、繡線菊、毛赤楊、榆、椴、花楸、繡線菊、越橘、珍珠菜、蛇麻。
分 佈：華東、華中、華北、西北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、印度、歐洲。
天 敵：白殭菌 (雨季)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Iseropus (Gregopimpla) kuwanae (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂(幼蟲)
Ascogaster sp. 繭蜂(在山東寄生幼蟲,寄生率可達 50% 左右)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂 (在山東卵寄生率

高達 70%)

2498. **Pandemis ribeana** (Hübner) 醋栗褐捲蛾 (Chang & Hung, 1986:77; Suzhou CS., 1985:211-212; Zhang, 1987[ed.] 1:132; Zheng, 1982:211-212)
=*Archips ribeana* Lozotaenia,
=*Pandemis grossulariana* Lozotaenia,
=*Pandemis flavalna* (Lozotaenia),
別 名：*三帶卷葉蛾，黃卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、梅、櫻桃、柑橘、桑、醋栗、榆、椴、樺、棟、槭、花楸、鼠李、楓香。
分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、華北、東北。
天 敵：*Brachymeria lasus* (Walker)　廣闊小蜂(蛹)

2499. **Petrova cristata** Walsingham 松實小捲蛾 (Liu, 1982[ed.]:245-246; Zhang, 1987[ed.] 1:135)
別 名：*馬尾松梢小卷蛾*。
寄 主：馬尾松、赤松、油松、濕地松、黃山松(幼樹、梢頭、果實)。
分 佈：江西、河南(長江以南馬尾松林分布區)、山東。

2500. **Petrova resinella** (Linnaeus) 紅松實小捲蛾 (Wang et al., 1990,1:96-101; Wang et al., 1990, 1:102-106)
寄 主：*Pinus sylvestris* var. *mongolica*　樟子松
國外：*Pinus sylvestris*　歐洲赤松
Pinus iontana　克里米亞松
Pinus banksiana　短葉松
分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟紅花爾基樟子松林區)；西班牙、法國、蘇聯、蘇格蘭、瑞典、挪威、芬蘭。

2501. **Phricanthes flexilineana** (Walker) 第倫桃捲蛾 (Chang & Hung, 1986:77; Heppner et Inoue, 1992:103)
Sciaphila flexilineana Walker, 1863:
=*Phricanthes macroura* Lower,1908:
寄 主：第倫桃(葉)。
分 佈：臺灣；菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲東部。

2502. **Ptycholoma lecheamum** (Linnaeus) 環鉛捲蛾 (Han., 1992:697)
寄 主：梨、山楂、稠李、櫟、山毛櫸、樺、槭、栲、椴、榆、花楸、楊、柳等。
分 佈：湖南、東北；西伯利亞、小亞細亞、歐洲。

2503. **Ptycholomoides aeriferanus** Herrich-Schäffer 落葉松捲蛾 (Liu, 1982[ed.]:231-232; Xiao, 1992:835)
寄 主：落葉松。
分 佈：黑龍江、東北；日本、西伯利亞、歐洲。
天 敵：*Itoplectis alternans spectabilis* (Matsumura)　松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Theronia atalantae gestator (Thunberg)　脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)

2504. **Retinia cristata** (Walsingham) 松梢蛀蟲 (ASZI, 1987, 2:59; Chang & Hung, 1986:77; Chao, 1982:231; Heppner et Inoue, 1992:107; Han., 1992:705; Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:63; Li et al.,

1992:70-72; Xiao, 1992:836; Yunn., 1987:865)
Enarmonia cristata Walsingham, 1900:
=*Petrova insignis* Heinrich, 1928:
別 名：*松實小捲蛾，松梢卷蛾，松梢小卷葉蛾*。
寄 主：馬尾松、赤松、黑松、黃山松、油松(球果、新梢) 濕地松。
分 佈：臺灣、雲南、四川、湖南、江西、浙江、安徽、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北；日本、中南半島、歐洲。

2505. **Retinia monopunctata** (Oku) 一點實小捲蛾 (Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:63; Xiao, 1992:837)
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果)
魚鱗雲杉。
分 佈：陝西、山西、東北；日本。
天 敵：寄生蜂(一種,幼蟲,寄生率達 15 %)

2506. **Retinia perangustana** (Sneller) 落葉松實小捲蛾 (Xiao, 1992:838)
別 名：*落葉松球果卷葉蛾*。
寄 主：歐洲落葉松、波蘭落葉松、西伯利亞落葉松、興安落葉松、長白落葉松、日本落葉松。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。
天 敵：真菌(一種,寄生蛹,寄生率最高達 40 %)
寄生蜂(幼蟲,寄生率高達 68 %)
寄生蜂(幼蟲)
寄生蜂(二種,蛹)

2507. **Retinia resinella** (Linnaeus) 紅松實小捲蛾 (Xiao, 1992:839)
寄 主：樟子松。
分 佈：內蒙古；蘇聯、歐洲。
天 敵：Ichneumonidae 姬蜂科(一種,老齡幼蟲,寄生率 13-32.4 %)
?Eulophidae 釉小蜂科(一種,幼齡幼蟲,寄生率 8.1 %)

2508. **Retinia splendida** (Oku) 銀實小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:60)
寄 主：赤松。
分 佈：華北、日本。

2509. **Rhopobota latipennis** (Walsingham) 李黑痣小捲蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:135)
寄 主：李。
分 佈：江西。

2510. **Rhopobota unipunctana** (Haworth) 蘋黑痣小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:61; Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:108; Hwang, 1974:37; Zhang, 1987[ed.] 1:135)
Tortrix unipunctana Haworth, 1811:
=*Tortix naevana* Hübner, 1817:
=*Acroclita microrrhyncha* Meyrick, 1931:
別 名：*凹頂小卷蛾*。
寄 主：蘋果、梨、梅、杏、山楂、海棠、花楸、越橘、鼠李、細葉冬青、水曲柳、黃楊、女貞。

分 佈：臺灣、江西、華北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、印度、巴基斯坦、歐洲、北美。

2511. **Rhopobota ustomaculana** (Curtis) 越橘黑痣小捲蛾 (Hun., 1992:705; Zhang, 1987[ed.] 1:136)
寄 主：柑橘、越橘。
分 佈：江西、湖南；日本、歐洲。

2512. **Rhyacionia dativa** Heinrich 馬尾松梢小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:62; Heppner et Inoue., 1992:107; Hun., 1992: 705; Zhang, 1987[ed.] 1:136)
=*Evetria japoniella* Matsumura, 1917:
Rhyacionia dativa Heinrich, 1928:
寄 主：馬尾松(枝梢)。
分 佈：江西、湖南、廣東、四川(重慶)、安徽、江蘇；日本。

2513. **Rhyacionia dolichotubula** Liu et Bai 長梢小捲蛾 (Liu et Bai:155)
Rhyacionia dolichotubula Liu et Bai, 1984:155.
寄 主：松樹嫩梢。
分 佈：雲南。

2514. **Rhyacionia duplana** (Hübner) 夏梢小捲蛾(ASZI, 1987, 2:61; Beijing, FC., 1980[ed.]:171-172; Liu, 1982[ed.]:244-245; Xiao, 1992:840)
別 名：*松梢小卷蛾、銹翅小卷蛾*。
寄 主：油松、赤松、黑松(蛀入新梢髓部)。
分 佈：山東、華北、遼寧；日本、歐洲。

2515. **Rhyacionia insulariana** Liu 雲南松梢小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:62; Xiao, 1992:841; Yunn., 1987:865)
Rhyacionia insulariana Liu, 1981:99.
寄 主：雲南松、高山松、思茅松、華山松、馬尾松。
分 佈：雲南、四川。
天 敵：白僵菌(幼蟲和蛹,幼蟲感病死亡率爲 10-15 %,蛹感病死亡率爲 3-8 %)
芽孢杆菌
Coccygomimus sp. 黑瘤姬蜂(幼蟲和蛹,蛹期寄生率可達 19.2 %)
Braconidae 繭蜂科
Tachinidae 寄蠅科

2516. **Rhyacionia leptotubula** Liu et Bai 細梢小捲蛾 (Liu et Bai:155)
Rhyacionia leptotubula Liu et Bai, 1984:155.
寄 主：松樹嫩梢。
分 佈：雲南。

2517. **Rhyacionia pinicolana** (Doubleday) 松梢小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:62; Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:63; Li et al., 1992:66-69; Liu et Bai, 1980:32-35; Xiao, 1992:842; Yue et al., 1990, 1:31-42; Zhang et al., 1990, 1:75-80)
寄 主：松
Pinus tabulaeformis Carr. 油松(球果、新梢)
Pinus sylvestris var. *mongolica* 樟子松球果
分 佈：陝西、山西、華北、內蒙古、黑龍江；歐洲。

天 敵：*Elasmus albomaculatus* Gahan　白斑躍小蜂(幼蟲)
　　　Trichogramma chilonis Ishii　螟黃赤眼蜂(卵)

2518. **Rhyacionia undulana** (Denis et Schiffermüller) 直帶小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:58)
寄 主：松、懸鈎子、榛、柳、檜、柳葉菜、婆婆納、地筍、樺。
分 佈：東北；西伯利亞、小亞細亞、歐洲。

2519. **Sciaphila branderiana** Linnaeus 楊灰小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:63; Liu et Bai, 1980:32-35)
寄 主：松樹、山楊、樺樹、山毛櫸。
分 佈：東北；日本、西伯利亞、歐洲、北美。

2520. **Sorolopha elaeodes temenopis** (Meyrick) 酪梨捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965:100)
Argyroploce elaeodes tememopis Meyrick, 1936:
別 名：*酪梨捲葉蛾*。
寄 主：酪梨。
分 佈：臺灣。

2521. **Sorolopha plinthograpta** Meyrick 樟捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965:100)
Argyroploce plinthograpta Meyrick, 1931:
寄 主：桑、樟。
分 佈：臺灣。

2522. **Sorolopha semiculta** (Meyrick) 白點捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:106; Tsai, 1965: 100)
Argyroploce semiculta Meyrick, 1909:
=*Argyroploce heteraspis* Meyrick, 1936:
別 名：*白黑捲葉蛾*。
寄 主：酪梨(葉)。
分 佈：臺灣；斯里蘭卡。

2523. **Sparganothis pilleriana** Denis & Schiffermüller 葡萄長鬚捲蛾 (ASZI, 1987, 2:42)
[Vine leaf moth]
寄 主：葡萄、棠梨、茶、景天、車前、珠菜、琴柱草、唐花草、白鮮、艾、女婁、草石蠶。
分 佈：東北；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、北美。
天 敵：*Itoplectis alternans spectabilis* (Matsumura)　松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)

2524. **Spilonota albicana** Motschulsky 白小食心蟲 (Chen et Wang, 1987:17-18, Huang, 1990[ed.] 2:140-141; NZWDI, 1981:1668; Wang, 1987[ed.]:275-278; Wang et Xu, 1996(2):13-16; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu et Hwang, 1955, 1(1):25-29; 1955, 5(3):335-347; *Zhang*, 1987[ed.] 1:136; Zhang et Miao, 1996(3):23)
Spilonota albicana Motschulsky,
=*Spilonota prognathana* Snellen,
別 名：*桃白小卷蛾、桃白卷葉蟲、白小*。
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、櫻桃、山楂、榅桲、海棠等果樹蛀食果實。
分 佈：江西、四川、河南、陝西、華中、華東、華北、遼寧、東北。
天 敵：一種繭蜂，越冬代寄生率可達 30%。

2525. **Spilonota lariciana** (Hemnemann) 松白小捲蛾 (Liu, et al., 1974:173, 1988:160; Xiao, 1992:844)
=*Eucosma ocellana*
=*Tmetocera laricana*
=*Tmetocera zellerana*
寄 主：落葉松(*Larix dahurica* Turcz.)。
分 佈：黑龍江；日本、北美、歐洲。

2526. **Spilonota lechriaspis** (Thunberg) 頂梢捲葉蛾 (Chen et Wang, 1987:31-32; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:31-33; Lin, 1986[ed.]:329-330; NZWDI, 1981:1683; Shen, 1997, 19(1):21-25; Wang, 1987[ed.]:252-266; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu et al., 1998(4):25; Zhang, 1987[ed.] 1:136)
別 名：*芽白小卷蛾，頂芽卷葉蛾，擬白卷葉蛾，苹梢卷葉蛾*。
寄 主：蘋果、沙果、梨、桃、花紅、海棠、檳子、杜梨、李、杏、榲桲、枇杷等，幼蟲爲害幼芽、花蕾、花朵、幼果、嫩梢及葉片。
分 佈：十分普遍，江西、陝西、河南、山東、遼寧等。

2527. **Spilonota ocellana** Schiffermüller et Denis 蘋白小捲蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:136)
寄 主：蘋果、梨、桃、李。
分 佈：江西。

2528. **Spilonota prognathana** Snellen 蘋果白果蠹蛾 (Wu & Hwang, 1955:343)
別 名：*蘋白蛀蛾，蘋果白蛀蛾，蘋果擬白小果蠹蛾，白小食心蟲，白小*。
寄 主：蘋果、棗等。
分 佈：遼寧。

2529. **Spilonota pyrusicola** Liu et Liu 梨白小捲蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:121-123; Liu et Zhao, 1994(2):10-11, 29; NZWDI, 1981:1725; Sun, 1995:38)
Spilonota sp. Huang, 1990[ed.] 2:121-123.
俗 名：*翻花蟲，梨食芽蛾*。
寄 主：梨芽、山楂。
分 佈：華東、華北、東北梨主要產區。

2530. **Strepsicrates albicana** (Motschulsky) 桃白小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:63; Hun., 1992:706)
寄 主：蘋果、梨、杏、桃、李、櫻桃、山楂、榲桲。
分 佈：湖南、西南、華中、華東、華北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞。

2531. **Strepsicrates lariciana** Hemnemann 松白小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:64; Xiao, 1992:844)
寄 主：落葉松。
分 佈：黑龍江；日本、歐洲、北美。

2532. **Strepsicrates lechriaspis** Meyrick 芽白小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:64)
寄 主：蘋果、梨、山楂、枇杷等。
分 佈：華東、華中、華北、東北；朝鮮、日本。

2533. **Strepsicrates ocellana** (Schiffermüller et Denis) 蘋白小捲蛾 (ASZI, 1987 2:65; Xiao, 1992:845)
別 名：*蘋果白卷葉蛾*。

寄 主：蘋果、梨、杏、李、桃、櫻桃、山楂、榲桲、沙果、海棠等果樹，及大多數其他闊葉樹。
分 佈：華南、華中、華東、華北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、北美。
天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama 晉草蛉

2534. **Strepsicrates rhothia** (Meyrick) 箭角捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:108; Tsai, 1965:101; Wen et Lee, 1985)
Spilonota rhothia Meyrick, 1910.
別 名：*箭角捲葉蛾*。
寄 主：番石榴、藍桉、白千層。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡、毛里求斯。

2535. **Statherotis discana discana** Felder et Rogenhofer 前紋捲葉蛾 (Chen, 1981:47)
寄 主：蓮霧、荔枝。
分 佈：臺灣、海南；菲律賓、印度、爪哇、所羅門群島。

2536. **Statherotis leucaspis** (Meyrick) 三角新捲蛾 (ASZI, 1987, 2:57; Chang & Hung, 1986:75; Heppner et Inoue, 1992: 106; Tsai, 1965:100)
Eucosma leucaspis Meyrick,1902.
別 名：*荔枝前紋卷蛾*。
寄 主：荔枝(葉、果實)。
分 佈：臺灣、華南；日本、印度、斯里蘭卡。

2537. **Strophedra nitidana** Fabricius 櫟曲小捲蛾 (ASZI, 1987, 2:65)
寄 主：栗樹、櫟樹、樺樹、山毛櫸。
分 佈：東北；小亞細亞、歐洲。

2538. **Syndemis musculana** (Hübner) 灰紋捲蛾 (ASZI, 1987, 2:42; Liu et Bai, 1980:32-35)
寄 主：蘋果、懸鉤子、雲杉、櫟、樺、山楊、柳、榿木、花楸、椴、龍芽草、鼠李、玄參、水蘇、鹿蹄草、藿香。
分 佈：東北；日本、西伯利亞、歐洲、北美。

2539. **Theorica lamyra** (Meyrick) 黑紅捲蛾 (Chang & Hung, 1986:76; Heppner et Inoue, 1992:105; Tsai, 1965:101)
Argyroploce lamyra Meyrick, 1911.
別 名：*黑紅捲葉蛾*。
寄 主：荔枝(葉)。
分 佈：臺灣；斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲。

2540. **Zeiraphera grisecana** (Hübner) 松線小捲蛾 (Xiao, 1992:847)
別 名：*落葉松灰卷葉蛾*。
寄 主：落葉松、松、雲杉、冷杉。
分 佈：河北、華北、西北；蘇聯、歐洲、北美。
天 敵：*Tranosema* sp. 顫姬蜂(幼蟲)
Phaeogenes sp. 松線小卷蛾姬蜂(蛹,蛹蠶後期寄生率可達 85.7 %)
Ascogaster sp. 松線小卷蛾甲腹繭蜂

2541. **Zeiraphera lariciana** Kawabe 落葉松線小捲蛾 (Xie et al., 1993:280-282)
寄 主：落葉松。
分 佈：河北。
天 敵：*Tranosema* sp. 蝴瘤蜂(幼蟲)
Phaeogenes sp. 松線小卷蛾瘤蜂(蛹,猖獗後期寄生率可達 85.7 %)
Ascogaster sp. 松線小卷蛾革腹繭蜂

Geometridae 尺蛾科

2542. **Abraxas flavisinuata** Warren 馬尾松點尺蛾 (ASZI, 1987, 2:120; Xiao, 1992:889)
寄 主：馬尾松、雲南松。
分 佈：湖南、雲南、貴州；日本。

2543. **Abraxas grossudariata** (Linnaeus) 醋栗尺蛾 (ASZI, 1987, 2:120; Zhang, 1987[ed.] 1:182)
寄 主：醋栗、李、杏、桃、稠李、烏荊子、榛、山楡、杜柳、紫景天。
分 佈：江西、陝西、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、亞洲(西部)、歐洲。
天 敵：*Phryxe vulgaris* (Fallén) 普通怯寄蠅

2544. **Abraxas suspecta** Warren 絲棉木金星尺蛾 (Heppner et Inoue., 1992:111; Hun.,1992:851)
Abraxas suspecta Warren, 1894:
=*Abraxas lepida* Warren, 1894:
=*Abraxas obscurifrons* Wehrli, 1935:
寄 主：板栗、馬尾松、楊、柳、槐、桕、水杉、絲棉木、黃連木、馬桑、山毛櫸、黃楊、衛茅。
分 佈：臺灣、湖南、華中、華東、西北、華北、東北地區。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

2545. **Alcis betularia** Warren 小四目枝尺蛾 (Chang & Hung, 1986:99; Tsai, :1965121)
寄 主：柑橘類、桑、棉、蔬菜類。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、阿穆爾、烏蘇里。

2546. **Alcis secundaria** Esper 針葉霜尺蛾 (ASZI, 1987, 2:122)
寄 主：松、樅、樅、雲杉、檜等。
分 佈：黑龍江；蘇聯、歐(中部、南部)。

2547. **Angerona glandinaria** Motschulsky 鋸翅尺蛾 (ASZI, 1987, 2:118)
寄 主：李、木莓、樺、柳、忍冬。
分 佈：東北；朝鮮、日本、西伯利亞。

2548. **Angerona prunaria** (Linnaeus) 李尺蛾 (ASZI, 1987, 2:118)
寄 主：李、山楂、落葉松、樺、烏荊子、柏樹、榛、千金楡。
分 佈：內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、西歐。

2549. **Antitygodes divisaria** Walker 綠尺蛾 (Chao, 1982:250, Luo et al., 1996:59)

寄 主：橡果。
分 佈：福建、海南。

2550. **Apocheima cinerarius** Eschoff 沙棗尺蛾 (ASZI, 1987, 2:125; Beijing FC., 1980[ed.]:262-264; Dai et Zhu, 1979:420-427; Huang, 1990[ed.] 2:54-58; Liu, 1982[ed.]:205-Sun, 1984:362-365; Suzhou CS., 1985:199-200; Wang, 1987[ed.]:245-247; Xiao, 1992: 890; Zheng, 1982:199-200)
別 名：*春尺蠖，桑灰尺蠖，榆尺蠖，柳尺蠖，桑尺蠖。*
寄 主：沙棗、核桃、杏、蘋果、沙果、梨、李、葡萄、桑、柳、楊、胡楊、檸條、槐、榆、槭、沙柳、小麥、玉米、苜蓿、苦豆子。
分 佈：陝西、山東、天津、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古；蘇聯。
天 敵：*Sympherobius* sp. 褐蛉
Coccinella septempunctata L. 七星瓢蟲
Hippodamia tredecimpunctat L. 十三星瓢蟲
Propylaea japonica Thumberg 龜紋瓢蟲
Propylaea quatuordecimpunctata L. 方斑瓢蟲
繭蜂(幼蟲,寄生率爲 27 %)
Lacerta agilis 沙蜥蜴
Phaisanus colchicus 環頸雉

2551. **Apocheima cinerarius pyri** Yang 梨尺蠖 (Huang, 1990[ed.] 2:127-129)
別 名：*梨步曲。*
寄 主：雜、梨、杜梨、蘋果、杏、山楂、柳、小葉楊、榆、中國槐等。
分 佈：河南、山東、山西、河北。

2552. **Apochima excavata** (Dyar) 桑褶翅尺蛾 (ASZI, 1987, 2:125; Niu, 1999(2):52; Xiao, 1992:925)
寄 主：桑、核桃、林檎、梨、蘋果、桃、櫻桃、海棠、貼梗海棠、毛白楊、雪柳、刺槐、槐樹、洋槐、榆樹、欒、元寶、白蠟、金銀木、太平花、丁香。
分 佈：寧夏、陝西、河南、河北、北京；朝鮮、日本。

2553. **Arichanna melanaria fraterna** (Butler) 黃星尺蛾 (Chao, 1982:250; Hun., 1992:867)
寄 主：油松、樫木、楊、樺。
分 佈：福建、湖南、華北、東北地區；日本。

2554. **Ascotis selenaria** Schiffermüller et Denis 大造橋蟲 (Cheng et Duang, 1992, 9(2):122; Huang et Gao, 1996:186; Xie et al., 1998(2):54-55; Zhang, 1987[ed.] 1:183)
寄 主：柑橘、刺梨、棗、豆類、花生、茶、棉、小薊、艾。
分 佈：福建、江西、陝西。

2555. **Ascotis selenaria cretacea** Butler (Chang et Hung, 1986:99)
寄 主：柑橘類、桑科。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、東西伯利亞、歐洲、美洲。

2556. **Ascotis selenaria dianaria** (Hübner) 大造橋蟲 (Chao, 1982:250; Huang et Gao, 1996:186; Ren et Wu, 1990:303-304; Xiao, 1992:892)
寄 主：柑橘、枸橘、櫻花、枇杷、梨、李、棗、桑、构樹、棉、池杉、水杉、

落羽杉、旱柳、法國梧桐、楓楊、苦楝、椿樹、夾竹桃、泡桐、紫薇、女貞、小葉女貞、榆樹、海桐等樹種及多種草本植物。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、江蘇、湖北；印度、歐洲南部。
天 敵：細菌(越冬蛹,致死率 1.2 %)
真菌
白僵菌(幼蟲)
蜘蛛
圓腹長腳蛛
Hierodula patellifera Serville 廣腹螳螂
Calosoma maderae chinensis Kirby 中華金星步
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
大山雀、黑卷尾、樹麻雀、烏鶇

2557. **Biston betularia (Linnaeus)** 樺尺蛾 (ASZI, 1987, 2:122; Yuan., 1987:916)
寄 主：蘋果、黑莓、落葉松、樺、楊、椴、法國梧桐、榆、櫟、樗、槐、柳、椈、黃檗、染料木、山毛櫸、艾、蒿、羽扇豆。
分 佈：雲南、內蒙古、東北；朝鮮、日本、蘇聯、西歐。

2558. **Biston marginata Shiraki** 油茶尺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:257-258; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:284-285; Heppner et Inoue, 1992:117; Hun., 1992:880; Hu et Liu, 1980, 1:115-117; 1981, 2:141-143; Liu, 1982[ed.]:320-321; Tsai, 1965:121; Yan et al., 1981, 2:155-160; Zhang, 1987[ed.] 1:183)
Biston marginatus Shiraki, 1913:
=*Biston fragilis* Inoue, 1958:
寄 主：板栗、桑、油茶為主，食料不足時還為害草莓、馬尾松、杉、茶、月桃、臺灣相思樹、饅頭果、樟、楓楊、泡桐、油桐、小葉楊、烏桕、樗、杉、魚藤、大青、紅花臭茉莉、茯苓菜、灰木、假長葉楠等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、湖北；日本。
天 敵：姬蜂(二種，蛹)
雙針蟻(蛹)
黑山蟻(蛹)
大山雀、棕頭鴉雀、白頭鵯、鶇雀、竹雞

2559. **Biston regalis comitatus (Warren)** 雙雲尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:117; Hun., 1992:880)
Eubyjodonta regalis comitatus Warren, 1899:
=*Biston bloekeri* Kuznesov, 1902:
=*Amphidasis jesoensis* Matsumura, 1913:
寄 主：馬尾松、油桐、楊。
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、湖南、湖北、河南、東北地區；朝鮮、日本、俄羅斯東南部。

2560. **Biston suppressaria** Guenée 油桐尺蛾 (ASZI, 1987, 2:120; Beijing FC., 1980[ed.]:255-257; Chao, 1982:250; Chen, 1994(1):45-46; Chen, 1996, 22(2):27; Chen, 1999(5):32; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:285-286; Huang et Gao, 1996:185; Hun., 1992:881; Liu, 1982[ed.]:331-333; Mo et Lei, 1993, 19(5):53; Mo et al., 1993, 19(5):53, Wang et Zhang, 1998, 14(1):7; Xian, 1992:896; Yuan., 1987:915;Zhang, 1985[ed.]:185-187; Zhang, 1987[ed.] 1:184; Zhang et Zhang, 1999:26; Zhao et al., 1997:190; Zheng, 1993(4):62; Zheng et al., 1999(6):21)
=*Buzura suppressaria* Guenée,
別 名：*大尺蠖、油桐尺蠖*。

寄 主：油桐、油茶、茶葉為主，還為害柑橘、松、柿、棗、楊梅、板栗、枇杷、梅、榛、烏桕、扁柏、杉、櫟、麻櫟、肉桂、刺槐、漆、桉樹等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、江蘇；日本、緬甸、印度。
天 敵：核多角體病毒(幼蟲)
螻蛄(幼蟲,蛹)
大黑蟻(幼蟲)
尺蛾強姦蜂(幼蟲,越冬蛹,寄生率約 10 % 左右)
大尺蛾姦蜂(幼蟲,蛹)
Aleiodes buzurae He et Chen 油桐尺蠖脊繭蜂(幼蟲)
Apanteles buzurae You, et. al. 油桐尺蠖絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles hyposidrae Wilkinson 尺蠖絨繭蜂(幼蟲)
長跗釉小蜂(初齡幼蟲)
Telenomus buzurae Wu et Chen 油桐尺蠖黑卵蜂(卵,寄生率 23 %)

2561. **Biston suppressaria benescripta** Prout 海南油桐尺蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:253-256; Huang et Gao, 1996:185; NZWDI, 1981:1916; Zhang et Li, 1998:29-30)
Bugura suppressaria benescripta Pxout,
寄 主：柑橘類、茶、油茶、油桐、雞爪梨、烏桕、苦楝、南洋楹、漆、柏、楊梅、柿、松、杉、山核桃、板栗、棗、桃、李、花椒等
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、安徽、河南。

2562. **Bizia aexaria** Walker 焦邊尺蛾 (Chao, 1982:250; Hun., 1992:883; Zhang, 1987[ed.] 1:183)
寄 主：桑樹。
分 佈：江西、湖南、西藏、陝西、華南、西南、華東、華中、華北、東北地區；朝鮮、日本、越南。

2563. **Calospilos syvata** Scopoli 榛金星尺蛾 (ASZI, 1987, 2:120)
寄 主：稠李、榛、榆、山毛櫸、樺樹。
分 佈：浙江、江蘇、內蒙古；朝鮮；日本、中亞、蘇聯、中歐。

2564. **Cerucina retractaria** Butler 擬桑尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:184)
寄 主：桑、柂。
分 佈：江西。

2565. **Chartographa fabiolaria** (Oberthür) 雲南松回紋尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:126; Hun., 1992: 839)
Euchera fabiolaria Oberthür, 1884:
=*Lygris koreaelygris* Bryk, 1949:
寄 主：雲南松。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、甘肅、北京；朝鮮。

2566. **Chartographa fabiolaria candida** Inoue (Heppner et Inoue, 1992:126)
Chartographa fabiolaria candida Inoue, 1989:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2567. **Chartographa ludovicaria praemutans** (Prout) 長陽葡萄回紋尺蛾 (Hun.,1992 :839)
寄 主：葡萄。
分 佈：雲南、四川、湖南、湖北、陝西。

2568. **Chihuo sunzao** Yang 酸棗尺蛾 (Chen et al., 1993:10; Zhang et Zhang, 1982:27-28)
寄 主：酸棗、大棗、蘋果、野酸棗。
分 佈：河南、山西、河北。

2569. **Chihuo zao** Yang 棗尺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:259-260; Chang et al., 1979:65-66; Chen et al., 1993:1; Chen et al., 1994, 20(5):45; Huang, 1990[ed.] 2:304-305; Liu, 1982[ed.]:372-373; NZWDi, 1981:1779; Xiao, 1992:900; Zhang et Miao, 1996(3):23; Zhang et al., 1996:45)
別 名：*棗步曲、棘尺蠖*。
寄 主：棗、蘋果、梨。
分 佈：浙江、安徽、陝西、山西、河南、山東、河北。
天 敵：姬蜂
Baryllypa sp. 棗尺蛾腫跗姬蜂(幼蟲)
Erontia laeta Meigen 家蠶追寄蠅(幼蟲)
Frontina laeta Meigen 棘尺蛾寄蠅(幼蟲)
(在用藥少的地方總寄生率可達 15-20 %)
雞、麻雀、灰喜鵲等

2570. **Cleora ciicharia** Scjoffer 落葉松雙肩尺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:266-267; Liu, 1982[ed.]:206-208)
寄 主：落葉松、稠李、山梅花、胡枝子、忍冬等 20 幾種植物。
分 佈：遼寧。

2571. **Cleora cinctaria** Schiffermüller 雙肩尺蛾 (ASZI, 1987, 2:122; Xiao, 1992:902)
寄 主：落葉松、鼠李、胡枝子、毛赤楊、核桃楸、山梅花、五味子、忍冬等。
分 佈：遼寧；日本、蘇聯、歐洲。
天 敵：蟲霉屬(幼蟲)
Habronyx sp. 姬蜂(蛹)
Darachosia sp. 姬蜂(蛹)
Eccoptosage sp. 姬蜂(蛹)
雜姬蜂族 (Joppini) 的一種姬蜂(蛹)

2572. **Cleora fraterna** Moore 樟枝尺蛾 (Chang & Hung, 1986:98; Heppner et Inoue, 1992:115; Tsai, 1965:121)
Chogada fraterna Moore, 1888:
=*Cleora alienaria* Butler, 1889: (*nec* Walker, 1860).
=*Cleora acaciaria* Hampson, 1895: part (*nec* Boisduval, 1833).
寄 主：柑橘類、樟樹。
分 佈：臺灣；印度。

2573. **Colotois pennaria ussuriensis** O. Bang-Haas 白點焦尺蛾 (ASZI, 1987, 2:118)
寄 主：蘋果、櫻、櫟、樺、山楂、柳。
分 佈：黑龍江；歐洲(中部)、蘇聯、北美。

2574. **Comibaena delicator** Warren 櫟綠尺蛾 (Luo et Jin, 1995:87)

寄 主：酪梨。

分 佈：海南。

2575. **Culcula panterinaria** (Bremer et Gruy) 木橑尺蛾 (ASZI, 1987, 2:119; Beijing FC., 1980[ed.]:254-255; Chang & Hung, 1986:99; Huang, 1990[ed.] 2:329-332; Hun., 1992:864; Li et al., 1996:30-31; Liu, 1982[ed.]:204-205; NZWDI, 1981:1766; Wang, 1987[ed.]:184-185; Xiao, 1992:903; Yunn., 1987:915; Zhang, 1987[ed.] 1:184)

别 名：*黃連木尺蛾*。

寄 主：桃、李、杏、蘋果、梨、櫻桃、山櫻桃、山楂、棗、柿、君遷子、桑、核桃、楊桃、木橑(黃連木)、酸棗、臭椿、泡桐、櫟、楸、槐、槭、榆、柞、柳、楝、皂莢、漆樹、白榆、山榆、楊、馬鞍、荊條、葛榛、山葡萄、疏洛柳、石荊、黃連木、合歡、紫葛、大葉藤、天竺、山花椒、花椒、大豆、棉花、向日葵、甘藍、蘿蔔、蕎麥、桔梗、萱草及灌木等 30 餘科 170 多種植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、雲南、四川、陝西、湖南、湖北、江西、浙江、安徽、山東、山西、河南、河北、北京、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、印度。

2576. **Culpinia diffusa** (Walker) 赤線尺蛾 (ASZI, 1987, 2:117; Heppner et Inoue, 1992:121; Hun., 1992:821)

Thalera diffusa Walker, 1861:

=*Thalera crenulata* Butler, 1879:

=*Thalera rufolimbaria* Hedemann, 1879:

寄 主：桑、白玉蘭、三葉草。

分 佈：臺灣、湖南、浙江、四川、陝西、華西、華北、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

2577. **Cystidia couaggaria** (Guenée) 小蜻蜓尺蛾 (ASZI, 1987, 2:123; Chao, 1982:250; Huang et Gao, 1996:252; Hun., 1992:862; Zhang, 1987[ed.] 1:185)

别 名：*梅枝尺蛾*。

寄 主：多種果樹，尤其薔薇科植物。6 月間先在稠李和蘋果上發生，然後遷到果園中的蘋果、李、梅、櫻桃、杏、梨、櫻桃等多種果樹上為害。

分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、貴州、浙江、湖北、華北、東北；朝鮮、日本、蘇聯東南部、印度北部。

2578. **Cystidia stratonice** (Stoll) 蜻蜓尺蛾 (ASZI, 1987, 2:124; Heppner et Inoue, 1992:114; Hun., 1992:862; Zhang, 1987[ed.] 1:185)

Phalaena stratonice Stoll, 1782:

=*Vithora agrionides* Butler, 1875:

=*Cystidia postmaculata* Wehrli, 1933:

寄 主：蘋果、梨、櫻桃、李、梅、杏、柳、楊、樺等。

分 佈：臺灣、江西、湖南、華中、華北、東北地區；朝鮮、日本、俄羅斯東南部。

2579. **Diplodesma ussuriaria** (Bremer) 烏蘇介青尺蛾 (ASZI, 1987, 2:117; Heppner et Inoue, 1992:121)

Jodes ussuriaria Bremer, 1864:

=*Hemithea eluta* Wileman, 1911;
寄 主：栗、櫟樹。
分 佈：四川、浙江、河北；朝鮮、日本、蘇聯。

2580. **Dysstroma cinereatum cinereatum** (Moore) 灰縧尺蛾 (Heppner et Inoue., 1992:127; Hun., 1992: 845)
Cidaria cinereatum Moore, 1868;
寄 主：懸鉤子。
分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、雲南；緬甸、印度、錫金、不丹。

2581. **Ectropis grisescens** Warren 茶尺蛾 (Luo et Jin, 1995:87)
寄 主：酪梨。
分 佈：海南。

2582. **Ectropis obliqua** Prout 小茶尺蛾 (Chao, 1982:251; Hun., 1992:875; Yin et al., 1995, 21(1):16-18)
寄 主：落葉松、茶、油茶、楊、柳、赤楊、櫟等多種樹木。
分 佈：福建、湖南、浙江；日本。

2583. **Ectropis rhurmitra** Walker 柑橘尺蛾 (Chang & Hung, 1986:100; Tsai, 1965:122)
別 名：*柑橘尺蠖蛾*。
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣；印尼、安達曼群島、印度、斯里蘭卡。

2584. **Ephoria arenosa** (Butler) 胡桃尺蛾 (ASZI,1987, 2:123)
寄 主：胡桃楸。
分 佈：吉林；朝鮮、日本、蘇聯。

2585. **Erannis ankeraria** Staudinger 落葉松尺蛾 (ASZI, 1987, 2:124; Xiao, 1992:906)
寄 主：落葉松。
分 佈：陝西、河北、內蒙古；匈牙利。

2586. **Erannis dira** Butler 栓皮櫟尺蛾 (ASZI, 1987, 2:124; Xiao, 1992:907)
寄 主：栗、栓皮櫟、櫟樹。
分 佈：陝西；日本、蘇聯、歐洲、敘利亞。

2587. **Euctenuropteryx nigrociliaria** Leech 點尾尺蛾 (Zhou, 1986:212-214)
別 名：*粗榧尺蛾*。
寄 主：粗榧、帶狀粗榧、三尖杉。
分 佈：江西、安徽、華西、東北。

2588. **Extropis excellens** Butler 刺槐外斑尺蛾 (Xiao, 1992:909; Zhang, 1987[ed.] 1:195)
寄 主：蘋果、梨、栗、茶、刺槐、榆、楊、柳、櫟、棉花、花生、綠豆、苜蓿。
分 佈：江西、河南、北京、東北；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Apanteles* sp. 絨繭蜂(1-2 齡幼蟲體,內寄生率達 30 % 以上)

2589. **Euctenurapteryx nigrociliaria** Leech 點尾尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:185)
寄 主：粗榧、三尖杉
分 佈：江西。

2590. **Gandaritis fixsemi** (Bremer) 亞枯葉尺蛾 (ASZI, 1987, 2:118)
寄 主：葡萄、楊桃。
分 佈：陜西；朝鮮、日本、蘇聯。

2591. **Gelasma grandificaria** (Graeser) 續尖尾尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:121; Hun., 1992:820, Zhang, 1987[ed.] 1:176)
Nemoria grandificaria Graeser, 1890:
=*Thalera colataria* Leech, 1897:
別 名：*青灰尺蛾、尖尾尺蛾*。
寄 主：櫻桃、胡桃、女貞。
分 佈：臺灣、江西、四川、湖南、浙江；朝鮮、日本、俄羅斯東南部。

2592. **Gelasma illiturata** (Walker) 尖尾尺蛾 (ASZI, 1987, 2:116; Heppner et Inoue, 1992:121; Hun., 1992:820)
Thalassodes illiturata Walker, 1862:
=*Hemithea sasakii* Matsumura, 1917:
寄 主：櫻桃、桃、冬青。
分 佈：臺灣、福建、湖南、江蘇、上海；朝鮮、日本。

2593. **Gelasma protrusa** (Butler) 綠尖尾尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:121; Hun., 1992:820)
Thalera protrusa Butler, 1878:
寄 主：栗、櫟。
分 佈：福建、湖南、華西地區；朝鮮、日本、俄羅斯東南部。

2594. **Hemerophila atrilineata** Butler 桑尺蛾 (Liu, 1995:38; NZWDI, 1981:1090; Tao, 1980:235; Tsai, 1965:122)
別 名：*桑枝尺蛾*。
寄 主：桑(葉)。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、印度。
天 敵：種類很多。*Aleiodes japonicus* (Ashmead) 桑尺蠖脊繭蜂(幼蟲)
Apanteles sp. 桑尺蛾絨繭蜂
Rhogas japonicus Ashmead 桑尺蛾脊腹繭蜂
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Telenomus sp. 桑尺蛾黑卵蜂

2595. **Hemerophila subplagiata** Walker 柑橘尺蛾 (Tsai, 1965:122; Zhang, 1987[ed.] 1:186)
別 名：*柑橘細枝尺蛾*。
寄 主：柑橘(葉)。
分 佈：臺灣、江西；日本、印度。

2596. **Hemithea aestivaria** (Hübner) 紅顏銹腰青尺蛾 (ASZI, 1987, 2:117)
寄 主：山楂、櫟樹、柳樹。
分 佈：江蘇、黑龍江；朝鮮、日本、西班牙。

2597. **Hemithea marina** Butler 青顏銹腰青尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:176)
寄 主：李、柳、槐、櫟。
分 佈：江西。

2598. **Hemithea tritomaria** Walker 銹腰青尺蛾 (ASZI, 1987, 2:117; Heppner et Inoue, 1992:121)
Thalassodes tritonaria Walker, 1863:
=*Hemithea vivida* Inoue, 1961:
寄 主：無花果樹。
分 佈：浙江、香港、華南；日本、印尼、印度、斯里蘭卡。

2599. **Hypomecis punctinalis conferenda** (Butler) 塵尺蛾 (Hun., 1992:871)
寄 主：板栗、櫟、薔薇、櫪、樟、楊。
分 佈：福建、湖南、廣西、四川、貴州、安徽、湖北、華南、東北地區、朝鮮、日本、俄羅斯。

2600. **Hyposidra talaca** Walker 柑橘小枝尺蛾 (Chang & Hung, 1986:100; Chao, 1982:251; Chen, 1981:44; Tsai, 1965:122)
Hyposidra talaca Walker, 1860:
別 名：*柑橘小枝尺蠖蛾、柑褐尺蠖*。
寄 主：柑橘類、蓮霧、茶、蓖麻、亞麻、甘薯、蘿蔔、結球白菜。
分 佈：臺灣、福建；菲律賓、波羅洲、西里伯、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、安達曼。

2601. **Inurois fletcheri** Inoue 栓皮櫟波尺蛾 (ASZI, 1987, 2:116; Xiao, 1992:911)
寄 主：梨、梅、桃、杏、林禽、栓皮櫟、櫟、櫸等 23 科 43 種。
分 佈：陝西；日本。

2602. **Jodis argutaria** Walker 藕色突尾尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:177)
寄 主：草莓屬。
分 佈：江西。

2603. **Junkowskia athleta** Oberthür 茶雲紋枝尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:187)
寄 主：海棠、山櫻桃、茶、油茶、栫、槭。
分 佈：江西。

2604. **Larerannia filipjevi** Wehrli 栓皮櫟波尺蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:264-266; Wang, 1987[ed.]:335-336)
別 名：*三帶櫟尺蠖*。
寄 主：蘋果、杏、核桃、柿、桑、棗、栓皮櫟、槲櫟、橿櫟、遼東櫟、刺槐、毛白楊、鵝耳櫪、山楊、黃連木、榆、側柏、檜柏、柳、枸杞、竹等.。
分 佈：陝西。

2605. **Luxiaria contigaria** Walker 康地尺蛾 (Chang & Hung, 1986:100; Tsai, 1965:122)
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本。

2606. **Lygris ludovicaria** Oberthür 葡萄回紋尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:182)

寄 主：葡萄。

分 佈：江西。

2607. **Meichihuo citiuai** Yang 刺槐眉尺蛾 (NZWDI, 1981:1704; Xiao, 1992:914)

寄 主：銀杏、蘋果、梨、桃、杏、梅、棗、栗、核桃、刺槐、香椿、臭椿、黃櫨、漆樹、杜仲、苦楝、皂莢、白蠟樹、櫟、槲、楸、楊、玉米、小麥、高粱、油菜等。

分 佈：陝西。

天 敵：*Calosoma maximovicze* Mcr. 黑廣肩步甲

黑腹脛步甲

青腹脛步甲

中華曲脛步甲

齊步甲

通緣步甲

Reduviidae 食蟲椿科

Formicidae 蟻科

畫眉、杜鵑、樹麻雀、長尾藍雀、山麻雀

白僵菌(幼蟲,蛹)

Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)

Trichogramma sp. 赤眼蜂(卵)

舟形毛蟲黑卵蜂(卵)

黑卵蜂(卵,在林間平均寄生率爲 17.7 %)

幼蟲寄生蜂、寄生蠅

2608. **Menophra atrilineata** (Butler) 桑尺蛾 (Hua, 1992:884)

Menophra atrilinearia Butler, 1881: (*nec* B. S. Chang, 1990).

寄 主：桑、梨、蘋果。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、江蘇、山東、河南、陝西、山西、河北、北京；朝鮮、日本。

2609. **Menophra subplagiata** (Walker) 柑橘尺蛾 (Hua, 1992:884)

寄 主：柑橘。

分 佈：臺灣、海南、廣西、西藏、四川、湖南、浙江、湖北、上海；印度、克什米爾、不丹、尼泊爾。

2610. **Mesoleuca albicillata casta** Butler 草莓尺蛾 (ASZI, 1987, 2:121)

寄 主：草莓、懸鈎子、覆盆子及多種禾本科植物。

分 佈：內蒙古、黑龍江；日本；蘇聯；歐洲。

2611. **Metallolophia arenaria** Leech 豆紋尺蛾 (Yunn., 1987:916)

寄 主：果樹。

分 佈：雲南、廣西、江西、華西；緬甸。

2612. **Napocheima robiniae** Chu 刺槐尺蠖 (Chen et Wang, 1987:59-62; Chen et al., 1993:7)

寄　主：蘋果、梨、桃、杏、梅、棗、栗、核桃、銀杏等果樹；刺槐、香椿、臭椿、黃櫨、漆樹、杜仲、苦楝、皂莢、白蠟樹、櫟、槲、楸、楊等林木；玉米、小麥、高梁、豌豆、油菜等。
分　佈：河南、陝西。

2613. **Neohipparchus vallata** Butler 點尾綠尺蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:177)
寄　主：梅、栗、櫟。
分　佈：江西。

2614. **Ochrognesia difficta** (Walker) 枯斑翠尺蛾 (Chao, 1982:251; Hun., 1992:818)
別　名：*白斑綠尺蛾、柳葉尺蛾*。
寄　主：桃、樺、楊、柳、櫟。
分　佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、華中、華北、東北地區；朝鮮、日本。
天　敵：*Apenteles acherontiae* Cameron　骷髏天蛾絨繭蜂(幼蟲)

2615. **Odezia atrata** Linnaeus 白眉黑尺蛾 (ASZI, 1987, 2:115)
寄　主：蘋果、榆、旋花科植物。
分　佈：廣東、內蒙古、黑龍江；朝鮮；日本；意大利。

2616. **Oenaspila flavifuscata** Walker 黃褐尺蠖 (Luo, 1991:87)
寄　主：腰果(幼葉)。
分　佈：海南。

2617. **Ophthalmites albosignaria** (Bremer et Grey) 核桃四星尺蛾 (Hun., 1992:873; Yunn., 1987:916)
Boarmia albosignaria Bremer et Grey, 1853:
寄　主：核桃、柿、苦楝、黃連木、漆樹、榆、泡桐、臭椿、南酸棗、櫟類。
分　佈：湖南、雲南、四川、貴州、華北、東北地區。

2618. **Ophthalmides albosignaria juglaludaria** Obrethür 核桃星尺蛾 (ASZI, 2987, 2:118; Yunn., 1987:916; Zhang, 1987[ed.] 1:188)
寄　主：多食性，為害核桃最為嚴重、泡桐、槐、榆、柳。
分　佈：江西、雲南、河南、山東、山西、河北、北京；日本、蘇聯。

2619. **Ophthalmides lushanaria** Sato (Heppner et Inoue, 1992:115)
Ophthalmides lushanaria Sato, 1992:
=*Ophthalmides cordularia* B. S. Chang, 1990: (*nec* Swinhoe, 1893)
寄　主：
分　佈：臺灣。

2620. **Ophthalmodes irrorataria** (Bremer at Grey) 四星尺蛾 (ASZI, 1987, 2:118; Hun., 1992:872; Yunn., 1987:916; Zhang, 1987[ed.] 1:188)
寄　主：蘋果、柑橘、海棠、鼠李、桑、蔬菜。
分　佈：臺灣、福建、江西、雲南、四川、浙江、陝西、山東、華北、東北地區；朝鮮、日本、蘇聯。

2621. **Ourapteryx nigrociliaris** Leech 點尾尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:120; Hun., 1992:902)
Ourapteryx nigrociliaris Leech, 1891:
=*Euctenurapteryx(sic) nigrociliaria* Leech, 1897:
寄 主：粗榧、帶狀粗榧、三尖杉等。
分 佈：江西、湖南、四川、西藏、浙江、陝西、甘肅。

2622. **Ourapteryx nigrociliaris magnifica** Inoue (Heppner et Inoue, 1992:120)
Ourapteryx nigrociliaris magnifica Inoue, 1985:
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

2623. **Ourapteryx sambucaria** Linnaeus 接骨木尾尺蛾 (ASZI, 1987, 2:121; Yunn., 1987:917)
寄 主：李、莓、棱骨木、忍冬、柳、椴、榿木、烏荊子、常春藤、薔薇、櫟、櫨、勿忘草。
分 佈：雲南、四川、東北；日本、蒙古、蘇聯、伊朗、西歐。

2624. **Percnia albinigrata** Warren 擬柿星尺蛾 (Hun., 1992:864)
寄 主：柿、核桃。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、安徽、江蘇、河南；朝鮮、日本 。

2625. **Percnia giraffata** (Guenée) 柿星尺蛾 (ASZI, 1987, 2:119; Huang, 1990[ed.] 2:318-319; Hun., 1992:865; NZWDI, 1981:1793; Wang, 1987[ed.]:250-251; Xiao, 1992:919; Yunn., 1987:916; Zhang, 1987[ed.] 1:189; Zhao et al., 1997:190)
=*Percnia grandaria* C. et R. Felder,
寄 主：雜食性、柿、黑棗(君遷子)、核桃、桑、李、棒、杏、蘋果、梨、山楂、木橑、榆、楊、柳、酸棗、花椒、槐。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、安徽、湖北、河南、陝西、山西、河北；朝鮮、日本、蘇聯、越南、印尼、緬甸、印度。
天 敵：*Brachymeria fiskei* (Crawford) 費氏闊小蜂(蛹)

2626. **Phthonandria atrilineata** (Butler) 桑尺蛾 (ASZI, 1987, 2:123; Chang et Hung, 1986:101; Heppner et Inoue, 1992:117; Suzhou CS., 1985:197-199; Xiao, 1992:920; Zhang, 1987[ed.] 1:189; Zheng, 1982:197-199)
Hemerophila atrilineata Warren, 1881:
=*Hemerophila brunnearia* Herz, 1941:
=*Phthonandria emarioides* Wehrli, 1941:
=*Phyhonsnftis epistygna* Wehrli, 1941:
別 名：*桑枝尺蠖蛾*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、陝西、安徽、湖北、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本、印度。
天 敵：*Rhogas japonicus* Ashmead 桑尺蛾脊繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)

2627. **Phthonandria atrilineata cuneilinearia** (Wileman) (Heppner et Inoue, 1992:117)
Hemerophila cuneilinearia Wileman, 1911:
寄 主：

分 佈：臺灣。

2628. **Phthonosema invenustaria psathyra** (Wehrli) 天目槭煙尺蛾 (Hun., 1992:872)
寄 主：多食性，櫻桃、柳、榛、樟等，多種樹木。
分 佈：雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、山東、陝西、甘肅。

2629. **Phthonosema tendinosaria** (Bremer) 蘋煙尺蛾 (ASZI, 1987, 2:121; Yunn., 1987:916)
寄 主：蘋果、林檎、梨、栗、桑、青岡、楊、槭、杜鵑、大波斯菊等。
分 佈：雲南、四川、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本。

2630. **Pingasa ruginaria** Guenée 臺灣青尺蠖 (Chang & Hung, 1986:98; Heppner et Inoue, 1992:120; Tsai, 1965: 121)
Hypochroma ruginaria Guenée, 1857.
寄 主：荔枝、檬果。
分 佈：臺灣、華北；婆羅洲、印尼、印度、非洲西部。

2631. **Sauris marginepunctata** Warran 小翅粗鬚波尺蠖 (Chen, 1981:44)
寄 主：蓮霧。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓。

2632. **Scapoda subpunctaria** Herrich-Sole 銀尺蠖 (Zhao et al., 1997:190)
寄 主：棕。
分 佈：福建。

2633. **Selenia tetralunaria** (Hufnagel) 四月尺蛾 (ASZI, 1987, 2:123)
寄 主：山楂、櫻桃、蘋果、梨、李、櫟、柳、椴木、樗、樺、榛、烏荊子。
分 佈：臺灣、東北；日本、蘇聯、歐洲。

2634. **Serraca punctinalis conferenda** (Butler) 壘尺蛾 (ASZI,1987, 2:123)
寄 主：蘋果、栗、櫟、薔薇、櫃、鈎樟。
分 佈：四川、浙江；朝鮮、日本、蘇聯。

2635. **Somatina indicataria indicataria** (Walker) 忍冬尺蛾 (Hun., 1992:827)
寄 主：梨、忍冬、火力楠。
分 佈：江西、湖南、四川、湖北、陝西、上海、山東、河北。

2636. **Sucra jujuba** Chu 棗步曲 (ASZI, 1987, 2:124; Chen et Wang, 1987:210-211; Chu, 1979:74; Niu et Chen, 1998:30; Qiu, 1994, 11(1):59; Wang, 1987[ed.]:239-240; Yue, 1995(4):20)
Sucra jujuba Chu, 1979:74.
別 名：*棗尺蠖*。
寄 主：棗、蘋果、梨(嫩芽、嫩葉、花蕾)。
分 佈：浙江、安徽、陝西、山東、山西、北京、遼寧。
天 敵：*Barylypa* sp. 棗尺蠖軛姬蜂(蛹)
Erontina iaeta Meigen 家蠶追寄蠅
Frontina laeta Meigen 棗尺蠖寄蠅

2637. **Thalassodes aucta** Prout 樟青尺蛾 (Chang & Hung, 1986:98; Tsai, 1965:121)
別 名：*樟青尺蠖、樟翠尺蠖*。
寄 主：荔枝、茶、玉米、樟。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、印度。
天 敵：*Brachymeria lasus* (Walker) 廣闊小蜂(蛹)

2638. **Thalassodes quadraria** Geunée 樟翠尺蛾 (ASZI, 1987, 2:117; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Yunn., 1987:917)
寄 主：檬果、荔枝、茶、樟樹。
分 佈：臺灣、浙江、福建、廣東、廣西、雲南；日本；馬來西亞、印尼、泰國、印度。

2639. **Thalassodes vararia** Guenée 檬果青尺蠖 (Chang & Hung, 1986:98; Chen, 1981:44; Tsai, 1965:121)
寄 主：檬果、蓮霧。
分 佈：臺灣；印尼、印度、斯里蘭卡。

2640. **Thera variata** Denis et Schiffermüller 黃星尺蠖 (Zhao et al., 1997:190)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

2641. **Thinopteryx crocoptera** (Kollar) 黃蝶尺蛾 (ASZI, 1987, 2:121; Chang & Hung, 1986:101; Heppner et Inoue, 1992:116; Yunn., 1987:918)
Urapteryx crocoptera Kollar, 1844:
別 名：*黃蝶尺蠖*。
寄 主：葡萄、野葡萄。
分 佈：臺灣、廣東、雲南、四川；朝鮮、日本、馬來亞、印尼、印度。

2642. **Thinopteryx crocoptera erythrosticta** Wehrli 湖南黃蝶尺蛾 (Hun., 1992:899)
寄 主：葡萄。
分 佈：湖南。

2643. **Trigonoptila latimarginaria** (Leech) 三角尺蛾 (Heppner et Inoue, 1992:113; Hun., 1992:861; Xiao, 1992:924)
Krananda latimarginaria Leech, 1891:
寄 主：棗、樟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

2644. **Yala pyricola** Chu 梨步曲 (ASZI, 1987, 2:124; Chu, 1979:75)
Yala pyricola Chu, 1979:75.
寄 主：梨、蘋果、山楂、杜梨、海棠、杏、柳、楊。
分 佈：河南、山西、山東、河北、北京、遼寧。

2645. **Yinchie zaohui** Yang 棗級灰尺蠖 (Chen et al., 1993:5)
別 名：*棗小尺蠖*。
寄 主：棗。
分 佈：河南、河北。

2646. **Zamacra excavata** Dyar 桑褶翅尺蛾 (Chen et Wang, 1987:62-63; Chen et al., 1993:8; Xiao, 1992:925; Xue, 1994(3):22)

寄 主：蘋果、梨、桃、棗、海棠、貼梗海棠、核桃、桑、刺槐、毛白楊、槐樹、榆、欒、雪柳、元寶楓、白蠟、金銀木、太平花、丁香等。

分 佈：河南、陝西、寧夏、河南、河北、北京；朝鮮、日本。

2647. **Zethenia rufescentaria** Motschulsky 落葉松尺蛾 (ASZI, 1987, 2:125; Xiao, 1992:927)

寄 主：落葉松。

分 佈：黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

天 敵：寄生蜂一種(蛹)
寄生蠅一種(蛹)
鳥類
斑鳩(越冬蛹)

Thyatiridae (Cymotophoridae) 波紋蛾科

2648. **Thyatira batis** (Linnaeus) 波紋蛾 (ASZI, 1987, 2:176; Heppner et Inoue, 1992:151; Yunn., 1987:914; Zhang, 1987[ed.] 1:173)

Phalaena batis Linnaeus, 1758:

寄 主：草莓。

分 佈：江西、雲南、西藏、四川、江西、浙江、江蘇、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、印尼、緬甸、印度、歐洲。

2649. **Thyatira batis formosicola** Matsumura 臺灣波紋蛾 (Heppner et Inoue, 1992:151)

Thyatira batis formosicola Matsumura, 1933:

=*Thyatira wilemani* Werny, 1966:

寄 主：

分 佈：臺灣。

2650. **Thyatira rubrescers** Warny 紅波紋蛾 (Hun., 1992:760)

寄 主：草莓。

分 佈：雲南、四川、湖南。

Drepanidae 鉤蛾科

2651. **Agnidra scabiosa fixseni** (Butler) 櫟距鉤蛾 (Chu et al., 1988:89)

寄 主：栗(*Castanea mollissima*)、青岡樹、大齒蒙櫟、日本櫟。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東；朝鮮、日本。

2652. **Betalbara acuminata** (Leech) 網卑鉤蛾 (Hun., 1992:771)

=*Albara manleyi* Matsumura,

寄 主：核桃、櫟、化香樹。

分 佈：廣西、四川、貴州、湖南、江西、浙江、湖北、河北、黑龍江；朝鮮、日本。

2653. **Pseudalbara parvula** (Leech) 三線鉤蛾 (ASZI, 1987, 2:111; Hun., 1992:770; Wang, 1978:171-172;

Yunn., 1987: 922; Zhang, 1987[ed] 1-172)
Drepana parvula Leech, 1890:
別 名：*眼斑鈎蛾*、*核桃綠鈎蛾*。
寄 主：核桃、櫟樹、化香樹。
分 佈：江西、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、江西、浙江、陝西、河北、北京、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

Eupterotidae 帶蛾科

2654. **Eupterote chinensis** Leech 中華金帶蛾 (ASZI, 1987, 2:299; Xiao, 1992:987)
寄 主：桃、泡桐、鵝掌楸。
分 佈：雲南、四川、貴州、廣西、湖南。

2655. **Eupterote diffusa** Walker 紫斑黃帶蛾 (ASZI, 1987, 2:300)
寄 主：雲南松。
分 佈：廣東、廣西、雲南；斯里蘭卡。

2656. **Eupterote sapivora** Yang 烏桕金帶蛾 (Xiao, 1992:988)
寄 主：桃、李、烏桕、泡桐、香椿、楊、樟、油桐等。
分 佈：貴州。
天 敵：*Hierodula patellifera* Serville 廣腹螳螂(幼蟲)
Chrysopa palles (Rambur) 大草蛉
黑腹獵蝽
南方光獵蝽
黃寬顎步甲(幼蟲)
松毛蟲黑蟻(幼蟲)
大黑蟻(卵,幼蟲)
烏桕金帶蛾核型多角體病毒(幼蟲)
白僵菌(幼蟲,蛹)
小室盆蜂(幼蟲)
絨繭蜂(幼蟲)
Brachynerua sp. 大腿小蜂(幼蟲)
Anastatus sp. 平腹小蜂(幼蟲)
點綠跳小蜂(幼蟲)
茶毒蛾黑卵蜂(卵)

2657. **Palirisa cervina** (Moore) 圓柏帶蛾 (ASZI, 1987, 2:299; Heppner et Inoue, 1992:153)
Jana cervina Moore, 1866:
寄 主：薔薇科(棠梨刺)、柏科(圓柏、側柏)、桃金孃科(大葉桉、細葉桉等)、蝶形花科(苦刺花)、漆科(野漆)、忍冬科、馬錢科、桑科植物。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南。

2658. **Palirisa cervina formosana** Matsumura 臺灣帶蛾 (Heppner et Inoue, 1992:153)
Palirisa cervina formosana Matsumura, 1931:
寄 主：
分 佈：臺灣。

Bombycidae 蠶蛾科

2659. **Andraca gracilis** Butler 隱斑桑蠶 (Yunn.,1987:931)
寄 主：桑、茶。
分 佈：雲南、江西、福建。

2660. **Bombyx mandarina** (Moore) 桑野蠶 (Chang & Hung, 1986:102; Heppner et Inoue, 1992:153; Huang, 1985, 11(4):194-200; Hun., 1992:797; NZWDI, 1981:1104; Suzhou DS., 1985:200-202; Tao, 1980:237; Xia et al., 1995, 11(2):80-83; Xiao, 1992:984; Yang et Xia, 1994, 6(3):180-184; Zhang et Yang, 1994, 3:117; Zheng, 1982:200-202)
Theophila mandarina Moore, 1872:
=*Bombyx fuscata* Motschulsky,
別 名：*桑蠶、野蠶*。
寄 主：桑、构樹、欅。
分 佈：臺灣、江西、湖南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、河南、陝西、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本。
天 敵：*Halyomorpha picus* Fabricius 茶翅蝽
Coccygomimus aethiops (Curtis) 黃點黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla kuwanae Viereck 桑蟥聚瘤姬蜂
Pimpla luctuosa Smith 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲-蛹)
Apanteles sp. 野蠶絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣閥小蜂(蛹)
Ooencyrtus sp. 蟥卵跳小蜂
Tetrastichus agyari Rohwer 印嚙小蜂
Telenomus sp. 桑蟥黑卵蜂(卵)
野蠶黑卵蜂(卵,越冬世代平均寄生率爲 14.78 %,非越冬世代分別爲 36.17 % 和 60.76 %)
Tricholyga sorbillans Wiedmann 桑蟥寄蠅(幼蟲)
家蠶追寄蠅(幼蟲)

2661. **Bombyx mandarina formosana** Matsumura 臺灣野蠶 (Heppner et Inoue, 1992:153)
Theophila mandarina formosana Matsumura, 1927:
寄 主：桑、榕。
分 佈：臺灣。

2662. **Bombyx mori** Linnaeus 家蠶 (Zhang, 1987[ed.] 1:195)
寄 主：桑。
分 佈：全國各地（飼養）。

2663. **Mustilia gerontica** West 鉤翅赭蠶 (Heppner et Inoue, 1992:154; Yunn., 1987:931)
Mustilia gerontica West, 1932:
=*Mustilia sphingiformis* Matsumura, 1932:.
寄 主：桑、构樹。
分 佈：福建(三港)、雲南。

2664. **Oberthüria caeca** Oberthür 黃波花蠶蛾(Hun., 1992:798)

寄 主：桑、山茶、櫟樹。
分 佈：湖南、遼寧、吉林、黑龍江。

2665. **Ocinara brunnea** Wileman 褐斑白蠶蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:195)
寄 主：桑科。
分 佈：江西。

2666. **Rondotia menciana** Moore 桑螨 (Chao, 1982:248; Dai, 1984:123-124; Han., 1992:799; Suzhou CS., 1985:202-204; Tao, 1980:240; Xiao, 1992:986; Zhang, 1958:42-46, 30; Zhang, 1987[ed.] 1:195; Zheng, 1982:202-204)
別 名：*桑白蠶蛾、白蠶、松花蠶、洋白蠶、野蠶、桑蠶、白螨、小白蠶、螨蠶。*
寄 主：桑、柳、构樹、枸杞。
分 佈：江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧；朝鮮。
天 敵：*Botrytis bassian* Bals 白僵菌(幼蟲)
Epiurus menciana Uchida 白蠶瘤姬蜂(幼蟲)
Epiurus nankingensis Uchida 南京瘤姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 桑螨聚瘤姬蜂(幼蟲)
Iseropus (Gregopimola) kuwanae (Viereck) 桑螨聚瘤姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla punctata Fabricius 黑點黃瘤姬蜂(蛹)
Brachymeria lasus (Walker) 廣腿小蜂(蛹)
Ooencyrtus sp. 螨卵跳小蜂(卵)
Sympiesis sp. 釉小蜂
Ootetrastichsu sp. 大角嚙小蜂(幼蟲)
Tetrastichus ayyari Rohwer 黑角嚙小蜂(印度嚙小蜂)(蛹)
Tetrastichus sp. 卵角嚙小蜂(蛹)
Tetrastichus sp. 大角嚙小蜂(蛹)
Telenomus sp. 卵細蜂(卵)
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅(幼蟲)
Zenilla roseanae B. B. (幼蟲)
Halyomorpha picus Fabricius 茶翅蝽

2667. **Trilocha varians** (Walker) 榕蠶 (Chang & Hung, 1986:102; Heppner et Inoue, 1992:154; Hun., 1992:798; Tsai, 1965:123; Xiao, 1992:985)
Naprepa varians Walker, 1855:
=*Chazena velata* Walker, 1869:
=*Naprepa albicollis* Walker,
=*Naprepa cervina* Walker,
別 名：*無花果家蠶、灰白蠶蛾。*
寄 主：無花果、菠蘿蜜、正榕、黃葛榕、菩提榕、小葉榕、高山榕。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、湖南；菲律賓、婆羅洲、印尼、印度、斯里蘭卡。

Lasiocampidae 枯葉蛾科

2668. **Bhima idiota** Graeser 白楊毛蟲 (ASZI, 1987, 2:292; Xiao, 1992:936)

別 名：*白楊枯葉蛾*。
寄 主：蘋果、沙果、梨、文冠果、楊、白榆、柳、唐槭。
分 佈：陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。
天 敵：粗毛孔寄蠅(蛹)

2669. **Cosmotriche discitincta** Wileman 枯葉蛾 (Heppner et Inoue, 1992:154)
Cosmotriche discitincta Wileman, 1914:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2670. **Cosmotriche inexperta** (Leech) 松小毛蟲 (ASZI, 1987, 2:295; Xiao, 1992:938; Yuan et al., 1982; 453-457)
寄 主：黃山松、馬尾松、黑松、金錢松。
分 佈：福建、江西、浙江、安徽；朝鮮、日本。

2671. **Cosmotriche kunmingensis** Tsai et Hou 昆明小毛蛾 (ASZI, 1987, 2:297)
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

2672. **Cosmotriche lunigera** (Esper) 松小毛蛾 (ASZI, 1987, 2:295; Yunn., 1987:964)
寄 主：松、落葉松、紅皮杉、冷杉、雲杉。
分 佈：西藏、雲南、四川、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

2673. **Cosmotriche lunigera mongolica** Esper 蒙古小櫟毛蟲 (Xiao, 1992:939)
寄 主：落葉松、油松、雲杉、冷杉。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯。

2674. **Cosmotriche montona** (Daniel) 鐵灰小毛蟲 (ASZI, 1987, 2:296)
寄 主：華山松、油松、秦嶺冷杉。
分 佈：四川、湖北、陝西、甘肅。

2675. **Cosmotriche qinlingensis** Tsai & Hou 秦嶺小毛蟲 (ASZI, 1987, 2:296)
寄 主：華山松、秦嶺冷杉。
分 佈：陝西。

2676. **Cyclophragama jianchuanensis** Tsai & Hou 劍川雜毛蟲 (ASZI, 1987, 2:288)
寄 主：雲南松、櫟類。
分 佈：雲南、四川。

2677. **Cyclophragama undans** (Walker) 波紋雜毛蟲 (ASZI, 1987, 2:287; Hun., 1992:775; Yunn., 1987:959; Zhang, 1987[ed.] 1:192)
寄 主：華山松、雲南松、馬尾松、油松、櫟類、油茶、寮樹等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、陝西、江蘇等長江以南各省區；印度。

2678. **Cyclophragama undans fasciatella** Ménétries 黃斑波紋雜毛蟲 (ASZI, 1987, 2:288,

Xiao, 1992:941)

寄 主：山楂、蘋果、華山松、油松、醋柳、櫟類、楊、刺槐、連翹、沙棘、玉米、苜蓿、黨參等。

分 佈：陝西、甘肅、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

天 敵：*Hierodula patellifera Serville* 廣腹螳螂

Reduviidae 食蟲蝽科

Formicidae 蟻科

Vespidae 胡蜂科

Polistes (Megapostes) rothneyi grahami van der Vecht

日本土蜂

鳥類：灰喜鵲、大山雀、杜鵑、劃眉、小噪眉

核型多角體病毒

蘇雲金杆菌

松毛蟲黑胸姬蜂

松毛蟲黑點瘤姬蜂

小紅小繭蜂

Brachymeria sp.

平腹小蜂

赤眼蜂

黑卵蜂

Blepharipa tibialis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅

松毛蟲狹頰寄蠅

Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

Exorista civilis Rondani 傘裙追寄蠅

2679. **Cyclophragama xichangensis** (Tsai et Liu) 西昌雜毛蟲 (ASZI, 1987, 2:287; Xiao, 1992:943; Yunn., 1987:944, 955)

寄 主：雲南松、粗皮青杜、槲樹、槲櫟、四川楊桐、細葉雞冠草、委陵菜。

分 佈：雲南、四川、貴州、湖南。

天 敵：Mantidae 螳螂

Formicidae 蟻

Vespidae 胡蜂

杜鵑、白臉山雀、劃眉

真菌

芽孢杆菌

白僵菌

Ichneumonidae 姬蜂科

Braconidae 繭蜂科

Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂

Scelionidae 稜腹細蜂科

Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2680. **Dendrolimus angulata** Gaede 高山松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:284; Yunn., 1987:938, 941)

寄 主：雲南松、高山松、馬尾松。

分 佈：廣西、雲南、四川。

2681. **Dendrolimus arizanus** Wileman 阿里山松毛蟲 (Heppner et Inoue, 1992:154)

Metanastria arizanus Wileman, 1910:

=*Dendrolimus superans* B. S. Chang, 1989: (*nec* Butler, 1877).

寄 主：

分 佈：臺灣。

2682. **Dendrolimus armandi** Tsai & Hou 華山松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:285)

寄 主：華山松、油松。

分 佈：陝西。

2683. **Dendrolimus himalayanus** Tsai & Liu 喜馬拉雅松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:286)

寄 主：高山松。

分 佈：西藏。

2684. **Dendrolimus houi** Lajonquiére 雲南松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:280; Hun., 1992:774; Xiao, 1992:944; Yunn., 1987:938, 939)

寄 主：華山松、雲南松、高山松、思茅松、海南松、圓柏、側柏、柳杉、伏地松。

分 佈：雲南、四川、貴州、廣西、廣東、福建、浙江、湖南、湖北；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

天 敵：肉食性蠡蟹

Mantidae 螳螂科

杜鵑、烏鴉

松鼠

Coccygomimus laothoe (Cameron) 寮黑瘤姬蜂(幼蟲)

Apanteles aso Nixon 阿宗絨繭蜂(幼蟲)

Anastatus japonicus Ashmead 舞毒蛾平腹小蜂(卵)

Pseudanastatus albitarsis Ashmead 白跗平腹小蜂(卵)

Scelionidae 棱腹細蜂科

(寄生蜂的寄生率均在 20 % 左右)

Tachinidae 寄蠅科(幼蟲,蛹,在自然條件下其寄生率可高達 60 %)

2685. **Dendrolimus huashanensis** Hou 華山松毛蟲 (Hou, 1986:75)

Dendrolimus huashanensis Hou, 1986:75.

寄 主：華山松。

分 佈：陝西。

2686. **Dendrolimus kikuchii** Matsumura 思茅松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:281; Beijing FC., 1980[ed.]:233-235; Chang & Hung, 1986:101; Heppner et Inoue, 1992:154; Hun., 1992:773; Liu, 1982[ed.]:181-183; Xiao, 1992:946; Yunn.,1987:938, 940; Zhang, 1987[ed.] 1:192)

Dendrolimus kikuchii Matsumura, 1927:

=*Dendrolimus angulata* Gaede, 1932:123.

寄 主：華山松、思茅松、雲南松、黃山松、馬尾松、雲南油杉、海南五針松、黑松、金錢松、落葉松、雲南油杉。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、湖北、河南。

天 敵：黑枕黃鸝、四聲杜鵑、大山雀、白頭鵯
杆菌病毒
白僵菌
玫煙色擬青霉
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲鑲顎姬蜂(幼蟲)
黑胸姬蜂(幼蟲)
松毛蟲黑點瘤姬蜂(蛹)
花胸姬蜂(蛹)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Kriechbaumerella dendrolimi Sheng et Zhong 松毛蟲凸腿闊小蜂(蛹)
Ambllymerus tabatae (Ishii) 松毛蟲白角金小蜂(卵)
Mesocomys orientalis Ferriére 松毛蟲短角平腹小蜂(卵)
Pseudanastatus albitarsis Ashmead 白跗平腹小蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Telenomus dendrolimus Chu 松毛蟲黑卵蜂(卵)
(卵寄生蜂的寄生率可達 50 % 以上)
Blepharipa tibilis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅(蛹)
Exorista vicilis Rondani 傘裙追寄蠅(蛹)
(蛹寄生率達 49.3-68.6 %)

2687. **Dendrolimus kikuchii ochreus** Tsai et Liu 赭色松毛蟲 (Liu, 1982[ed.]:183)
寄 主：馬尾松、海南松。
分 佈：海南、江西、湖南、浙江、安徽。

2688. **Dendrolimus latipennis** Walker 雲南松毛蟲 (Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:204-205; Liu, 1982[ed.]:181; Tsai & Liu, 1962:247)
Lebeda latipennis Walker, 1855:1457.
別 名：*柳杉毛蟲*。
寄 主：雲南松、思茅松、柳杉、圓柏、側柏。
分 佈：福建、雲南、四川、貴州、浙江、湖北；印尼(巽他群島)、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2689. **Dendrolimus marmoratus** Tsai & Hou 黃山松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:283)
寄 主：黃山松。
分 佈：福建、浙江、安徽。

2690. **Dendrolimus monticola** Lajonquiére 雙波松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:285; Yunn., 1987:938, 942)
寄 主：高山松、雲南松。
分 佈：雲南、西藏。

2691. **Dendrolimus ningshanensis** Tsai & Hou 寧陝松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:283)
寄 主：華山松。
分 佈：陝西。

2692. **Dendrolimus punctata** (Walker) 馬尾松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:278; Beijing FC., 1980[ed.]:218-227; Chang & Hung, 1986:101; Chao, 1982:247; Chen, 1990[ed.]:1-401; Cheu, 1955:181-190; Du, 1987, 5(1,2):17-19;

Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:199-201; Heppner et Inoue, 1992:154; Hun., 1992:773; Liu, 1982[ed.]:178-180; Tsai, 1965:122; Xiao, 1992:948; Yi, 1990:151-152; Yie et al., 1966; 1-8; Yie et al., 1967:1-14; 1967:5-13; Zhang, 1987[ed.] 1:193)

Oeona punctatus Walker, 1858:1418.

=*Lasiocampa remota* Walker, 1858:1418.

Dendrolimus punctata, Kirby, 1892:813.

=*Dendrolimus punctata* ab. *baibarana* Matsumua, 1926:

=*Dendrolimus punctataab. hantozana* Matsumura, 1926:

=*Dendrolimus punctata* ab. *pallidiola* Matsumura, 1926:

=*Dendrolimus spectabilis* B. S. Chang, 1989: (*nec* Butler, 1877).

別 名：*臺灣松毛蟲，臺灣松枯葉蛾，松蚸斯，松毛蟲。*

寄 主：馬尾松、黑松、琉球松、濕地松、火炬松等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西，淮河流域以南至海南島、臺灣等 15 個省區；越南。

天 敵：(各蟲期的天敵種類有 300 種，其中寄生蜂 99 種，寄生蠅 36 種，捕食性昆蟲 58 種，鳥類 116 種，蜘蛛等，病毒 4 種，細菌及變種 5 種，真菌 5 種)(Wu et al., 1990:187-207)

Hierodula patellifera Serville 廣腹螳螂

Arma chinensis Fallou 蠋蝽

Cantheconidea concinna Walker 海南蝽(厲蝽)

Sycanus croceovittatus Dohrn 黃帶犀獵蝽

Cremastogaster artifex Mayr 圓梗舉腹蟻(蛹)

Iridomyrmex anceps (Roger) 扁平虹臭蟻(幼蟲)

Pheidole nodus Smith 寬結大頭蟻(幼蟲,卵)

Plagiolepis rothneyi Forel 羅思尼氏斜結蟻(幼蟲)

Polyrhachis dives Smith 黑螞蟻(松毛蟲黑螞蟻,雙齒多刺蟻)(幼蟲)

Polistes chinensis Fabricius 中華馬蜂(幼蟲)

Polistes olivaceus (De Geer) 亞非馬蜂(幼蟲)

Polistes (Megapostes) rothneyi grahami van der Vecht

Vespa ducalis Smith 黑尾胡蜂(幼蟲)

Vespa tropica haematodes Bequaert 小金箍胡蜂(幼蟲)

Brachypimpla (?) *latipetiolator* Uchida 細柄瘤姬蜂(幼蟲)

Casinaria dendrolimi Uchida 松毛蟲鑁姬蜂(幼蟲)

Casinaria nigripes Grevenhorst 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus carinifrons (Cameron) 脊額黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus laothoe (Cameron) 寮黑瘤姬蜂(天蛾黑瘤姬蜂)(幼蟲)

Coccygomimus luctuosus Smith 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus parnarae Viereck 稻苞蟲黑瘤姬蜂(幼蟲)

Dicamptus nigropictus (Matsumura) 黑斑瘦姬蜂(黑斑嵌翅姬蜂)(幼蟲)

Dictyonotus purpurascens (Smith) 紫窄痣姬蜂(幼蟲)

Dusona tenuis Förster 兩色瘦姬蜂(幼蟲)

Echthromorpha notulatoria Fabricius 松毛蟲惡姬蜂(幼蟲)

Enicospilus lineolatus (Roman) 細線細顎姬蜂(幼蟲)

Enicospilus pudibundae (Uchida) 蘋毒蛾細顎姬蜂(幼蟲)

Goryphus basilaris Holmgren 橫帶溝姬蜂(橫帶駝姬蜂)(幼蟲)

Gotra octocinctus (Ashmead) 花胸姬蜂(幼蟲,蛹)

Gregopimpla himalayensis (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂(幼蟲)
Habronyx heros (Wesmael) 松毛蟲軟姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲黑胸姬蜂(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimla*) *kuwanae* (Viereck) 桑蟥聚瘤姬蜂(幼蟲)
Itoplectis alternans spectabilis (Matsumura) 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Itoplectis nigribasalis Uchida 黑基瘤姬蜂(幼蟲)
Lissosculpa javanica Cameron 黃斑姬蜂(幼蟲)
Pimpla disparis Viereck 黑瘤姬蜂(幼蟲)
Pimpla formosana Cushman (幼蟲)
Scambus sp. 松毛蟲曲姬蜂(幼蟲)
Taiwanotheronia malhasenae Sonan (幼蟲)
Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)
Theronia zebra diluta Gupta 黑紋囊爪姬蜂(幼蟲)
Trathala matsumuraenus (Uchida) 松村離緣姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla iaponica Thunberg (幼蟲)
Xanthopimpla japonica Krieger 日本黑點姬(幼蟲)
Xanthopimpla pedator Fabricius 松毛蟲黑點瘤姬蜂(印黑點瘤姬蜂)(幼蟲)
Xanthopimpla punctata Fabricius 廣黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla stemmator Thunberg (幼蟲)
闊柄瘤姬蜂
Aleiodes dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂(紅頭繭蜂)(幼蟲)
Chelonorhogas rufithorax Enderlein 紅胸脊繭蜂(幼蟲)
Rogas dendrolimi (Matsumua) 松毛蟲脊繭蜂(紅頭小繭蜂)(幼蟲)
黃甲腹繭蜂(幼蟲)
Brachymeria donganensis Liao et Chen 東安闊小蜂(蛹)
Brachymeria fiskei Crawford 費氏闊小蜂(蛹)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Kriechaumerella dendrolimi Sheng 松毛蟲凸眼小蜂(蛹)
Kriechaumerella nigricornis Qian et He 黑頭洼頭小蜂(蛹)
Nipponohockeria ishii Habu 石井脊腹闊小蜂(卵)
Monodontomerus minor Ratzeburg 單齒突小蜂(蛹)
Monodontomerus dentipes (Boheman) 單齒突小蜂
Amblymerus tabatae (Ishii) 松毛蟲白角金小蜂(卵)
Dibrachys cavus Walker 黑青金小蜂
Pachyneuron nawai Ashmead 松毛蟲寬緣金小蜂
Ooencyrtus kuwanai (Howard) 大蛾卵跳小蜂(卵)
Anastatus disparis (Ruschka) 舞毒蛾卵平腹小蜂(卵)
Anastatus gastropachae Ashmead 短翅平腹小蜂(卵)
Anastatus japonicus Ashmead 舞毒蛾平腹小蜂(卵)
Anastatus ramakrishnai (Mani) 枯葉蛾平腹小蜂(卵)
Anastatus sp. 松毛蟲平腹小蜂(黃紋卵平腹小蜂)(卵)
Mesocmys oreintalis Ferrière 松毛蟲短角平腹小蜂(卵)

Pseudanastatus albitarsis (Ashmead) 白跗平腹小蜂(卵)
Tetrastichus sp. 松毛蟲嚙小蜂(卵)
Trichogramma chilonis Ishiii 螟黃赤眼蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲毛小蜂(卵)
Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *closterae* Wu et Chen 楊扇舟蛾黑卵蜂(卵)
Telenomus dasychiri Chen et Wu 松茸毒蛾黑卵蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *dendrolimi* Chu 松毛蟲棱腹細蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *lebedae* Chen et Tong 油茶枯葉蛾黑卵蜂(卵)
Boettcherisca peregrina (R.-D.) 棕尾別麻蠅
Burmanomyia (s. str.) *beesoni* (Senior-White) 松毛蟲緬麻蠅
Kramerea schuetzei (Kramer) 舞毒蛾克麻蠅
Parasarcophaga harpax (Pandelle) 貪食亞麻蠅
Blepharipa chaetoparafacialis Chao 毛鬢飾腹寄蠅
Blepharipa tibilis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅
Blepharipa zebina (Walker) 蠶飾腹寄蠅
Carcelia matsukarehae Shima 松毛蟲狭頰寄蠅
Drino inconspicua (Meigen) 平庸贅寄蠅
Exorista civilis Rondani 傘裙追寄蠅
Exorista fasciata Fallen 條紋追寄蠅
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅
Exorista xanthaspis (Wiedemann) 紅尾追寄蠅
Sturmia sp. 大寄蠅

2693. **Dendrolimus punctatus tehchangensis** Tsai et Liu 德昌松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:281; Xiao, 1992:953; Yunn., 1987:937, 943)
Dendrolimus punctatus tehchangensis Tsai et Liu, 1964:242.
寄 主：華山松、雲南松、馬尾松。
分 佈：雲南、四川。
天 敵：螳螂
鳥類：大山雀
白僵菌(幼蟲,蛹)
蟲霉真菌(幼蟲)
芽孢杆菌(幼蟲)
蟲花棒束孢(蛹)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲黑胸姬(幼蟲)
黑側溝姬蜂(幼蟲)
松毛蟲黑點瘤姬蜂(蛹)
花胸姬蜂(蛹)
黑瘤姬蜂(蛹)
毒蛾絨繭蜂(幼蟲)
松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Eupelmidae 旋小蜂科

平腹小蜂(卵)
白角金小蜂(卵)
赤金小蜂(蛹)
Trichogramma evanescens Westwood　廣赤眼蜂(卵)
松毛蟲黑卵蜂(卵)
毒蛾黑卵蜂(卵)
Blepharipa tibilis (Chao)　柞蠶飾腹寄蠅(蛹)
Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅(蛹)
Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅(蛹)
松毛蟲狹頰寄蠅(蛹)
(幼蟲寄生性天敵的寄生率可達 70 % 以上)

2694. **Dendrolimus punctata wenshanensis** Tsai et Liu 文山松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:282; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:205-206; Tsai et Liu, 1964:242; Xiao, 1992:955, Yunn., 1987:938, 943)
Dendrolimus punctatus wenshanensis Tsai et Liu, 1964:242.
寄 主：雲南松、思茅松。
分 佈：雲南、貴州。
天 敵：Mantidae　螳螂科
Reduviidae　獵蝽科
Formicidae　蟻科
鳥類：杜鵑、喜鵲、烏鴉
黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Gotra octocinctus (Ashmead)　花胸姬蜂(幼蟲)
松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
Chalcididae　闊小蜂科
佛氏闊小蜂(幼蟲)
Torymidae　突小蜂科
單齒腿長尾小蜂(幼蟲)
Eupelmidae　旋小蜂科
舞毒蛾卵平腹小蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura　松毛蟲赤眼蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *ledepdae* Chen et Tong　松毛蟲黑卵蜂(卵)
Blepharipa tibilis (Chao)　柞蠶飾腹寄蠅(幼蟲)
松毛蟲華南寄蠅(幼蟲)

2695. **Dendrolimus qinlingensis** Tsai & Hou 秦嶺松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:284)
寄 主：華山松。
分 佈：陝西。

2696. **Dendrolimus rex** Lajonquiére 麗江松毛蟲 (Yunn., 1987:937, 938)
寄 主：雲南松、高山松。
分 佈：雲南、四川。

2697. **Dendrolimus sericus** Lajonquiére 天目松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:286; Chao, 1982:247; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
寄 主：黃山松、馬尾松。

分 佈：福建、江西、浙江。

2698. **Dendrolimus sibiricus** Tschetwerikow 西伯利亞松毛蟲 (Tsai & Liu, 1962:241)
Dendrolimus sibiricus Tschetv., 1908:1.
寄 主：紅松(*Pinus koraiensis* Seib. & Zucc.)、興安落葉松(*Larix gmelini* (Rupr.) Litvin.)、黃花松(*Larix olgensis* var. *koreana* Nakai)、臭冷杉(白皮臭)(*Abies nephrolepis* Maxim.)、紅皮雲杉(紅皮臭)(*Picea koraiensis* Nakai)、長白魚鱗松(*Picea konarovii* V. Vassile)、樟子松(*Pinus sylvestria* var. *mongolica* Litvin.)等。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Casinaria nigripes* Gravenhorst 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲黑胸姬蜂(幼蟲)
Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg) 脊腿姬蜂(幼蟲)
Aleiodes dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
Compsilura concinnata (Meigen) 康刺腹寄蠅
Drino inconspicua (Meigen) 平庸贅寄蠅
Servillia ardens Zimin 火紅茸毛寄蠅

2699. **Dendrolimus spectabilis** Butler 赤松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:279; Beijing FC., 1980[ed.]:230-231; Jiang et Yu, 1994:110; Liu, 1982[ed.]:183185; Wen et al., 1993:25-26; Xiao, 1992:956)
Odonestis spectabilis Butsler,1877:481.
=*Oeona segregaata* Butler, 1877:482.
=*Dendrolimus spectabilis*, Kirby, 1892:814.
=*Debdrikunys segregatys* Grönb., 1911:172.
寄 主：赤松、油松、黑松、樟子松、雪松。
分 佈：江蘇、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本。
天 敵：*Hierodula patellifera* Serville 廣腹螳螂
Formica fufibarbis Emery 棕褐沙林蟻
Casinaria nigripes (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus aethiops (Curtis) 滿點黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Dicamptus nigropictus (Matsumura) 黑斑瘦姬蜂(幼蟲)
Gotra octocinctus (Ashmead) 花胸姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla himalayensis Cameron 喜聚瘤姬蜂(幼蟲)
Hybronyx heros (Wesmael) 松毛蟲軟姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲黑胸姬蜂(松毛蟲鑲顎姬)(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂
Itoplectis alternans spectabilis Matsumura 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Neteila (s. str.) *ocellaris* (Thomson) 甘藍夜蛾擬瘦姬蜂(幼蟲)
Aleiodes dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂
Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂
Telenomus dendrolimus Chu 松毛蟲黑卵蜂
Telenomus tetratomus Thomson 落葉松毛蟲黑卵蜂(卵)

Kramerea schuetzei (Kramer)　舞毒蛾克麻蠅
Parasarcophaga harpax (Pandelle)　貪食亞麻蠅
Blepharipa zebina (Walker)　蠶飾腹寄蠅
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy　尖音狹頰寄蠅
Carcelia matsukarehae Shima　松毛蟲狹頰寄蠅
Drino inconspicua (Meigen)　平庸贅寄蠅
Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅
Exorista japonica (Townsend)　日本追寄蠅

2700. **Dendrolimus suffuscus illustratus** Lajonquiére 明紋柏松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:283)
別 名：*纖杉毛蟲*。
寄 主：白皮松、油松、赤松、側柏。
分 佈：陝西、山東、山西、河北。
天 敵：*Hybronyx heros* (Wesmael)　松毛蟲軟姬蜂(幼蟲)

2701. **Dendrolimus superans** (Butler) 落葉松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:279; Beijing FC., 1980[ed.]:228-229; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:201-202; Liu, 1982[ed.]:186189; Tsai & Liu, 1962:243; Xiao, 1992:959; Zhang, 1986:129-130)
Odonestis superans Butler, 1877:181.
別 名：*纖杉毛蟲*。
寄 主：紅松、落葉松、魚鱗松、油松、黑松、樟子松、雲杉、冷杉。
分 佈：福建、浙江、江蘇、山東、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、蒙古。
天 敵：Mantidae　螳螂科
Pentatomidae　蝽科
紅足真蝽
Carabidae　步甲科
疆星步甲
Formicidae　蟻科
Vespidae　胡蜂科
鳥類：杜鵑、喜鵲、黑枕黃鸝、大山雀、紅尾伯勞、普通(巾鳥)、掠鳥
Casinaria nigripes (Gravenhorst)　黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Enicospilus gauldi Nikam　高氏細顎姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla himalayensis Cameron　喜聚瘤姬蜂(幼蟲)
Habronyx heros (Wesmael)　松毛蟲軟姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura)　松毛蟲鐮顎姬蜂(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron)　喜馬拉雅聚瘤姬蜂
Itoplectis alternans spectabilis (Matsumura)　松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
全北群瘤姬蜂(幼蟲)
粘蟲棘須姬蜂(幼蟲)
Aleiodes dendrolimi (Matsumura)　松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
枯葉蛾絨繭蜂(幼蟲)
Torymidae　窦小蜂科
單齒腿長尾蜂(幼蟲)
Ooencyrtus dendrolimus Chu　松毛蟲卵跳小蜂(卵)

Anastatus sp. 平腹小蜂(卵)
Gregopimota sp. 黃紋平腹小蜂(卵)
Ooencyrtus dendrolimus Chu 松毛蟲跳小蜂(卵)
松毛蟲寬緣金小蜂
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Telenomus tetratomus Thomson 落葉松毛蟲黑卵蜂(卵)
Sarcophagidae 麻蠅科
侶麻蠅
Parasarcophaga harpax (Pandelle) 貪食亞麻蠅
黑尾麻蠅
棕尾別麻蠅
Blepharipa zebina (Walker) 蠶飾腹寄蠅
Carcelia matsukarehae Shima 松毛蟲狹頰寄蠅
Compsilura concinnata (Meigen) 康刺腹寄蠅
Exorista civilis Rondani 傘裙追寄蠅

2702. **Dendrolimus tabulaeformis** Tsai et Liu 油松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:280; Beijing FC., 1980[ed.]:229-230; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:203-204; Li et Gia, 1989:410-417; Liu, 1982[ed.]:185-186; Xiao, 1992:961; Zhang, 1993:36-37)
Dendrolimus tabulaeformis Tsai & Liu, 1962:245.
寄 主：華山松、白皮松、油松、黑松、馬尾松、樟子松。
分 佈：四川、貴州、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧。
天 敵：蜘蛛
Tenodera sinensis (Saussure) 中華大刀螂
Chrysopidae 草蛉
Arma chinensis Fallou 蠋蝽
Formicidae 蟻
Polistes hebraeus Fabricius 亞非馬蜂
Polistes (*Megapostes*) *rhthneyi grahami* van der Vecht 陸馬蜂
鳥類：大山雀、灰喜鵲等
真菌(幼蟲,蛹)
Casinaria nigripes (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(蛹,個別林地寄生率高達 40 % 以上)
Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Dictyonotus purpurascens (Smith) 紫窄痣姬蜂(幼蟲)
Gotra octocinctus (Ashmead) 花胸姬蜂(幼蟲)
Gregopimpla himalayensis Cameron 喜聚瘤姬蜂(幼蟲)
Heteropelma amictum (Fabricius) 松毛蟲異足姬蜂(蛹)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲鑲顎姬(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(蛹)
Itoplectis alternans spectabilis (Matsumura) 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg) 脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla pedator Fabricius 松毛蟲黑點瘤姬蜂(幼蟲)
黑足凹眼姬蜂(幼蟲)

脊腿囊爪瘤蜂(蛹)
Apanteles ordinarius (Ratzeburg) 松毛蟲絨繭蜂(幼蟲)
Aleiodes dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
毒蛾絨繭蜂(越冬幼蟲,寄生率 10 % 以上,最高達 39.3 %)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Eupelmidae 旋小蜂科
平腹小蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Telenomus dasychiri Chen et Wu 松茸毒蛾黑卵蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *dendrolimusi* Chu 松毛蟲黑卵蜂(卵)
Telenomus tetratomus Thomson 落葉松毛蟲黑卵蜂(卵)
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅
Carcelis matsukarehae Shima 松毛蟲狹頰寄蠅(幼蟲)
Cuphocera varia (Fabricius) 粘蟲缺須寄蠅

2703. **Dendrolimus taipaiensis** Tsai & Hou 太白松毛蟲 (ASZI, 1987, 2:286)
寄 主：華山松、油松。
分 佈：陝西。

2704. **Dendrolimus taiwanus** (Matsumura) 花蓮枯葉蛾 (Heppner et Inoue, 1992:154)
Karenkonia taiwanus Matsumura, 1932:
=*Dendrolimus inouei* Lajonquière, 1978:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2705. **Dendrolimus undans excellens** Butler 櫟枯葉蛾 (Chang & Hung, 1986:101)
寄 主：臺灣蘋果、日本板栗、麻櫟、栓皮櫟。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、西伯利亞、印度。

2706. **Dendrolimus xichangensis** Tsai & Liu 西昌松毛蟲 (Tsai & Liu, 1962:248)
Dendrolimus xichangensis Tsai & Liu, 1962:248.
寄 主：雲南松。
分 佈：西昌。

2707. **Gastropacha pardalis formosana** (Tams) 臺灣枯葉蛾 (Heppner et Inoue, 1992:154)
Megasoma pardalis formosana Tam, 1935:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2708. **Gastropacha pardalis sinensis** Tams 橘枯葉蛾 (Hun., 1992:778; Ren et Zhang, 1994(4):27-28; Yunn.,1987:969; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
別 名：*橘毛蟲*。
寄 主：柑橘。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江。

2709. **Gastropacha philippinensis swanni** Tams 橘毛蟲 (ASZI, 1987, 2:294)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建、浙江、江西、廣東。

2710. **Gastropacha populi** Linnaeus 櫟楊小毛蟲 (ASZI, 1987, 2:297)
寄 主：果樹、櫟類、楊樺樹、山毛櫸、橙木。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

2711. **Gastropacha populifolia** Esper 楊枯葉蛾 (ASZI, 1987, 2:293; Hun., 1992:775; Xiao, 1992:970; Yunn., 1987:968; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
寄 主：蘋果、李、杏、梨、桃、櫻桃、白楊、柳、樟、櫟類、柏木等。
分 佈：江西、雲南、西南、華東、華北、西北、東北；蒙古、朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。
天 敵：*Austrophorocera hirsuta* (Mesnil) 毛瓣奧蜉寄蠅

2712. **Gastropacha quercifolia** Linnaeus 李枯葉蛾 (ASZI, 1987, 2:294; Chen et Wang, 1987:57; Hun., 1992:776, Luo et al., 1996:59; Yunn., 1987:968; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
寄 主：檬果、李、蘋果、沙果、梨、梅、桃、櫻桃、核桃、楊、柳、八角。
分 佈：江西、湖南、海南、雲南、中南、華東、華北、東北；蒙古、朝鮮、日本、蘇聯、歐洲
天 敵：*Kriechaumerella nigricornis* Qian et He 黑頭洼頭小蜂(蛹)
Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂(卵)
Telenomus tetratomus Thomson 落葉松毛蟲黑卵蜂(卵)

2713. **Gastropacha xenapates wilemani** B. S. Chang 威利枯葉蛾 (Heppner et Inoue, 1992:154)
Gastropacha xenapates wilemani B. S. Chang, 1989: (*nec* Tam, 1935).
寄 主：
分 佈：臺灣、華東。
天 敵：*Kriechaumerella nigricornis* Qian et He 黑頭洼頭小蜂(蛹)

2714. **Lebeda nobilis** Walker 松大毛蟲 (ASZI, 1987, 2:291; Beijing FC., 1980[ed.]:235-236; Chang & Hung, 1986:101; Chao, 1982:248; Heppner et Inoue., 1992:155; Hun., 1992:779; Liu, 1982[ed.]:321-322; Peng, 1959:336-341; Tsai, 1965:123; Xiao, 1992:972; Yunn., 1987:974; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
Lebeda nobilis Walker, 1855:
別 名：*楊梅枯葉蛾、茶枯葉蛾、油茶毛蟲、油茶枯葉蛾、大枯葉蛾*。
寄 主：番石榴、楊梅、華山松、板栗、抱栗、雲南松、思茅松、馬尾松、濕地松、側柏、油茶、槭、相思樹、苦櫧、錐栗、白櫟、麻櫟、紫藤、山毛櫸。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、浙江、安徽、湖北、江蘇、河南、陝西；印度、尼泊爾。
天 敵：油茶枯葉蛾核型多角體病毒(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Habronyx heros (Wesmael) 松毛蟲軟姬蜂(幼蟲)
Itoplectis naranyae 螟蛉瘤姬蜂(蛹)
Theronia zebra diluta Gupta 松毛蟲匙鬃瘤姬蜂(蛹)
Xanthopimpla konowi Krieger 樗黑點瘤姬蜂(蛹)

Xanthopimpla pedator Fabricius　松毛蟲黑點瘤姬蜂(蛹)
Kriechaumerella nigricornis Qian et He　黑頭洼頭小蜂
Agiommatus erionotus Huang　弄蝶偏眼金小蜂(卵)
Mesopolobus tabatae (Ishii)　松毛蟲白金小蜂(卵)
Pachyneuron nawai Ashmead　松毛蟲寬緣金小蜂
Anastatus gastropachae Ashmead　短翅平腹小蜂(卵)
Anastatus japonicus Ashmead　舞毒蛾平腹小蜂(卵)
Mesocomys orientalis Ferriere　松毛蟲短角小腹小蜂(卵)
Pseudanastatus albitarsis Ashmead　白跗平腹小蜂(卵)
蠍小蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura　松毛蟲赤眼蜂(卵)
Trichogramma lebedae Chen et Tong　油茶枯葉蛾黑卵蜂(卵)
Telenomus (*Aholcus*) *lededae* Chen et Tong　油茶枯葉蛾黑卵蜂(卵)
松毛蟲細麻蠅(蛹)

2715. **Lebeda nobilis sinina** Lajonquiére 油茶大毛蟲 (ASZI, 1987, 2:291)
寄 主：楊梅、松類、油茶、櫟類、化香、楊桐、酸棗。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南、廣西、四川、陝西、湖北、安徽。

2716. **Malacosoma dentata** Mell 棕色天幕毛蟲 (ASZI, 1987, 2:298; Hun., 1992:774; Xiao, 1992:973; Yunn., 1987:967; Zhang, 1987[ed.] 1:193)
寄 主：蘋果、梨、桃、杏、李、栗、桑、毛栗、柞、櫟類、楓香、榆。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、浙江。

2717. **Malacosoma insignis** Lajonquiére 高山天幕毛蟲 (Yunn., 1987:967)
寄 主：山楂、蘋果、山里紅等薔薇科植物。
分 佈：雲南、西藏、青海、四川、華中、華北、西北、東北；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

2718. **Malacosoma neustria formosana** Matsumura 寶島枯葉蛾 (Heppner et Inoue, 1992:155)
Malacosoma neustria formosana Matsumura, 1932:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2719. **Malacosoma neustria testacea** Motschulsky 黃褐天幕毛蟲 (Beijing FC., 1980[ed.]:236-237; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:245-246; Hou, 1980:308; Huang, 1990[ed.] 2:126-127; Hun., 1992:774; Li, 1994:29; Liu, 1982[ed.]:189-190; Sun, 1984:362; Sun, 1995:38; Wang, 1987[ed.]:271-272; Wang et al., 2000(2):22; Wu et al., 1998(4):25; Xiao, 1992:974; Zhao et al., 1998(4):28)
Mlacosoma neustria testacea Motschulsky, 1860:
別 名：*天幕毛蟲、梅毛蟲、天幕枯葉蛾*。
寄 主：梅、桃、李、杏、櫻桃、蘋果、梨、沙果、海棠、山楂、櫨梓、沙棗、核桃、桑、榛、楊、柳、樺、榆、櫟、槐、落葉松、黃波羅、殼斗科樹木等。
分 佈：全國各梨區，福建、江西、湖南、四川、湖北、陝西、青海、甘肅、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、西北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等各地區；朝鮮、日本、蘇聯。

天 敵：Virus　病毒
核型多角體病毒(NPV)(幼蟲)
Coccygomimus aethiops (Curtis)　滿點黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura)　松毛蟲鑲顎姬蜂(幼蟲)
Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg)　脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)
Apanteles gastropachae (Bouché)　天幕毛蟲絨繭蜂(幼蟲)
Ooencyrtus sp.　舟蛾卵跳小蜂(卵)
Telenomus terbraus (Ratzeberg)　天幕毛蟲黑卵蜂(卵)
卵寄生蜂有 2 種
Austrophorocera hirsuta (Mesnil)　毛瓣奧蜉寄蠅
Blepharipa tibilis (Chao)　柞蠶飾腹寄蠅
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy　尖音狹顆寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅
Exorista rossica Mesnil　毛蟲追寄蠅
Baumhaueira goniaeformis Meigen　天幕毛蟲抱寄蠅(幼蟲,寄生率 86.3-93.6 % 不等)
Phryxe vulgaris (Fallén)　普通怯寄蠅

2720. **Malacosoma parallela** Staudinger 山地天幕毛蟲 (Li, 1989:344-346)
寄 主：李、杏、沙果、蘋果、柳、沙棗、榆、刺梅、苜蓿等。
分 佈：新疆天山南北均有分布。

2721. **Metanastria hyrtaca** (Cramer) 大斑丫毛蟲 (Hun., 1992:779; Xiao, 1992:976)
Bombyx hyrtaca Cramer, 1779:
=*Bombyx lusca* Fabricius, 1787:
=*Bombyx laricis* Hübner, 1789:
=*Lebeda buddha* Lefebvre, 1827:
=*Bombyx brahma* Lefebvre, 1827:
=*Lebeda plagiata* Walker, 1855:
=*Lebeda repanda* Walker, 1855:
寄 主：橄欖樹、石梓樹。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南；菲律賓、印度、斯里蘭卡。

1722. **Metanastria terminalis** Tsai et Hou 橄欖枯葉蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:302-303; Huang et Gao, 1996:275)
寄 主：橄欖、雞尖樹
分 佈：福建、廣東、海南。

2723. **Odonestis pruni** (Linnaeus) 蘋毛蟲 (ASZI, 1987, 2:292; Chao, 1982:248; Cheng et Duan, 1992, 9(2):122; Heppner et Inoue, 1992:155; Huang, 1990[ed.] 2:59-60; Hun., 1992:779; NZWDI, 1981:1701; Yunn., 1987:973; Zhang, 1987[ed.] 1:194)
Phalaena pruni Linnaeus, 1758:
別 名：*蘋果枯葉蛾、蘋果大枯葉蛾、李枯葉蛾*。
寄 主：蘋果、李、梨、梅、櫻桃等薔薇科植物、樸。
分 佈：江西、湖南、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東、河北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

天 敵：*Ooencyrtus* sp. 舟蛾卵跳小蜂(卵)
Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂

2724. **Pachypasoides clarilimbata** (Lajonquière) 白緣雲毛蟲 (ASZI, 1987, 2:290)
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南、四川。

2725. **Pachypasoides yunnanensis** Lajonquière 雲南雲毛蟲 (ASZI, 1987, 2:290; Yunn., 1987:962)
寄 主：雲南松、高山松。
分 佈：雲南。

2726. **Paralebeda plagifera** Walker 櫟毛蟲 (ASZI, 1987, 2:292; Heppner et Inoue, 1992:155; Hun., 1992:779; Xiao, 1992:977; Yunn., 1987:975; Zhang, 1987[ed.] 1:194)
Lebeda plagifera Walker, 1855:
寄 主：銀杏、映山紅、紅松、馬尾松、雲南松、柳杉、白楊、櫟類、檫樹、楠木、柏木等。
分 佈：福建、江西、雲南、四川、浙江、安徽、山東、陝西、尼泊爾。
天 敵：核型多角體病毒(NPV)(幼蟲,死亡達 10-20 %)
寄生蠅(幼蟲,寄生率 5-10 %)

2727. **Paralebeda plagifera femorata** (Ménétries) 東北櫟毛蟲 (ASZI, 1987, 2:293)
寄 主：落葉松、櫟類、榛、楊。
分 佈：陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

2728. **Poecilocampa populi** Linnaeus 櫟楊小毛蟲 (ASZI, 1987, 2:297)
寄 主：果樹、櫟類、楊樺樹、山毛櫸、橙木。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

2729. **Suana concolor** Walker 大小枯葉蛾 (Luo et Jin, 1997:75)
寄 主：波蘿蜜。
分 佈：海南。

2730. **Suana divisa** (Moore) 桉樹大毛蟲 (ASZI, 1987, 2:293; Xiao, 1992:978; Yunn., 1987:976)
寄 主：菠蘿蜜、石榴、檬果、蘋果、梨、桉樹等。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南；東南亞、印度、斯里蘭卡。
天 敵：梳脛節腹寄蠅(幼蟲,寄生率高達 33-48 %)

2731. **Taragama repanda** Hübner 棕色枯葉蛾 (Yunn., 1987:976)
寄 主：思茅松。
分 佈：雲南。

2732. **Trabala vishnou** Lefebure 栗黃枯葉蛾 (ASZI, 1987, 2:291; Beijing FC., 1980[ed.]:237-238; Chang & Hung, 1986:102; Chao, 1982:248; Chen, 1981:43; Chen, 1996, 22(2):28; Chen et Wang, 1987:219-221; Heppner et Inoue, 1992:155; Hun., 1992:777; Tsai, 1965:123; Xiao, 1992:980; Yunn., 1987:978; Zhang, 1987[ed.] 1:194)
Gastropacha vishnou Lefebvre, 1827:
=*Amydona prasina* Walker, 1855:
=*Trabala vishnu* Moore, 1883: missp.

別 名：*櫟黃枯葉，綠黃枯葉蛾，蓖麻黃枯葉蛾，青枯葉蛾，楊梅老虎。*
寄 主：海南蒲桃、洋蒲桃、肖蒲桃、蓮霧、番石榴、柑橘、石榴、蘋果、海棠、核桃、板栗、楊梅、咖啡、毛栗、白櫟、櫟類、欖仁樹、八寶樹、桉樹、杉木、柳杉、市南漆、楓香、九芎、倒卵葉饅頭果、欖仁樹、奎寧、槭、相思樹、栓皮櫟、麻櫟、槲櫟、黃檀、白檀、楓香、木麻黃、野桐、薔薇類、蓖麻等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、湖北、浙江、安徽、江蘇、河南、陝西、山西、河北、甘肅；日本、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。
天 敵：核型多角體病毒(幼蟲,死亡率達 56.6 %,有時更高)
Enicospilus plicatus (Brulle) 褶皺細顎姬蜂(幼蟲)
黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
細顎姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla pedator Fabricius 松毛蟲黑點瘤姬蜂
Anastatus japonicus Ashmead 舞毒蛾平腹小蜂(卵)

2733. **Trabala vishnou gigantina** Yang 櫟黃枯葉蛾 (Xiao, 1992:981)
寄 主：核桃、胡頹子、蘋果、海棠、山荊子、銳齒櫟、栓皮櫟、槲櫟、遼東櫟、枹樹、沙棘、榛子、旱柳、月季、槭、山楊、水桐、榆等。
分 佈：陝西、甘肅、河南、山西、河北。
天 敵：Reduviidae 食蟲蝽科(食蟲率約 2 %)
白鶺鴒(捕食幼蟲約 4 %)
核型多角體病毒(幼蟲,自然感病率可達 18 %)
寄蠅(寄生率可達 24 %)

Endromididae 樺蛾科

2734. **Endromis versicolor** Linnaeus 樺蛾 (ASZI, 1987, 2:277)
寄 主：紅松、樺、榛、椴木、鵝耳櫪。
分 佈：黑龍江；歐洲。

2735. **Sinitinea pyrigalla** Yang 梨瘿華蛾 (Chao, 1982:234; Chen et Wang, 1987:135; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:119-120; Huang et Gao, 1996: 254; Li, 1994:36; Li et Jin, 1997(4):41-42; NZWDI, 1981:'732; Sun, 1995:39; Zhang, 1987[ed.] 1:137; Zhao et al., 1998(4):28)
別 名：*梨瘤蛾，梨枝瘿蛾。*
寄 主：梨枝(專食性)。
分 佈：福建、江西、陝西、山西、全國。
天 敵：*Scambus* sp. 梨瘿蛾曲姬蜂
Apanteles sp. 梨瘿蛾絨繭蜂

2736. **Sinitinea** sp. 梨梢華蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:120-121)
寄 主：梨(蛀枝梢)。
分 佈：江蘇、安徽、河南、陝西、山西、山東、河北、遼寧。

Brahmaeidae 龘紋蛾科

2737. **Brahmaea wallichii insulata** Inoue (Heppner et Inoue, 1992:155)
Brahmaea vallichii insulata Inoue, 1948:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2738. **Brahmophthalma wallichii** (Gray) 枯球籮紋蛾 (ASZI, 19872:276; Heppner et Inoue, 1992:155; Hun., 1992:804; Liang et Jiang, 1991:23; Xiao, 1992:1001; Yunn., 1987:936)
Bombyx wallichii Gray, 1831:
寄 主：黃菠蘿、橄欖、油橄欖、冬青、女貞、水蠟樹、鐵刀木、卵葉小蠟、桂花。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、四川、湖北；印度、尼泊爾。

Saturniidae 大蠶蛾科

2739. **Actias artemis artemis** Bremer et Grey 短尾大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:272)
寄 主：梨、櫻桃、栗、柳。
分 佈：吉林、黑龍江；蘇聯。

2740. **Actias dubernardi** Oberthür 長尾大蠶蛾 (Chao, 1982:249; Hun., 1992:800; Yunn., 1987:932; Zhang, 1987[ed.] 1:196)
寄 主：蘋果、梨、胡桃、楊、柳、樺、櫟。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、貴州、湖北。

2741. **Actias heterogyna** Mell 黃尾大蠶蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:196)
寄 主：栗、櫟。
分 佈：江西。

2742. **Actias mandschurica staudinger** Felder 紅斑大蠶蛾 (Wang, 1987[ed.]:326)
寄 主：
分 佈：東北；蘇聯。

2743. **Actias setene** Hübner 水青蛾 (Liu, 1982[ed.]:330-331)
別 名：*綠色天蠶蛾，大青蟲。*
寄 主：烏桕、楓楊、樟、楊、柳、蘋果、梨、核桃等
分 佈：中國各地幾乎都有發生。

2744. **Actias selene ningpoana** Felder 綠尾大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:271; Chao, 1982:249; Chen et Wang, 1987:56; Heppner et Inoue, 1992:156; Huang, 1990[ed.] 2:335-336; Huang et Gao, 1996:253; Hun., 1992:800; Xiao, 1992:990; Wang, 1987[ed.]:326-327; Yunn., 1987:932; Zhang, 1987[ed.] 1:196; Zhao et al., 1998(4):28)
Actias selene ningpoana C. Felder & R. Felder, 1862:
別 名：*燕尾水青蛾，大水青蛾。*
寄 主：胡桃、棗、蘋果、梨、沙果、櫻桃、沙棗、杏、枇杷、海棠、葡萄、板栗、楓楊、楊、柳、烏桕、木槿、樟、楷木。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、北京；日本、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Anastatus disparis* (Ruschka) 舞毒蛾平腹小蜂(卵)
Trichogramma sp. 赤眼蜂(卵,室內寄生率達 84-88 %)

2745. **Antheraea pernyi** (Guéring-Méneville) 柞蠶 (ASZI, 1987, 2:272; Beijing FC., 1980[ed.]:393-399; Heppner et Inoue, 1992:156; Hun., 1992:802; Xiao, 1992:992; Yunn., 1987: 934)

Bombyx pernyi Guéring-Méneville, 1855:
=*Antheraea mylitta* Walker, 1855:
=*Antheraea constans* Staudinger, 1892:
=*Antheraea roylei* Shiraki, 1913: (*nec* Moore, 1859).
=*Antheraea helferi* Shiraki, 1913: (*nec* Moore, 1859).

別 名：*槲蠶*。
寄 主：核桃、山楂、柞樹、麻櫟、遼東櫟、蒙古櫟、波羅櫟、銳齒櫟、栓皮櫟、樟樹、柏、檜堅、蒿柳、山荊子、樺樹、楓樹等。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、安徽、湖北、河南、山東、陝西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Xylodrepa sexcarinata* Motschulsky 六脊樹葬甲
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(幼蟲)
Kriechaumerela antheraeae Sheng et Zhong 柞蠶凸腿閣小蜂(蛹)
Kriechaumerella nigriconis Qian et He 黑頭洼頭小蜂(蛹)
Ooencyrtus sp. 大蛾卵跳小蜂(卵)
Anastatus sp. 黃紋卵平腹小蜂(卵)
Blepharipa tibialis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅
Blepharipa zebina (Walker) 蠶飾腹寄蠅
Carcelia gnava (Meigen) 格納狹頰寄蠅

2746. **Attacus atlas** (Linnaeus) 烏桕大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:271; Chao, 1982:248; Heppner et Inoue, 1992:156; Hun., 1992:799; Wang, 1987[ed.]:329-332)

Phalaena atlas Linnaeus, 1758:
=*Arcuata vitrea* Perry, 1811:

別 名：*桕蠶、大烏桕蠶、皇蛾*。
寄 主：蘋果、石榴、茶、烏桕、樟、柳、楓、桂皮、大葉合歡、小檗、甘薯、狗尾草、冬青、千金榆屬、重陽木、樺木、栓皮、楓楊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南；琉球、印尼、緬甸、印度。
天 敵：*Dicamptus nigropictus* (Matsumura) 黑斑嵌翅姬蜂(幼蟲)
Theronia zebradiluta Gupta 松毛蟲匙鬃瘤姬蜂
Xanthopimpla konowi Krieger 天蠶黑點瘤姬蜂
Xanthopimpla pedator Krieger 松毛蟲黑點瘤姬蜂

2747. **Attacus atlas formosanus** Villiard (Heppner et Inoue, 1992:156)

Attacus atlas formosanus Villiard, 1969:

寄 主：
分 佈：臺灣。

2748. **Caligula anna** Moore 黃目大蠶蛾 (Wang, 1987:163-165)

寄 主：核桃樹。
分 佈：西藏。

2749. **Caligula cachara** Moore 胡桃大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:273)
寄 主：胡桃科植物、楓楊。
分 佈：廣西、雲南；印度。

2750. **Caligula japonica** Moore 銀杏大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:274; Chang et Hung, 1986:102; Heppner et Inoue, 1992:156; Hun., 1992:800; Tsai, 1965:123; Xiao, 1992:996; Yu et Wang, 1984:144-145; Wei, 1989:347; Yunn., 1987:935; Zhang, 1987[ed.] 1:196)
Caligula japonica Moore, 1862:
別 名：*白果蠶、栗大蠶蛾、白毛蟲、漆毛蟲、核桃楸大蠶蛾*。
[Camphor silk moth, Japanese giant silk moth]
寄 主：銀杏、栗、胡桃、李梨、梅、蘋果、臺灣蘋果、山櫻桃、櫻花、柿、枹栗、槍栗、柳、樟、楸、榛、麻櫟、蒙古櫟、核桃楸、漆樹、朴、楓楊、楓、瑞木、野漆、鹽膚木、白楊、赤楊、柳、楓香、榆、麻櫟、薔薇、菊等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、浙江、江蘇、河南、陝西、華北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、阿穆爾、烏蘇里。
天 敵：鳥類(有 33 種)
大山雀、劃眉、白頭鵯、八哥、喜鵲、樹麻雀、暗綠繡眼最重要。
核型多角體病毒(蛹)
Ephialtes capulifera (Kriechbaumer)　黑基長尾姬蜂(幼蟲)
松毛蟲黑點瘤姬蜂(蛹)
Anastatus sp.　平腹小蜂(卵)
Pseudanastatus albitarsis Ashmead　白跗平腹小蜂(卵)
Trichogramma sp.　赤眼蜂(卵)
Telenomus sp.　黑卵蜂(卵)
Parasarcophaga harpax (Pandelle)　貪食亞麻蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅(幼蟲,寄生率達 15 %)

2751. **Caligula japonica arisana** (Shiraki) 阿里山大蠶蛾 (Heppner et Inoue, 1992:156)
Dictyoploca japonica arisana Shiraki, 1913:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2752 . **Caligula simla** Westwood 後目大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:274; Hun., 1992:803; Zhang, 1987[ed.] 1:196)
寄 主：梨、蘋果、核桃、柳。
分 佈：福建、江西、湖南；印度、巴基斯坦。

2753. **Cricula andrei** Jordan 點目大蠶蛾 (Yunn., 1987:935)
寄 主：蘋果、梨、沙果、桃。
分 佈：雲南、四川；爪哇。

2754. **Cricula trifenestrata** Helfer 小字大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:275; Hun., 1992:803; Xiao, 1992:995; Yunn., 1987:935)
寄 主：檬果、李、橄欖、檟如樹、藤香、漆樹。

分 佈：湖南、廣西、雲南；菲律賓、印度、斯里蘭卡。
天 敵：淡紅獵蝽
縱卷葉螟絨繭蜂
螟蛉黃繭蜂
次生大腿小蜂
松毛蟲短角平腹小蜂
柞蠶飾腹寄蠅

2755. **Eriogyna pyretorum** (Westwood) 樟蠶 (ASZI, 1987, 2:274; Beijing FC., 1980[ed.]:296-297; Chang & Hung, 1986:102; Heilongjiang Mudingjian FS., 1988[ed.]:268-269; Heppner et Inoue, 1992:156; Hun., 1992:802; Xiao, 1992:998; Zhang, 1987[ed.] 1:197)

Saturnia pyretorum Westwood, 1847:
別 名：*楓蠶、天蠶*。
寄 主：銀杏、番石榴、沙梨、板栗、核桃、枇杷、樟、楓香、楓楊、野薔薇、楠、柳、麻櫟、喜樹、冬青、野薔薇、烏桕、漆樹、槭等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、山東、河北、東北；蘇聯、越南、印度。
天 敵：白僵菌
Habronyx pyretorum Cameron 樟蠶姬蜂(幼蟲)
Theronia zebra diluta Gupta 黑紋黃瘤姬蜂(黑紋囊爪姬蜂,松毛蟲匙鬃瘤姬蜂)(幼蟲)
Xanthopimpla iaponica Krieger (幼蟲)
Xanthopimpla konowi Krieger 天蠶黑點瘤姬蜂(樗蠶黑點瘤姬蜂)(蛹)
Xnathopimpla pedator Fabricius 松毛蟲黑點瘤姬蜂(幼蟲)
松毛蟲匙鬃瘤姬蜂(幼蟲)
Kriechbaumerella longiscutellaris Qian et He 樟蠶凸腿閣小蜂(蛹)
Kriechaumerella nigricornis Qian et He 黑頭洼頭小蜂
Ooencyrtus (Schedius) kuwanae Howard (卵)
Anastatus albitarsis Ashmead (卵)
Trichogramma sp. 赤眼蜂(卵)
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅(幼蟲)

2756. **Eriogyna pyretorum pearsoni** Watson 秘松氏大蠶蛾 (Heppner et Inoue, 1992:156)

Eriogyna pyretorum pearsoni Watson, 1911:
寄 主：
分 佈：臺灣，華南。

2757. **Leopa oberthüri** Leech 豹大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:273; Hun.,1992:802; Yunn., 1987:935)

寄 主：柑橘及其他芸香科植物、曲水柳。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、陝西；越南、印度。

2758. **Neoris haraldi** Schawerda 弧目大蠶蛾 (ASZI, 1987, 2:274)

寄 主：蘋果、桃、黃連木、繡線菊屬植物。
分 佈：新疆。

2759. **Philosamia cynthia** Walker et Felder 樗蠶 (Hun., 1992:801; Liu, 1982[ed.]:331; Wang, 1987[ed.]:328-329; Xiao, 1992:1000; Zhang, 1987[ed.] 1:197)

別 名：*小柏蠶、烏桕樗蠶*。

寄 主：柑橘、核桃、烏桕、臭椿、冬青、懸鈴木、鹽膚木、含笑、梧桐、樟樹、楓楊、泡桐、刺槐、花椒、蓖麻等。

分 佈：廣東、廣西、四川、湖南、江西、浙江、江蘇、山東、河北、北京、東北地區；朝鮮、日本、美國、法國。

天 敵：*Coccygomimus aethiops* (Curtis) 滿點黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus laothoe (Cameron) 寮黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)

Iseropus (Gregopimola) himalayensis (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(幼蟲)

稻苞蟲黑瘤姬蜂(幼蟲)

Xanthopimpla konowi Krieger 樗蠶黑點瘤姬蜂(幼蟲)

Apanteles dictyoplocae Watanabe 樗蠶絨繭蜂(幼蟲)

Kriechaumerella nigricornis Qian et He 黑頭洼頭小蜂(蛹)

Pteromalus bifoveolatus Förster 天蠶金小蜂(蛹)

Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)

Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

Sphingidae 天蛾科

2760. **Acosmerycoides leucocraspis** (Hampson) 灰天蛾 (Heppner et Inoue, 1992:158; Hun., 1992:791)

Rhagastis leucocraspis Hampson, 1910:
=*Acosmerycoides insignata* Mell, 1922:
=*Ampelophaga horishana* Matsumura, 1927:
=*Ampelophaga takamukui* Matsumura, 1927:

寄 主：葡萄屬植物。

分 佈：臺灣、海南、廣東、福建、江西、湖南。

天 敵：*Drino hersei* Lian et Chao 天蛾贅寄蠅

2761. **Acosmeryx castanea** Rothschild et Jordan 缺角天蛾 (ASZI, 1987, 2:262; Heppner et Inoue, 1992:158; Hun., 1992:791; Wang, 1981:224-226; Yunn., 1987:995; Zhang, 1987[ed.] 1:202)

Acosmeryx castanea Rothschild & Jordan, 1903:
=*Acosmeryx kuangtungensis* Mell, 1922:

別 名：*鱗紋天蛾*。

寄 主：葡萄、烏斂莓、葛藤。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川；日本、印度。

2762. **Acosmeryx miskini** (Murray) 黃點缺角天蛾 (Yunn., 1987:995)

寄 主：葡萄、獼猴桃、葛藤。

分 佈：海南、雲南；巴布亞新幾內亞、澳洲。

2763. **Acosmeryx naga** (Moore) 葡萄缺角天蛾 (ASZI, 1987, 2:261; Heppner et Inoue, 1992:158; Hun., 1992:791; Yunn., 1987:995; Zhang, 1987[ed.] 1:202)

Philampelus naga Moore, 1857:
=*Acosmeryx shervilli* Boisduval, 1875:

=*Acosmeryx metanaga* Butler, 1879:
別 名：*鬚鱗紋天蛾*。
寄 主：葡萄、獼猴桃、烏蘞莓、爬山虎、葛藤、藤蘿。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、河南、北京；朝鮮、日本、印度。

2764. **Acosmeryx sericeus** (Walker) 赭絨缺角天蛾 (Yunn., 1987, 1001)
寄 主：葡萄、獼猴桃。
分 佈：雲南；菲律賓、印度。

2765. **Agrius convolvuli** (Linnaeus) 薯天蛾 (Chang, 1982:288; Chang & Hung, 1986:97; Heppner et Inoue, 1992:156; Hun., 1992:783; Zhang, 1987[ed.] 1:198)
Sphinx convolvuli Linnaeus, 1758:
=*Sphinx abadonna* Fabricius, 1798:
=*Herse patates* Ménétriés, 1857:
=*Sphinx roseofasciata* Koch, 1865:
=*Sphinx pseudocnvolvuli* Schaufuss, 1870:
=*Sphinx distans* Butler, 1874:
=*Protoparce orientalis* Butler, 1877:
=*Sphinx batatae* Christoph, 1884:
=*Agrius ichangensis* Tutt, 1904:
=*Herse peitaihoensis* Clark, 1922:
=*Herse marshallensis* Clark, 1922:
=*Herse aksuensis* Bang-Haas, 1927:
=*Herse extincta* Gehlen, 1928:
別 名：*蝦殼天蛾*。
寄 主：葡萄、旋花科(甘薯、蕹菜)、白菜、韭菜、茄科、豆科(綠豆)、芋。
分 佈：臺灣、江西、湖南、華北；朝鮮、日本、印尼、印度、新幾內亞、Bismarck Is. 大溪地、澳洲、新西蘭、非洲、歐洲、蘇聯。
天 敵：*Drino hersei* Liang et Chao 天蛾贅寄蠅

2766. **Ambulyx liturata** (Butler) 櫟鷹翅天蛾 (ASZI, 1987, 2:250; Hun., 1992:786; Yunn., 1987:990; Zhang, 1987[ed.] 1:201)
寄 主：核桃、栗、櫟樹。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、四川；菲律賓、印尼、蘇門答臘、緬甸、印度、錫金。

2767. **Ambulyx ochracea** (Butler) 鷹翅天蛾 (ASZI, 1987, 2:250; Chang & Hung, 1986:97; Hun., 1992:785; Liu, 1982[ed.]:222; Yunn., 1987:990)
Ambulyx ochracea Butler, 1885:
別 名：*細翅天蛾*。
寄 主：核桃科、槭科植物。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、四川、中南、浙江、江蘇、河北、遼寧；日本、緬甸、印度。

2768. **Ambulyx schauffelbergeri** (Bremer et Grey) 核桃鷹翅天蛾 (ASZI, 1987, 2:250; Hun., 1992:785; Yunn., 1987:990; Zhang, 1987[ed.] 1:201)
別 名：*紋細翅天蛾*。
寄 主：核桃、楓楊、櫟。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、東北；朝鮮、日本。

2769. **Ambulyx subucellata** (Felder) 橄欖鷹天蛾 (ASZI, 1987, 2:250)
寄 主：橄欖、烏欖。
分 佈：廣西、雲南；印尼、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

2770. **Ampelophaga rubiginosa** Bremer et Grey 葡萄天蛾 (ASZI, 1987, 2:261; Chen et Wang, 1987:181; Heppner et Inoue, 1992:158; Huang, 1990[ed.] 2:371-372; Hun., 1992:791; Lu, 1996(2):48-49; Wang, 1981:224-226; Wang et Ji, 1994:38-39; Yunn., 1987: 993; Zhang, 1987[ed.] 1:203)
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey, 1852:
寄 主：葡萄、野葡萄、黃荊、烏斂莓。
分 佈：江西、廣東、雲南、四川、陝西、寧夏、湖北、安徽、浙江、江蘇、山東、山西、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：*Dictyonotus purpurascens* (Smith) 紫窄痣姫蜂(幼蟲)

2771. **Amplypterus panopus** (Cramer) 檬果天蛾 (ASZI, 1987, 2:249; Hun., 1992:785; Yunn., 1987:999)
寄 主：檬果、漆樹科、藤黃科、紅厚殼等植物。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南；菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2772. **Angonyx testacea** (Walker) 絨綠天蛾 (Heppner et Inoue, 1992:158; Yunn., 1987:995)
Perigonia testacea Walker, 1856:
=*Panacra ella* Butler, 1875:
=*Panagra emus* Boisduval, 1875:
=*Angonyx emilia* Boisduval, 1875:
寄 主：獼猴桃、葛藤。
分 佈：福建、海南、雲南；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2773. **Callambulyx rubricusa** (Walker) 綠帶閉目天蛾 (Hun., 1992:789)
寄 主：蘋果、梅。
分 佈：江西、湖南、貴州；馬來西亞。

2774. **Callambulyx tatarinovi sichangensis** Chu et Wang 西昌榆綠天蛾 (Yunn., 1987:989)
寄 主：桃、柳、榆。
分 佈：雲南、四川(西昌)。
天 敵：*Trichogramma ivelae* Pang et Chen 毒蛾赤眼蜂(卵)

2775. **Cechenena lineosa** (Walker) 條背天蛾 (ASZI, 1987, 2:267; Hun., 1992:796; Yunn., 1987:996; Zhang, 1987[ed.] 1:204)
Chaerocampa lineosa Walker, 1856:
=*Chaerocampa major* Butler, 1875:
=*Cechenena minor* Nagano, 1904: (*nec* Butler, 1875).
寄 主：葡萄、烏斂莓、鳳仙花、何首烏。
分 佈：臺灣、江西、海南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州；日本、越南、馬來西亞、印尼、印度。

2776. **Cephonodes hylas** (Linnaeus) 咖啡透翅天蛾 (ASZI, 1987, 2:258; Chang & Hung, 1986:96; Chao, 1982：253; Heppner et Inoue, 1992:158; Hun., 1992:790; Meng, 1963:713-714; Tsai, 1965:120; Yan et al., 1988:98-100;

Yunn., 1987: 993, 1000)
Sphinx hylas Linnaeus, 1771:
=*Cephonodes hyles* Kishida, 1977: missp.
別 名：*咖啡天蛾，大透翅天蛾*。
寄 主：咖啡、茜草科、柴秘利、梔子花。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏。四川、浙江；日本、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲、西非、大西洋。

2777. **Clanis bilineata tsingtauica** Mell 豆天蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:293-294; Hun., 1992:786)
寄 主：油橄欖、刺槐、泡桐、黑荊樹。
分 佈：湖南及全國各省均有分布；朝鮮、日本、印度。
天 敵：*Exorista sorbillans* (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2778. **Clanis litura** Fabricius 桑天蛾 (Chang & Hung, 1986:96; Tsai, 1965:120)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

2779. **Compsogene panopus** (Cramer) 檬果天蛾 (Luo et Li, 1998:65; Luo et al., 1996:60; Zhang, 1987[ed.] 1:200)
寄 主：檬果、漆樹科。
分 佈：江西、廣東、海南、雲南。

2780. **Deilephila elpenor lewisi** (Butler) 利威氏天蛾 (Chang & Hung, 1986:97; Heppner et Inoue, 1992: 159)
Chaerocampa elpenor lewisi Butler, 1875:
寄 主：葡萄、胡枝子。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、歐洲、阿穆爾。

2781. **Hippotion celerio** (Linnaeus) 銀條斜線天蛾 (ASZI, 1987, 2:264; Heppner et Inoue, 1992:159; Hun., 1992:794; Yunn., 1987:1003)
Sphinx celerio Linnaeus, 1758:
=*Sphinx tisiphone* Linnaeus, 1758:
寄 主：葡萄屬植物、茜草科、酸模。
分 佈：臺灣、廣西、雲南、四川；日本、印度、亞洲、歐洲。

2782. **Hippotion raffesi** (Butler) 後紅斜線天蛾 (Yunn., 1987:996)
寄 主：葡萄屬植物。
分 佈：雲南、華南；馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

2783. **Hyles hippophaës** (Esper) 沙棗白眉天蛾 (ASZI, 1987, 2:263; Xiao, 1992:1004)
寄 主：沙棗、葡萄、楊、柳。
分 佈：西藏、陝西、寧夏、新疆、內蒙古；蘇聯、西班牙、法國、德國。

2784. **Hyles lineata livornica** (Esper) 八字白眉天蛾 (ASZI, 1987, 2:263; Chang & Hung, 1986:96; Heppner et Inoue, 1992:159; Hun., 1992:794; Yunn., 1987:998)
Sphinxlineata livornica Esper, 1779:
別 名：*黎紋白眉天蛾*。
寄 主：葡萄屬、棗、沙棗、豬殃屬、柳穿魚屬、金魚草屬、酸模屬及錦葵科

植物。
分 佈：臺灣、江西、廣西、雲南、西藏、陝西、寧夏、河北、黑龍江；日本、馬來亞、印度、斯里蘭卡、澳洲、非洲、歐洲、美洲。

2785. **Hyloicus califrinouii** Bremer et Grey 松天蛾 (Liu, 1982[ed.]:222)
寄 主：松樹。
分 佈：

2786. **Hyloicus morio heilongjiangensis** Zhao 黑龍江松天蛾 (Xiao, 1992:1007)
寄 主：樟子松、紅松、雲杉、冷杉等。
分 佈：黑龍江。

2787. **Macroglossum bombylans** (Boisduval) 青背長喙天蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:203)
寄 主：野木瓜、茜草。
分 佈：江西。

2788. **Marumba dyras** (Walker) 椴六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:252; Heppner et Inoue, 1992:157; Luo et al., 1996:60; Zhang, 1987[ed.] 1:200)
Smerinthus dyras Walker, 1856:
=*Triptogon ceylonica* Butler, 1875:
=*Triptogon fuscescens* Butler, 1875:
=*Triptogon massiroemsos* Butler, 1875:
=*Triptogon oriens* Butler, 1875:
=*Triptogon silhetensis* Butler, 1875:
=*Triptogon sinensis* Butler, 1875:
=*Marumba plana* Clark, 1923:
=*Marumba tonkinensis* Clark, 1936:
寄 主：檬果、櫜、栗、椴、櫟、枹。
分 佈：江西、海南、雲南、浙江、江蘇、河北、遼寧；越南、印度、斯里蘭卡。

2789. **Marumba gaschkewitschi** Bremer et Grey 桃天蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:184-185; Wang, 1987[ed.]:240-242)
寄 主：桃、棗、杏、李、櫻桃、枇杷等。
分 佈：全國大部分省(區)都有發生。
天 敵：*Apanteles pratopae* Ashmead 絨繭蜂
Eurytoma sp. 肩小蜂(ex *Apanteles pratopae*)
Bacterium sphingidis (White) 天蛾敗血症

2790. **Marumba gasehkewitschii carstanjeeni** (Staudinger) 蘋六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:254)
寄 主：梨、桃、蘋果、棗、葡萄。
分 佈：遼寧、黑龍江。

2791. **Marumba gaschkewitschii complacens** Walker 梨六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:254; Hun., 1992:788; Yunn., 1987:991)
寄 主：梨、桃、蘋果、杏、李、櫻桃、枇杷、葡萄、棗。
分 佈：雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、湖北、遼寧。

2792. **Marumba gaschkwitschii gaschkewitschii** (Bremer et Grey) 桃六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:254; Chen et Wang, 1987:181; Chen et al., 1993:23; Heppner et Inoue, 1992:157; Hun., 1992:787; Niu et Chen, 1999:31; Zhang, 1987[ed.] 1:200)

Smèrinthus gaschkewitschii Bremer et Grey, 1852:

別 名：*桃天蛾*。

寄 主：棗、桃、櫻桃、蘋果、梨、杏、榛、李、葡萄、海棠、枇杷。

分 佈：福建、江西、四川、陝西、湖北、河南、山西、山東、河北、內蒙古、遼寧。

天 敵：*Apanteles miyoshii* Watanabe 桃天蛾絨繭蜂(幼蟲)

2293. **Marumba jankowskii** (Oberthür) 菩提六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:253; Yunn., 1987:991)

寄 主：棗、菩提樹、椴樹、櫧樹。

分 佈：雲南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯。

2794. **Marumba saishiuana** Okamoto 枇杷六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:253; Heppner et Inoue, 1992:157; Hun., 1992:787; Yunn., 1987:991; Zhang, 1987[ed.] 1:200)

Marumba saishiuana Okamoto, 1924:

=*Marumba spectabilis* acut., part. (*nec* Butler, 1875).

寄 主：枇杷、櫟。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；朝鮮、印尼、印度、錫金。

2795. **Marumba sperchius** Ménétriés 栗六點天蛾 (ASZI, 1987, 2:252; Chang & Hung, 1986:97; Heppner et Inoue, 1992:157; Yunn.,1987:991; Zhang, 1987[ed.] 1:200)

Smerinthus sperchius Ménétriés, 1857:

=*Triptogon piceipennis* Butler, 1877:

=*Smerinthus michaelis* Oberthür, 1886:

別 名：*栗葉天蛾*。

寄 主：板栗、核桃、櫟、槲樹、櫧樹。

分 佈：臺灣、福建、雲南、浙江、江蘇、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、印度。

2796. **Nephele didyma** (Fabricius) 銀紋天蛾 (Yunn., 1987:1001)

寄 主：木瓜、榛皮。

分 佈：雲南、西藏；馬來西亞、爪哇、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2797. **Parum colligata** (Walker) 構月天蛾 (ASZI, 1987, 2:256; Chang & Hung, 1986:97; Heppner et Inoue, 1992:157; Hun., 1992:788; Yunn., 1987:991)

Daphnusa colligata Walker: 1856:

=*Metagastes bieti* Oberthür: 1886:

=*Parum saturata* Mell: 1922:

=*Parum tristis* Bryk, 1944:

別 名：*構天蛾*、*構星天蛾*。

寄 主：桑樹、構樹、櫧。

分 佈：臺灣、四川、廣東、湖南、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、緬甸、印度、斯里蘭卡、Myanmar。

天 敵：*Trichogramma closterae* Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂(卵)

2798. **Pergesa askoldensis** (Oberthr) 白環紅天蛾 (ASZI, 1987, 2:264)

寄 主：葡萄、山梅花、紫丁香、榛皮、榜皮、鼠李。
分 佈：寧夏、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2799. **Pergesa elpenor lewisi** (Butler) 紅天蛾 (ASZI,1987, 2:264; Yunn., 1987:998; Zhang, 1987[ed.] 1:204)
寄 主：葡萄、柳蘭、鳳仙花、千屈菜、蓬子菜、忍冬、月見草、柳葉菜、茜草。
分 佈：臺灣、江西、雲南、四川、山東、山西、河北、吉林；朝鮮、日本。

2800. **Phyllosphingia dissimilis dissimilis** Bremer 盾天蛾 (ASZI, 1987, 2:258; Chang & Hung, 1986:97; Heppner et Inoue, 1992:158; Hun., 1992:790)
Triptogon dissimilis Bremer, 1861:
別 名：*蝦夷天蛾*。
寄 主：核桃、山核桃、山櫻花、柳。
分 佈：臺灣、湖南、浙江、山東、河北、遼寧、黑龍江；日本、印度、阿穆爾。

2801. **Phyllosphingia dissimilis sinensis** Jordan 紫光盾天蛾 (Yunn., 1987:992; Zhang, 1987[ed.] 1:201)
寄 主：核桃、山核桃、榆、楸。
分 佈：江西、雲南、華南、山東、河北、黑龍江；日本、印度。

2802. **Psilogramma increta** (Walker) 丁香天蛾 (Heppner et Inoue, 1992:157; Hun., 1992:784)
Anceryx increta Walker, 1864:
=*Psilogramma menephron* auct., partum. (*nec* Cramer, 1780).
寄 主：龍眼、油橄欖、丁香、梧桐、女貞、梣樹、苦楝、懸鈴木。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南。

2803. **Psilogramma menephron** Cramer 霜天蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:295-296; Chao, 1982:253)
寄 主：油橄欖、泡桐、楸、梓、丁香、女貞、楝。
分 佈：福建、華南、華中、華東、華北。

2804. **Rhagastis lunata yunnanaria** Chu et Wang 滇白線天蛾 (Yunn., 1987:996)
寄 主：葡萄屬、鳳仙花屬植物。
分 佈：雲南。

2805. **Rhagastis mongoliana** (Butler) 蒙古白肩天蛾 (ASZI, 1987, 2:267; Heppner et Inoue, 1992:159; Hun., 1992:796; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
Pergesa mongoliana Butler, 1875:
=*Rhagastis varia* Matsumura, 1921: (*nec* Wileman, 1910).
=*Rhagastis palicosta* Mell, 1922:
=*Rhagastis sauteri* Mell, 1958:
=*Rhagastis centrosinaria* Chu et Wang, 1980:
寄 主：葡萄、烏歛莓、鳳仙花、伏牛花、小檗、繡球花、旋花科植物。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、華北、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2806. **Rhyncholaba acteus** (Cremer) 斜綠天蛾 (ASZI, 1987, 2:268; Yunn., 1987:997; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
寄 主：葡萄、天南星科、海芋、芋屬、魔芋屬、鴨跖草、秋海棠等植物。

分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖北；越南、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2807. **Sataspes tagalica colloris** Rotshchild et Jordaon 黃頸木蜂天蛾 (ASZI, 1987, 2:259; Yunn., 1987:993)
寄 主：葡萄、獼猴桃。
分 佈：廣東、廣西；緬甸、印度。

2808. **Sataspes tagalica tagalica** Boisduval 木蜂天蛾 (ASZI, 1987, 2:259; Hun., 1992:790)
寄 主：葡萄、五斂莓、野葡萄、爬山虎。
分 佈：浙江、湖南、廣東、雲南、四川；菲律賓、印度。

2809. **Sataspes tagalica thoracica** Rothschild et Jordan 黃胸木蜂天蛾 (Yunn., 1987:993)
寄 主：葡萄屬植物。
分 佈：廣東、雲南；印度。

2810. **Smerinthus planus planus** Walker 藍目天蛾 (ASZI, 1987, 2:257; Beijing FC., 1980[ed.]:294; Chao, 1982:254; Hun., 1992:290; Liu, 1982[ed.]:221-222; Xioa, 1992:1010; Yunn.,1987:990; Zhang, 1987[ed.] 1:201)
Smerinthus planus Walker, 1856:
別 名：*柳天蛾*。
寄 主：蘋果、梨、桃、梅、李、櫻桃、沙果、海棠、油橄欖、楡、歐美楊、美楊、毛白楊、鑽天楊、旱柳、河柳、龍爪柳。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、長江流域各省、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山西、山東、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、東北；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Eurytoma manilensis* Ashmead 天蛾廣小蜂(幼蟲)
Ooencyrtus sp. 大蛾卵跳小蜂(卵)
Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂

2811. **Sphecodina caudata** (Bremer et Grey) 葡萄晝天蛾 (ASZI, 1987, 2:259)
寄 主：葡萄、野葡萄、五斂莓、爬山虎。
分 佈：雲南、四川、山東、河北、東北。

2812. **Sphinx caligineus sinicus** Rothschild et Jordan 松黑天蛾 (ASZI, 1987, 2:246; Hun., 1992:782; Yunn., 1987:998; Zhang, 1987[ed.] 1:199)
寄 主：馬尾松、濕地松、火炬松、樺。
分 佈：江西、湖南、雲南、江蘇、河南、山東、河北、北京、黑龍江；日本、蘇聯。

2813. **Sphinx morio heilongjiangensis** Zhao 黑龍江松天蛾 (Xian, 1992:1007)
寄 主：紅松、樟子松、雲杉、冷杉等。
分 佈：黑龍江。

2814. **Theretra alecto** Linnaeus 下紅天蛾 (Chang, 1987:40; Wu, 1977:88-90)
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、中國大陸；琉球群島、越南、印度。

2815. **Theretra clotho clotho** (Drury) 斜紋天蛾 (ASZI, 1987, 2:265; Chang & Hung, 1986:98; Heppner et Inoue,1992:159; Hun., 1992:795; Yunn., 1987: 997; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
Sphinx clotho Drury, 1773:
=*Deilephila cyrene* Westwood, 1848:
=*Chaerocampa aspersata* Kirby, 1877:
別 名：*芋葉天蛾，縫摩天蛾*。
寄 主：葡萄科植物、木槿、白粉藤、青紫藤、山藥。
分 佈：臺灣、江西、湖南、華南、雲南、華中、浙江；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、安達曼群島、印度、斯里蘭卡。

2816. **Theretra japonica** (Orwa) 雀紋天蛾 (ASZI, 1987, 2:265; Chang & Hung, 1986:98; Chen et Wang, 1987:181; Heppner et Inoue, 1992:159; Hun., 1992:794; Wang, 1981:224-226; Yunn., 1987:998; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
Chaerocampa japonica Boisduval, 1869:
=*Theretra alticola* Mell, 1938:
寄 主：葡萄、野葡萄、常春藤、白粉藤、爬山虎、虎葛、虎耳草、繡球花、芋。
分 佈：臺灣、江西、南自廣東、廣西、雲南，東抵沿海各省，西到陝西、四川，北至黑龍江均有發生；朝鮮、日本、蘇聯。

2817. **Theretra latreillei latreillei** (MacLey) 土色斜紋天蛾 (ASZI, 1987, 2:266; Heppner et Inoue, 1992:159; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
Sphinx latreillei MacLey, 1827:
寄 主：葡萄屬、鳳仙花、秋海棠、傘羅夷、青紫葛。
分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、四川、澳洲。

2818. **Theretra oldenlandiae** (Fabricius) 芋雙線天蛾 (ASZI, 1987, 2:266; Chang & Hung, :98; Heppner et Inoue, 1992:159; Hun., 1992:795; Yunn., 1987: 998; Zhang, 1987[ed.] 1:205)
Sphinx oldenlandiae Fabricius, 1775:
=*Sphinx drancus* Cramer, 1777:
=*Chaerocampa puellus* Butler, 1875:
=*Deilephila proxima* Austaut, 1892:
=*Theretra olivascens* Mell, 1922:
別 名：*鳳仙花天蛾，芋葉灰褐天蛾，雙線雀天蛾*。
寄 主：芋、白薯、黃麻、葡萄屬、山核桃屬、水龍屬、鳳仙花、半夏、由跋等植物
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、安徽、山東、河南、河北、北京；朝鮮、日本、越南、印尼、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲、埃及。

2819. **Theretra pallicosta** (Walker) 赭斜紋天蛾 (Yunn., 1987:997)
寄 主：葡萄屬、傘羅夷屬。
分 佈：海南、雲南、福建、華南；緬甸、印度。

2820. **Theretra pinastrina pinastrina** (Martyn) 芋單線天蛾 (Yunn., 1987:998; Zhang, 1987[ed.] 1:206)
寄 主：山核桃屬、葡萄、芋屬、旋花科。
分 佈：臺灣、福建、江西、雲南；日本、越南、印尼、印度、斯里蘭卡、摩洛哥。

2821. **Theretra suffusa** (Walker) 白眉斜紋天蛾 (Heppner et Inoue, 1992:159; Yunn., 1987:997)
Chaericampa suffusa Walker, 1856:
寄 主：山核桃屬、野牡丹。
分 佈：臺灣、華南、廣東、雲南；越南、蘇門答臘、印度。

2822. **Theretra** sp. 醬色斜紋天蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:206)
寄 主：葡萄屬。
分 佈：江西。

Notodontidae 舟蛾科

2823. **Cerura menciana** Moore 楊二尾舟蛾 (Chao, 1982:270; Heppner, et Inoue, 1992:160)
Cerura menciana Moore, 1877:
寄 主：蘋果、楊、柳。
分 佈：福建。

2824. **Cerura menciana formosana** (Matsumura) (Heppner, et Inoue, 1992:160)
Dicranura menciana fomosana Matsumura, 1929:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2825. **Demeocracra subgeneris** Strand 山核桃舟蛾 (Liu, 1982[ed.]:376-377; Wang, 1987[ed.]:204-206)
寄 主：山核桃、化香樹葉。
分 佈：浙江(山核桃產區)、安徽。

2826. **Dudusa nobilis** Walker 著蕊尾舟蛾 (ASZI, 1987, 2:130; Heppner et Inoue, 1992:160; Hun., 1992:905)
Dudusa nobilis Walker, 1865:
=*Dudusa baibarana* Matsumura, 1929:
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、四川、湖北、浙江、河北；緬甸、印度。

2827. **Fenionia ocypete** (Bremer) 櫟紛舟蛾 (ASZI, 1987, 2:131; Hun., 1992:906; Xiao, 19921021; Yunn., 1987:1010; Zhang, 1987[ed.] 1:208)
別 名：*細翅天社蛾，旋風舟蛾*。
寄 主：蘋果、栗、蒙古櫟、遼東櫟、麻櫟、槲櫟、榛、樺等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、新加坡、印度。
天 敵：蜘蛛
三突花蛛、隆肩圓蛛(幼蟲)
Mantidae 螳螂科(幼蟲)
Carabidae 步甲科(幼蟲)
樹麻雀、夜鷹(成蟲)
細菌(蛹)
白僵菌(蛹)

細小六索線蟲(幼蟲)
粗壯六索線蟲(幼蟲)
瘤蜂(幼蟲)
Apanteles sp. 舟蛾絨繭蜂(幼蟲)
小蜂(幼蟲)
Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂(卵)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Telenomus sp. 黑卵蜂
(其中以赤眼蜂和絨繭蜂最為重要,寄生率分別為 30 % 和 10 %)

2828. **Hagapteryx kishidai** Nakamura 歧怪舟蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:208)
寄 主:胡桃。
分 佈:江西。

2829. **Harpyia umbrosa** (Staudinger) 櫟枝背舟蛾 (ASZI, 1987, 2:132; Hun., 1992:907; Yunn., 1987:1011)
別 名:*銀白天社蛾*。
寄 主:多種櫟和栗。
分 佈:雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、黑龍江;朝鮮、日本。

2830. **Hexafrenum leucodera** (Staudinger) 明白頸髏舟蛾 (Heppner et Inoue., 1992:163; Hun., 1992:918)
Notodonta leucodera Staudinger, 1887:
=*Allodonta yamamotoi* Nakamura, 1978:
別 名:*明白頸異齒舟蛾*。
寄 主:日本栗、櫟、枹樹。
分 佈:臺灣、湖南、青海、河北、遼寧、黑龍江;朝鮮、日本、印尼、印度。

2831. **Mesophalera sigmata** (Butler) 豎絨舟蛾 (Chao, 1982:270; Heppner, et Inoue, 1992:162)
Phalera sigmata Butler, 1877:
寄 主:梨、櫟。
分 佈:福建;日本。

2832. **Neopheosia fasciata** (Moore) 雪舟蛾 (ASZI, 1987, 2:132; Chang & Hung, 1986:91; Heppner et Inoue, 1992:162; Hun., 1992:907; Sen, 1993:50; Yunn., 1987:1010; Zhang, 1987[ed.] 1:210)
Pheosia fasciata Moore, 1888:
=*Neopheosia formosana* Okano, 1959:
寄 主:李屬(*Prunus* spp.)、墨點櫻桃(*Prunus phaeosticta*)、火刺木(*Pyracantha koidzumii*)、臺灣栲(*Castanopsis formosana*)等。
分 佈:臺灣、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、安徽、陝西、河北、黑龍江;日本、菲律賓、印尼、印度、錫金。

2833. **Neostauropus alternus** (Walker) 龍眼蟻舟蛾 (ASZI, 1987, 2:133; Chang & Hung, 1986:92; Chen, 1981:45; Chen et Wu, 1982:342-344; Heppner et Inoue, 1992:160; Sen, 1993:51; Tsai, 1965:117; Xiao, 1992:1033)
Stauropus alternus Walker, 1855:
=*Stauropus indicus* Moore, 1879:
別 名:*龍眼天社蛾*、*南投天社蛾*。

寄 主：檬果、刺番荔枝、柑橘、龍眼、荔枝、蓮霧、錫蘭橄欖、腰果、咖啡、薔薇、茶、茶花、爪哇決明、粉綠決明、臘腸樹、木麻黃、臺灣相思樹、刺葵、大頭茶等雜食性。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西；菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。
天 敵：蠍蛛
Mantidae 螳螂科
Formicidae 蟻科
鳥類
病菌
Xanthopimpla pedator Fabricius 松毛蟲黑點瘤姬蜂
Braconidae 繭蜂科(二種)
Apanteles taprobanae Cameron 龍眼舟蛾絨繭蜂(幼蟲)
Chalcididae 闊小蜂科(蛹)
Scelionidae 棱腹細蜂科(卵,二種)

2834. **Neostauropus lushanus** (Okano) 廬山蟻舟蛾 (Sen, 1993:54)
寄 主：錫蘭橄欖(*Elaeocarpus serratus*)。
分 佈：臺灣。

2835. **Netria viridescens** Walker 梭舟蛾 (ASZI, 1987, 2:131; Chang & Hang, 1986:92; Heppner et Inoue, 1992:160; Hun., 1992:905; Luo et Jin, 1997:72; Yunn., 1987:1009; Zhang, 1987[ed.] 1:210)
Netria viridescens Walker, 1855;
寄 主：人心果。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；越南、印尼、錫金、尼泊爾、斯里蘭卡。

2836. **Odontosina morosa** (Kiriakoff) 愚角齒舟蛾 (ASZI, 1987, 2:137; Yunn., 1987:1023)
寄 主：華山松。
分 佈：雲南。

2837. **Paranerice hoenei** Kiriakoff 仿白邊舟蛾 (ASZI, 1987, 2:134)
寄 主：桃、蘋果。
分 佈：山西、河北、遼寧。

2838. **Phalera assimilis** (Bremer et Grey) 櫟黃掌舟蛾 (Liu, 1982[ed.]:201; Xiao, 1992:1029; Zhang, 1987[ed.] 1:211)
寄 主：板栗、麻櫟、栓皮櫟、白櫟、錐栗、榆、楊。
分 佈：江西、湖南、四川、湖北、浙江、江蘇、陝西、河南、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞南部、德國。
天 敵：*Tenodera sinensis* (Saussure) 中華大刀螂
灰喜鵲、劃眉(成蟲,幼蟲)
多角體病毒(幼蟲)
Ichneumonidae 姬蜂科(蛹,寄生率達 20 %)
Mesopolobus tabatae (Ishii) 松毛蟲白角金小蜂(卵)
Pachyneuron nawai Ashmead 松毛蟲寬緣金小蜂
Pseudanastatus albitarsis (Ashmead) 白跗平腹小蜂(卵)

Trichogramma sp. 毛小蜂科(卵,寄生率有時高達 50 %)
Formicidae 蟻科(搬食卵粒,可達 60 %)
Blepharipa chaetoparafacialis Chao 毛鬢飾腹寄蠅

2839. **Phalera bucephala** (Linnaeus) 圓掌舟蛾 (ASZI, 1987, 2:129; Beijing FC., 1980[ed.]:287; Xiao, 1992:1930)
別 名：*圓黃掌舟蛾，銀色天社蛾*。
寄 主：梨、蘋果、櫻桃、胡桃、榆、柳、楊、榛、櫟、椿、榿木、槭、椴、花楸、山毛櫸。
分 佈：新疆、黑龍江；亞洲(東部)、西伯利亞(東南部)、歐洲、非洲(東北部)。

2840. **Phalera flavescens** (Bremer et Grey) 蘋掌舟蛾 (ASZI, 1987, 2:129; Chang & Hung, 1986:92; Chao, 1982:270; Chen et Wang, 1987:48-49; Heppner et Inoue, 1992:162; Hu, 1995(1):48-49; Huang, 1990[ed.] 2:60-62; Huang et Gao, 1996:228; Hua., 1992:910; Li et al., 1999(5):34-35; Liu, 1982:202; NZWDI, 1981:1695; Sun et Zhang, 1998(3):13; Sun et al., 1994:40-41; Tsai, 1965:117; Wang, 1987[ed.]:266-267; Wang et al., 1993:24; Yunn., 1987:1014; Zhang, 1987[ed.] 1:211; Zhao et al., 1998(4):28)
Pygaera flavescens Bremer & Grey, 1852:
=*Trisula andreas* Oberthür, 1880:
別 名：*舟形毛蟲，蘋果天社蛾，蘋黃天社蛾，黑紋天社蛾，枇杷天社蛾*。
寄 主：蘋果、梨、李、杏、桃、梅、櫻桃、山楂、榅桲、枇杷、海棠、沙果、板栗等果樹、柳、紫穗槐、槲、榆。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、除新疆、青海、寧夏、甘肅、西藏和貴州未記錄外，遍佈全國；朝鮮、日本、蘇聯(沿海地區)。
天 敵：*Tenodera sinensis* (Saussure) 中華大刀螂
Exorista civilis Rondani 傘裙追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2841. **Phalera fuscescens** Butler 榆掌舟蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:285-286; Chao, 1982:270; Hua., 1992:910; Liu, 1982[ed.]:200-201; Xiao, 1992:1031; Zhang, 1987[ed.] 1:211)
別 名：*榆黃斑舟蛾，黃掌舟蛾，舟形毛蟲*。
寄 主：梨、櫻桃、板栗、榆、麻櫟、白櫟。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、浙江、安徽、江蘇、陝西、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：*Pseudanastatus albitarsis* (Ashmead) 白跗平腹小蜂
Telenomus kolbei Mayr 舟形毛蟲黑卵蜂(卵)

2842. **Quadricalcarifera cyanea** (Leech) 青胯白舟蛾 (ASZI, 1987, 2:132; Chang & Hung, 1986:92; Heppner et Inoue, 1992:160; Zhang, 1987[ed.] 1:212)
Somera cyanea Leech, 1889:
別 名：*帶舟蛾*。
寄 主：山核桃。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、四川、浙江、湖北；日本、越南。

2843. **Rabtala cristata** (Butler) 黃二星舟蛾 (Heppner et Inoue, 1992:162; Xiao, 1992:1024)
Trabala cristata Butler, 1877:
寄 主：板栗、櫟類。
分 佈：浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、緬甸。

天 敵：步甲(幼蟲,蛹)
鳥類：燕子、麻雀、雞。

2844. **Stauropus alternus** Walker 龍眼蟻舟蛾 (Luo et Jin, 1997:72)
寄 主：人心果。
分 佈：海南。

2845. **Stauropus basalis** Moore 基徵舟蛾 (Chang & Hung, 1986:92; Heppner et Inoue, 1992:160; Zhang, 1987[ed.] 1:213)
Stauropus basalis Moore, 1877:
別 名：*茅莓蟻舟蛾*。
寄 主：懸鈎子、楓、紫藤。
分 佈：臺灣、江西、中國大陸；朝鮮、日本、阿穆爾。

2846. **Stauropus basalis usuguronis** Matsumura (Heppner et Inoue, 1992:160)
Stauropus basalis usuguronis Matsumura, 1934:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2847. **Stauropus persimilis** Butler 茅蟻舟蛾 (ASZI, 1987, 2:133)
寄 主：茅莓、千金榆。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、湖北、浙江、江蘇、安徽、山東、河北、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、越南。
天 敵：*Nemoraea sapporensis* Kocha 蘼毛瓣寄蠅

2848. **Tarsolepis sommeri** (Hübner) 劍心銀斑舟蛾 (Yunn., 1987:1017)
寄 主：海南韶子。
分 佈：臺灣、雲南；菲律賓、印尼、印度、錫金。

2849. **Uropyia meticulodina** (Oberthür) 核桃美舟蛾 (ASZI, 1987, 2:131; Chao, 1982:271; Heppner et Inoue, 1992:161; Hun., 1992:906; Liu, 1982[ed.]:202; Yunn., 1987:1011; Zhang, 1987[ed.] 1:214)
Notodonta meticulodina Oberthür, 1884:
別 名：*核桃天社蛾*、*核桃舟蛾*。
寄 主：核桃。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2850. **Wilemanus bidentatus bidentatus** (Wileman) 梨威舟蛾 (ASZI, 1987, 2:134; Hun., 1992:913; Yunn., 1987:1010; Zhang, 1987[ed.] 1:214)
別 名：*黑紋銀天社蛾*。
寄 主：梨、蘋果、杏。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、江蘇、陝西、河北、遼寧；日本。

2851. **Wilemanus bidentatus ussuriensis** (Püngeler) 亞梨威舟蛾 (ASZI, 1987, 2:134; Chao, 1982:271; Yunn., 1987:1011; Zhang, 1987[ed.] 1:214)
寄 主：梨、蘋果、李。

分 佈：福建、江西、雲南、四川、湖北、江蘇、安徽、山東、河北、黑龍江；朝鮮。

Lymantriidae 毒蛾科

2852. **Arctonis alba** Bremer 茶白毒蛾 (Zhang, 1985[ed.]:198-199)
寄 主：榛子、茶、油茶、柞樹。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽。

2853. **Arctornis gelasphora** Colllenette 絹白毒蛾 (Hun., 1992:1053)
寄 主：栗、櫟、榆、油桐。
分 佈：福建、湖南、湖北、廣西、雲南。

2854. **Arctornis l-nigrum** (Müller) 白毒蛾 (ASZI, 1987, 2:157; Heppner et Inoue, 1992:164; Hun., 1992:1052)
Phalaena l-nigrum Müller, 1764:
=*Arctornis l-nigrum okurai* Okano, 1959:
別 名：*黑毒蛾、彎紋白毒*。
寄 主：蘋果、山楂、山毛櫸、櫟、鵝耳櫪、苗榆、榛、樺、榆、楊、柳等。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、江西、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、山西、河北遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。
天 敵：*Hyleorus arctornis* Chao et Zhou 白毒蛾飾苔寄蠅

2855. **Arna bipunctapex** (Hampson) 烏桕黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:170; Beijing FC., 1980[ed.]:246-247; Channg & Hung., 1986:93; Chao, 1982:258; Chen, 1996, 22(2):27; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]I,293-294; Heppner et Inoue, 1992:165; Hun., 1992:1071; Liu, 1982[ed.]:329-330; Wang, 1987[ed.]:324-325; Xiao, 1992:1079; Yen, 2000:70; Yunn., 1987:1103; Zhang, 1987[ed.] 1:216)
Somena bipunctapex Hampson, 1891:
Euproctis bipunctapex (Hampson), auct.
別 名：*烏桕毒蛾、烏桕毒毛蟲、枇杷毒蛾、黑點黃毒蛾*。
寄 主：枇杷、蘋果、桃、李、柿、柑橘、楊梅、桑、烏桕、油桐、重陽木、白楊、女貞、茶、油茶、油桐、楓香、刺槐、櫟類、楊、楓香、樟、刺槐、黃豆、甘薯、南瓜等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南；新加坡、緬甸、印度。
天 敵：Mantidae 螳螂科
Virus 病毒(幼蟲)
Hyposoter sp. 彫尸姬蜂(幼蟲)
Apanteles sp. 絨繭蜂(幼蟲)
Aleiodes euproctis He et Chen 烏桕毛蟲脊繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Scelionidae 棱腹細蜂科(一種,卵)
Tachinidae 寄蠅科(三種)
Erycia bezzi Bar. (印度)
Isosturmia picta (Baranov) 多徑毛異叢毛寄蠅
Neopales aurescens Tns. (印度)
Sturmia chatterjeeana Bar. (印度)

2856. **Calliteara grotei** Moore 線茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:148; Heppner et Inoue, 1992:164; Hun., 1992:1050; Xiao, 1992:1077)
Dasychira grotei Moore, 1859:
=*Dasychira kausalis* Moore:
寄 主：檬果、柑橘、可可、泡桐、懸鈴木、重陽木、樟、黑荆、月季。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、安徽；印度。

2857. **Calliteara grotei horishanella** Matsumura 埔里茸毒蛾 (Heppner et Inoue, 1992:164)
Dasychira grotei horishanella Matsumura, 1927:
=*Dasychira atomariana* Matsumura, 1927:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2858. **Calliteara lunulata** (Butler) 結茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:146; Heppner et Inoue, 1992:164; Hun., 1992:1052)
Dasucjora lunulata Butler, 1879:
別 名：*赤肩毒蛾*。
寄 主：栗、櫟、枹。
分 佈：湖南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2859. **Cifuna eurydice** (Butler) 蠹腎毒蛾 (ASZI, 1987, 2:155; Chao, 1982:258; Hun., 1992:1060; Zhang, 1987[ed.] 1:214)
=*Dasychira amata* Staudinger:
=*Cifuna ornata* Swinhoe:
寄 主：葡萄、山楂、蘋果。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川；日本。

2860. **Cifuna jankowskii** (Oberthür) 白線腎毒蛾 (ASZI, 1987, 2:156; Hun., 1992:1060; Zhang, 1987[ed.] 1:214)
寄 主：葡萄、蘋果、醋栗。
分 佈：江西、湖南、湖北、浙江、江蘇、陝西、黑龍江；日本、蘇聯。

2861. **Cifuna locuples** Walker 腎毒蛾 (ASZI, 1987, 2:154; Chao, 1982:258; Heppner et Inoue, 1992:164; Hun., 1992:1061; Yunn., 1987:1098; Zhang, 1987[ed.] 1:215)
Cifuna locuples Walker, 1855:
別 名：*豆毒蛾*。
寄 主：蘋果、櫻桃、海棠、山莓、毛莓、柿、茶、蠶豆、豌豆、大豆、小豆、綠豆、蘆葦、苜蓿、紫藤、溲疏、油桐、柳、櫸、枹、榆、櫟、胡枝子、雲實、江板歸、野薔薇、馬鈴薯。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、湖南、湖北、陝西、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、越南、印度。

2862. **Dasychira abietis** (Schiffermüller et Denis) 杉茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:148)
寄 主：紅松、落葉松、樟子松、側柏、紅皮雲杉、魚鱗杉、冷杉。
分 佈：內蒙古、黑龍江；蘇聯、歐洲。

天 敵：*Telenomus dasychiri* Chen et Wu　松茸毒蛾黑卵蜂(卵)

2863. **Dasychira axutha** Collenette 松茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:150; Beijing FC., 1980[ed.]:242-244; Hun., 1992:1052; Lan, 1993:234-236; Xiao, 1992:1075; Yunn., 1987:1100; Zhang, 1987[ed.] 1:215)

別 名：*松毒蛾*、*馬尾松毒蛾*。

寄 主：馬尾松、油松、思茅松、雲南松、熱帶松、海南二針松(南亞松)、濕地松、火炬松、加勒比松、晚松、卵果松、卡錫亞松、柏、油杉。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、江西、湖南、湖北、浙江、江蘇、安徽、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

天 敵：白僵菌(幼蟲,蛹,成蟲,蛹被寄生高達 95 % 左右)
黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
松毛蟲黑點瘤姬蜂(蛹)
內繭蜂(幼蟲)
大腿蜂(蛹)
Anastatus sp.　平腹小蜂(卵)
Trichogramma sp.　赤眼蜂(卵)
Telenomus dasychiri Chen et Wu　松茸毒蛾黑卵蜂(卵)
Blepharipa zebina (Walker)　蠶飾腹寄蠅
Drino inconspicua (Meigen)　平庸贅寄蠅
Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅
蠶飾腹寄蠅(蛹)
松毛蟲狹頰寄蠅(蛹)

2864. **Dasychira chinensis** Swinhoe 華茸毒蛾 (Hun., 1992:1047)

寄 主：松、柏、櫟、楊。

分 佈：四川、貴州、湖南、福建、浙江、安徽。

2865. **Dasychira conjuncta** Wileman 連茸毒蛾 (Hun., 1992:1047)

別 名：*櫟雙線毒蛾*。

寄 主：馬尾松、櫟、楊、椴、重陽木、刺槐、楓香、相思樹、木荷。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、湖北、安徽、河北、北京、內蒙古、遼寧。

2866. **Dasychira flascelina** (Linnaeus) 霜茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:147)

寄 主：蘋果、梨、桃、稠李、松、山毛櫸、櫟、枸杞、山花楸、樺、柳楊、山楊、石楠、豆類和多種草本植物。

分 佈：西藏、青海、內蒙古、新疆、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

2867. **Dasychira glaucinoptera** Collenette 蔚茸毒蛾 (Hun., 1992:1048)

寄 主：柑橘、茶。

分 佈：福建、浙江、湖南、雲南、西藏、四川。

2868. **Dasychira grotei** Moore 線茸毒蛾 (Wu, 1990:107-110; Xiao, 1992:1077)

寄 主：檬果、可可、泡桐、懸鈴木、重陽木、樟樹、黑荊樹、榔榆、月季、玉米。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、安徽、湖北；印度。

天 敵：蠋蝽(若蟲成蟲取食幼蟲)
質型多角體病毒(幼蟲,感染率 30 %)
黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Chrops sp. (幼蟲)
蘆寇狹頰寄蠅(幼蟲)
Carcelia matsukarehae Shima 松毛蟲狹頰寄蠅(幼蟲)
蘇門答臘狹頰寄蠅(幼蟲,寄生率 66.6 %)
阿母狹頰寄蠅(幼蟲)

2869. **Dasychira horsfieldi** Moore 無憂花茸毒蛾 (Hun., 1992:1048)
=*Dasychira kausalia* Moore:
=*Dasychira arge* Moore:
=*Dasychira nilgirica* Hampson:
寄 主：柑橘、茶、無憂花。
分 佈：雲南、廣西、廣東、貴州、湖南、福建、浙江、湖北；印尼、印度、錫金、斯里蘭卡。

2870. **Dasychira olga** (Oberthür) 白齒茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:146)
寄 主：稠李、榛、槭、楓、櫟。
分 佈：黑龍江；蘇聯。

2871. **Dasychira thwaitesi** Moore 大茸毒蛾 (Luo, 1991:87; Luo et al., 1996:61)
寄 主：腰果(葉)、檬果。
分 佈：海南。

2872. **Dasychira pseudabietis** (Butler) 擬杉茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:149)
寄 主：蘋果、落葉松、杉、檜、櫟。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

2873. **Dasychira pudibunda** (Linnaeus) 茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:151; Chung & Hung, 1986:93; Yang et Feng, 1990:296-297)
寄 主：板栗、懸鈎子、李、山楂、蘋果、山荊子、梨、櫻桃、杏、榆葉梅、核桃、旱柳、沙針、樺、鵝耳櫪、水青岡、山毛櫸、櫟、橡、榛、槭、椴、楓楊、楊、柳、多種草本植物。
分 佈：臺灣、陝西、河南、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。
天 敵：*Casinaria nigripes* (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂
Compsilura concinnata (Meigen) 康刺腹寄蠅
核型多角體病毒

2874. **Dasychira thwaitesi** Moore 大茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:148; Yunn., 1987:1100)
寄 主：檬果。
分 佈：廣東、廣西、雲南；印度、斯里蘭卡。

2875. **Euproctis atereta** Collenette 黑褐盜毒蛾 (ASZI, 1987, 2:166; Hun., 1992:1064)

寄 主：核桃、板栗、泡桐、馬桑、法桐、黑荆、茶等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南；馬來半島。

2876. **Euproctis bimaculata** Walker 皎星黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:170; Heppner et Inoue, 1992:165)
Euproctis bimaculata Walker, 1855:
寄 主：蘋果、梨。
分 佈：臺灣、江西、四川、湖北、浙江、江蘇；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

2877. **Euproctis bimaculata lutescens** Matsumura (Heppner et Inoue, 1992:165)
Euproctis bimaculata lutescens Matsumura, 1921:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2878. **Euproctis conspersa** Butler 茶黃毒蛾 (ASZI, 2:169; Beijing FC., 1980[ed.]:241-242; Chang & Hung, 1986:93; Chao, 1982:259; Chou et al., 1983:293; Hun., 1992:1071; Lin, 1986[ed.]:372-374; Liu, 1982[ed.]:316-317; Liu, 1994(2):92-93, 96; Xiao, 1992:1082; Yao, 1987, 14(4):267-271; Zhang, 1985[ed.]:191-196; Zhang et Zhang, 1999:26)
=*Euproctis pseudoconspersa* Strand:
別 名：*茶毛蟲、茶毒蛾、油茶毒蛾*。
寄 主：柑橘類、枇杷、櫻桃、梨、柿、桑、茶、油茶、烏桕、油桐、玉米、大頭茶、椿。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；日本、歐洲。。
天 敵：蜘蛛
蠼螋
Mantidae 螳螂
蠅蝽
益蝽科
Cantheconidea formosana
Parena rufotestacea 步甲
蛙
核多角體病毒(幼蟲)
細菌軟化病(幼蟲)
Enicospilus flavocephalus Kirby 黃頭細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus pseudoconspersae Sonan 茶毛蟲細顎姬蜂(幼蟲)
蠋姬蜂(幼蟲)
鈍唇姬蜂(幼蟲)
Apanteles conspersae Fiske 茶毒蛾絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles lacteicolor Viereck 乳色絨繭蜂(幼蟲)
日本黃繭蜂(幼蟲)
Trichogramma sp. 赤眼蜂(卵)
Telenomus (Aholcus) euproctidis Willicox 茶毒蛾黑卵蜂(卵)
Drino facialis Townsend 狹頰贅寄蠅
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅(幼蟲,蛹)
Isosturmia picta (Baranov) 多鬃毛異叢毛寄蠅

Tachina sp. (幼蟲,蛹)

2879. **Eurpctis decussata** Moore 弧紋毒蛾 (Zhao et al.,1997:190)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

2880. **Euproctis digramma** (Guerin) 半帶黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:168; Hun., 1992:1070)
=*Artaxa flava* Kirby;
寄 主：梨、火炭母、風箱樹。
分 佈：廣東、廣西、湖南、江西；印尼、緬甸、印度。

2881. **Euproctis diploxutha** Collenette 雙弓黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:167; Hun., 1992:1068; Yunn., 1987:1104; Zhang, 1987[ed.] 1:216)
寄 主：梨、沙果、梅、李、栗、烏蔹莓、菝葜、月季、薔薇、桉、櫟。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北；印尼、緬甸、印度。

2882. **Euproctis flava** (Bremer) 折帶黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:168; Chao, 1982:258; Hun., 1992:1072; Zhang, 1987[ed.] 1:216)
=*Aroa subflave*
別 名：*杉皮毒蛾*、*黃毒蛾*、*柿黃毒蛾*、*擬并點黃毒蛾*。
寄 主：櫻桃、梨、蘋果、桃、梅、李、海棠、山里紅、山楂、枇杷、柿、石榴、松、栗、薔薇、櫟、枹、山毛櫸、茶、槭、刺槐、洋槐、柳、楊、赤楊、紫藤、赤麻、山漆、檫、杉、柏、山荊子、榛、榆、油桐、白樺、胡枝子、律草、女絲桃、青蒿、酸漿。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、陝西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Telenomus euproctidis* Wilcox 茶毒蛾黑卵蜂(卵)
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅

2883. **Euproctis flavinata** (Walker) 星黃毒蛾 (Hun., 1992:1067)
寄 主：蘋果、梨、柑橘。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、四川、湖南、浙江、江蘇；印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Trichogramma chilonis* Ishii 螟黃赤眼蜂(卵)

2884. **Euproctis flavotriangulata** Gaede 岩黃毒蛾 (Hun., 1992:1066; Xiao, 1992:1080)
寄 主：核桃。
分 佈：福建、四川、湖南、陝西、山西、河北、北京。

2885. **Euproctis fraterna** (Moore) 緣點黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:166; Hun., 1992:1065)
寄 主：梨、薔薇、羊蹄甲。
分 佈：廣東、廣西、湖南；印度、斯里蘭卡。

2886. **Euproctis kanshireia** Wileman 堪西毒蛾 (Chang & Hung, 1986:93; Heppner et Inoue, 1992:165; Tsai, 1965: 118)
Euproctis kanshireia Wileman, 1910:

=*Euproctis centropallida* Matsumura, 1927:
寄 主：柑橘類、茄子。
分 佈：臺灣。

2887. **Euproctis karghalica** Moore 緣黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:166; Huang, 1990[ed.] 2:64-65; Xiao, 1992:1081)
別 名：*斑翅棕尾毒蛾*。
寄 主：蘋果、杏、梨、桃、山楂、桑、柳、楊、沙棗。
分 佈：新疆、黑龍江；蘇聯。
天 敵：寄生蜂(幼蟲)
Tachinidae 寄蠅科
(寄生率可達 40 %，個別年份更達 80 %)

2888. **Euproctis kurosawai** (Inoue) 戟盜毒蛾 (ASZI, 1987, 2:164; Hun., 1992:1063)
別 名：*黑衣黃毒蛾*。
寄 主：蘋果、柑橘、桃、茶、油茶、刺槐。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、四川、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、河南、河北、遼寧；朝鮮、日本。

2889. **Euproctis montis** (Leech) 梯帶黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:168; Chao, 1982:258; Hun., 1992:1066; Yunn., 1987:1106; Zhang, 1987[ed.] 1:217)
寄 主：梨、桃、葡萄、柑橘、桑、茶、馬鈴薯、茄、柳。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、浙江、江蘇、安徽、山東、河北。

2890. **Euproctis niphonis** (Butler) 雲星黃毒蛾 (Hun., 1992:1065)
=*Chaerotricha aquamosa* Butler:
=*Porthesia raddei* Staudinger:
別 名：*黑紋毒蛾*。
寄 主：酸栗、茶藨子、赤楊、白樺、刺槐、薔薇。
分 佈：江西、湖南、陝西、山東、河南、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

2891. **Euproctis piperita** (Oberthür) 豆盜毒蛾 (ASZI, 1987, 2:164; Hun., 1992:1063; Zhang, 1987[ed.] 1:220)
別 名：*并點黃毒蛾*。
寄 主：柑橘、茶、楸、豆類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、安徽、湖北、江蘇、河南、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

2892. **Euproctis plana** Walker 漫星黃毒蛾 (ASZI,1987, 2:167; Chao, 1982:258; Hun., 1992:1069; Yunn., 1987:1105; Zhang, 1987[ed.] 1:217)
=*Euproctis diseinota* Moore:
別 名：*櫟黃毒蛾*。
寄 主：梨、桃、櫟、稻。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北；印尼、緬甸、印度。

天 敵：*Isosturmia picta* (Baranov)　多徑毛異叢毛寄蠅

2893. **Euproctis pulverea** (Leech) 塵粉毒蛾 (Chang & Hung, 1986:93; Heppner et Inoue, 1992:166)
Artaxa pulverea Leech, 1888:
=*Porothesia argentata* Leech:
=*Euproctis riukiuana* Matsumura:
寄 主：楊梅、桃、梅、柑橘類、薔薇類、柃木。
分 佈：臺灣。

2894. **Euproctis scintillans** (Walker) 雙線盜毒蛾 (ASZI, 1987, 2:165; Heppner et Inoue, 1992:166; Hun., 1992:1064; Xiao, 1992:1105; Zhang, 1987[ed.] 1:221)
Somena scintillans Walker, 1856:
=*Artaxa limbata* Butler: 1881:
=*Psalis kanshireiensis* Wileman & South: 1917:
=*Euproctis limbatella* Matsumura: 1931:
別 名：*棕衣黃毒蛾*。
寄 主：柑橘、梨、桃、龍眼、枇杷、茶、油茶、刺槐、楓、黃檀、泡桐、楓香、櫟、黑荊樹、烏桕、楊、柳、白桐、白蘭、向日葵、蓖麻、玉米、棉花、花生、菜豆、甕菜、蘿菜等和十字花科植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、河南；馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

2895. **Euproctis similis** (Fuessly) 桑毒蛾 (ASZI, 1987, 2:165; Chang & Hung, 1986:93, 96; Chao, 1982:260; Chen et Wang, 1987:53-54; Cheng et Duan, 1992, 9(2):122; Huang, 1990[ed.] 2:62-64; Hun., 1992:1064; NZWDI, 1981:1102; Suzhou CS, 1983:195-197; Tao, 1980:245; Xiao, 1992:1107; Zhang, 1987[ed.] 1:221; Zhao et al., 1998(4):28; Zheng, 1982:195-197; Zheng, 1982[ed.]:195-197)
=*Porthesia similis xanthocampa* Dyar,
別 名：*金毛蟲、桑毛蟲、桑褐斑毒蛾、夜毒蛾、黃尾毒蛾、黃尾白毒蛾、盜毒蛾*。
寄 主：李、山楂、蘋果、梨、桃、梅、杏、櫻桃、海棠、柑橘、柿、棗、板栗、花椒、茶蔗子、桑、油茶、楓楊、柳、楊、泡桐、烏桕、榆、漆、樺、白樺、榛、榿木、山毛櫸、櫟、柏、薔薇、石楠、黃檗、忍冬、馬甲子、櫻、洋槐、泡桐、梧桐、蓖麻、棉、馬鈴茹、向日葵、十字花科蔬菜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、青海、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。
天 敵：桑毛蟲多角體病毒
Apanteles femoratus Ashmead　桑毛蟲絨繭蜂(幼蟲) (重要種類)
Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂(蛹)
Ootetrastichus sp.　大角嚙小蜂(蛹)
Sympiesis sp.　赤金釉小蜂
Telenomus abnormis Crawford　桑毛蟲黑卵蜂(卵)
Telenomus euproctidis Wilcox　茶毒蛾黑卵蜂(卵)
Isosturmia picta (Baranov)　多徑毛異叢毛寄蠅
Plagia data Miegen　寄蠅

2896. **Euproctis staudingeri** (Leech) 河星黃毒蛾 (Heppner et Inoue, 1992:166; Hun., 1992:1070)

Chaerotriche staudingeri Leech, 1889:
寄 主：蕓香科、薔薇科。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏；日本。

2897. **Euproctis straminea** Leech 肘帶黃毒蛾 (Hun., 1992:1070)
寄 主：核桃、楊。
分 佈：廣西、四川、湖南。

2898. **Euproctis taiwana** (Shiraki) 臺灣黃毒蛾 (Chang, 1982:288; 1987:41; Chang & Hung, 1986:96; Chen, 1981:44; Chen et Chang, 1990:363; Chiu et al., 1985:1-8; Heppner et Inoue, 1992:166; Liu, 1995:32-33; Su, 1985:53-61; 95-100; 1987:147-156; 401-405; Su et al., 1986:114; Tsai, 1961:117-118; Tsai, 1965:119)
Porthesia taiwana Shiraki, 1913:
=*Euproctis macroplura* Strand, 1914:
[Tussock moth]
別 名：*黃毒蛾、桑毛蟲、桑毒蛾、刺毛蟲*。
寄 主：多食性，桃、梨、李、枇杷、葡萄、番石榴、柿、檬果、柑橘、西印度櫻桃、大棗、花棗、可可樹、咖啡、桑、小葉桑、蛇莓、櫻花、銀合歡、大葉合歡、茄苳、楊桐、金龜樹、鳳凰木、相思樹、榕樹、油茶、大頭茶、玉米、蘆筍、蕎麥、菜豆、菠菜、甘藍、花椰菜、結球白菜、芥菜、蘿蔔、落花生、甘藷、番茄、馬鈴薯、甜椒、豆薯、胡瓜、絲瓜、苧麻、亞麻、黃麻、蓖麻、胡麻、棉、太陽麻、白草藤、刺莧、薔薇、長葉茶梅、玉笑、扶桑花、木槿、秋葵、黃梔子、牽牛花、茉莉花、大頭花、菊。
分 佈：臺灣。
天 敵：*Enicospilus flavocephalus* Kirby 黃頭細顎姬蜂(幼蟲)
Apanteles liparidis Bouché 絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles taiwanensis Sonan 絨繭蜂(幼蟲)
Euplectrus taiwanus Sonan 長距釉小蜂(幼蟲)
寄蠅

2899. **Euproctis varians** (Walker) 幻帶黃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:169; Chao, 1982:259; Heppner et Inoue, 1992:166; Hun., 1992:1067; Yunn., 1987:1105)
Artaxa varians Walker, 1855:
=*Euproctis pusilla* Moore,
=*Euproctis pygmaea* Moore,
寄 主：柑橘、馬尾松、茶、油茶、馬桑、柳沙、側柏。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、陝西、湖北、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、河北；馬來西亞、印度。

2900. **Euproctis xanthorrhoea** (Kollar) 暗緣盜毒蛾 (ASZI, 1987, 2:164; Xiao, 1992:1107; Yunn., 1987:1103)
寄 主：桑。
分 佈：雲南；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2901. **Euproctis yunnanpina** Chao 雲南松黃毒蛾 (Chao, 1984:454; Hun., 1992:1067; Yunn., 1987:1111)
Euproctis yunanpina Chao, 1984:454.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南、廣西、湖南。

2902. **Locharna strigipennis** Moore 黃羽毒蛾 (Heppner et Inoue, 1992:165; Hun., 19921056)

Locharna strigipennis Moore, 1879:

=*Licgarna struguoennis* Moore,

别 名：*細紋黃毒蛾*。

寄 主：檬果、人面果、樟、肉桂、櫟。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、安徽、湖北、江蘇；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

2903. **Lymantria apicebrunnea** Gaede 褐頂毒蛾 (Yunn., 1987:1108)

寄 主：雲南松。

分 佈：雲南、四川。

2904. **Lymantria aurora** Butler 柏舞毒蛾 (Chang & Hung, 1986:94; Tsai, 1965:118)

别 名：*櫟葉毒蛾*。

寄 主：臺灣蘋果、梨、麻櫟、櫟、槲、抱樹。

分 佈：臺灣、東北；朝鮮、日本、印度。

2905. **Lymantria bantaizana** Matsumura 肘紋毒蛾 (ASZI, 1987, 2:145)

寄 主：蘋果。

分 佈：陝西、甘肅。

2906. **Lymantria dispar** (Linnaeus) 舞毒蛾 (ASZI, 1987, 2:143; Beijing FC., 1980[ed.]:238-240; Chang & Hung, 1986:94; Chao, 1982:259; Chen et Wang, 1987:52-53; Huang, 1990[ed.] 2:319-321; Hun., 1992:1046; Liu, 1982[ed.]:191-192; Luo et Jin, 1997:75; NZWDI, 1981:1703; Shi, 1996(3):30; Tsai, 1965:119; Wang, 1987[ed.]:248-249; Wang, 1998(2):10; Xiao, 1992:1086; Yum., 1987:1108; Zheng et al., 1994(4):11-13, 15)

Ocneria dispar Linnaeus,

别 名：*松針黃毒蛾，秋千毛蟲，柿毛蟲，舞蛾，赤楊毛蟲，鞦韆蟲*。

[Gypsy moth]

寄 主：雜食，蘋果、臺灣蘋果、杏、梨、桃、李、梅、枇杷、櫻桃、山楂、柿、柑橘、核桃、栗、波羅蜜、桑、紅松、稠李、樟子松、落葉松、雲杉、榆、柳、櫟、柞、槭、椴、鵝耳櫪、黃檀、山毛櫸、山楊、柳、樺、水青岡、水稻、麥類等 500 餘種植物。

分 佈：臺灣、湖南、海南、雲南、四川、貴州、安徽、江蘇、湖北、河南、陝西、寧夏、甘肅、青海、新疆、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、美洲、世界廣分佈。

天 敵：*Dinorhynchus dybowskyi* Jakovlev 綠喙蝽

Calosoma maderae chinense Kirby 中華金星步甲

Xylodrepa sexcarinata Motschulsky 六脊樹葬甲

鳥類：山雀、杜鵑

舞毒蛾核型多角體病毒(幼蟲)

質型多角體病毒(幼蟲)

粗狀六索線蟲

Casinaria nigripes (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)

Coccygomimus luctuosus (Smith) 野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)

Gregopimpla himalayensis Cameron 喜聚瘤姬蜂(幼蟲)
Hyposoter takagii (Matsumura) 松毛蟲鑲顎姬蜂(幼蟲)
Iseropus (*Gregopimola*) *himalayensis* (Cameron) 喜馬拉雅聚瘤姬蜂(幼蟲)
Itoplectis alternans spectabilis Matsumura 松毛蟲埃姬蜂(幼蟲)
Theronia (s. str.) *atalantae gestator* (Thunberg) 脊腿姬蜂(幼蟲)
Apanteles liparidis (Bouché) 毒蛾絨繭蜂(幼蟲)
Apanteles melanoscelus Ratzeburg 黑腿絨繭蜂(幼蟲)
脊繭蜂
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Ooencyrtus kuwanai (Howard) 大蛾卵跳小蜂(卵)
Anastatus disparis (Ruschka) 舞毒蛾卵平腹小蜂(卵)
Anastatus japonicus Ashmead 舞毒蛾卵平腹小蜂(卵)
Parasarcophaga harpax (Pandelle) 貪食亞麻蠅
Buamhaueria goniaeformis Meigen 天幕毛蟲抱寄蠅
Blepharipa tibialis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅
Carcelia kockiana Townsend 善飛狹頰寄蠅
Compsilura concinnata (Meigen) 康刺腹寄蠅
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅
Exorista larvarum (Linnaeus) 古毒蛾追寄蠅
Exorista rossica Mesnil 毛蟲追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅
梳脛飾腹寄蠅
敏捷毒蛾蜉寄蠅

2907. **Lymantria dissoluta** Swinhoe 條毒蛾 (ASZI, 1987, 2:144; Hun., 1992:1046; Xiao, 1992:1087)

別 名：*川柏毒蛾*。
寄 主：馬尾松、油松、黑松、柏、櫟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。
天 敵：Reduviidae 獵蝽科
Formicidae 蟻科
鳥類：大杜鵑、大山雀、灰喜鵲、黑枕黃鸝、紅尾伯勞、黑卷尾、銀喉長尾山雀、喜鵲、白頭鵯、烏鴉
真菌
Casinaria nigripes (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(蛹)
絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
單齒腿長尾小蜂(幼蟲)
長尾小蜂(幼蟲)
羽角釉小蜂(幼蟲)
毒蛾黑卵蜂(卵)
麻蠅(蛹)

Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅
狹頰寄蠅(蛹)

2908. **Lymantria fumida** Butler 雲南松毒蛾 (Yunn., 1987:1111)
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南；日本。

2909. **Lymantria juglandis** Chao 核桃毒蛾 (ASZI, 1987, 2:145; Hun., 1992:1046)
Lymantria juglandis Chaom, 1984:95.
寄 主：核桃(*Juglans regia* L.)。
分 佈：湖南、陝西、山東、河北、北京。

2910. **Lymantria marginata** Walker 橡果毒蛾 (ASZI,1987, 2:143; Hun., 1992:1044; Yunn., 1987:1109; Zhang, 1987[ed.] 1:218)
寄 主：橡果、板栗。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、陝西、湖北；錫金。

2911. **Lymantria marginata nigra** Moore 黑邊花毒蛾 (Chao, 1982:259)
寄 主：
分 佈：福建。

2912. **Lymantria mathura** Moore 櫟毒蛾 (ASZI, 1987, 2:142; Chang & Hung, 1986:94; Huang et Gao, 1996:266; Liu et al., 1996(3):35-36; Zhang, 1987[ed.] 1:218; Zheng et al., 1994(4):11-13, 15)
別 名：*苹葉波紋毒蛾*，*栗毒蛾*，*蘋果大毒蛾*。
寄 主：蘋果、梨、栗、李、杏、板栗、櫟、槠、槲、栖、野漆、樺、青岡、枹、柳、楊類
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、印度、阿穆爾。
天 敵：*Casinaria nigripes* (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Telenomus (*Aholcus*) *dendrolimusi* Chu 松毛蟲黑卵蜂(卵)

2913. **Lymantria minomonis** Matsumura 肩紋毒蛾 (Heppner et Inoue, 1992:165; Hun., 1992:1044)
Lymantria minomonis Matsumura, 1934:
寄 主：松、柏。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、江蘇、陝西；日本。

2914. **Lymantria monacha monacha** (Linnaeus) 模毒蛾 (ASZI, 1987, 2:140; Chang & ung, 1986:94; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:209-211; Liu, 1982[ed.]:195-196;Xiao, 1992:1089; Yunn., 1987:1110; Zhang, 1987[ed.] 1:219)
別 名：*松針毒蛾*，*僧尼舞毒蛾*、*油杉毒蛾*。
寄 主：華山松、蘋果、杏、馬尾松、雲南松、落葉松、赤松、油杉、黃杉、雲杉、冷杉、鐵杉、羅漢松、檜、麻櫟、千金榆、枹、水青岡、椴、槭、柳、山楊、山榆、楸、榛、樺、槲、栲。
分 主：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

天 敵：真菌(幼蟲)
Ichneumonidae 姬蜂科(蛹)
Chalcididae 闊小蜂科(蛹)
Kramerea schuetzei (Kramer) 舞毒蛾克麻蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2915. **Lymantria monacha yunnanesis** Collenette 雲南模毒蛾 (Yunn., 1987:1110)
寄 主：華山松、蘋果、杏、雲南松、落葉松、赤松、油杉、黃杉、雲杉、冷杉、鐵杉、檜、麻櫟、千金榆、枹、水青岡、椴、槭、柳、山榆、楸、榛、槲栩。
分 主：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川；貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

2916. **Lymantria viola** Swinhoe 珊毒蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:301; Huang et Gao, 1996:277; Liu et Yang, 1992:285-287)
別 名：*紅緣舞毒蛾*。
寄 主：橄欖(*Canarium album* Raeusch)
分 佈：福建、廣東、廣西、四川；印度。
天 敵：*Blepharipa schineri* (Walker) 蠶飾腹寄蠅(寄生率可達 52.4%)
核型多角體病毒(寄生率可達 22.4%)

2917. **Lymantria xylina** Swinhoe 木毒蛾 (ASZI, 1987, 2:144; Beijing FC., 1980[ed.]:244-246; Chao, 1982:259; Chow et Lin, 1984:128; Chow et al., 1987:416; Heppner et Inoue, 1992:165; Hun., 1992:1045; Li, et al., 1981:174-183; Luo et al., 1996:61; Tsai, 1998:429-430; Xiao, 1992:1090; Zhang, 1987[ed.] 1:219; Zhang et Zhang, 1999:26)
Lymantria xylina Swinhoe, 1903:
=*Lymantria nigricosta* Matsumura, 1921:
=*Lymantria korishanella* Matsumura, 1927:
別 名：*木麻黃毒蛾、黑角舞蛾*。
寄 主：荔枝、龍眼、檬果、梨、枇杷、柿、石榴、板栗、番石榴、無花果、菠蘿蜜、茶、油茶、木麻黃、堅木麻黃、紫穗槐、相思樹、南嶺黃檀、刺槐、黑荆樹、臭椿、栓皮櫟、薄殼山核桃、楓楊、柳、檸檬桉、細葉桉、戶千層、黃槿、香椿、楓香、油桐、重陽木、蓖麻、梧桐、梓樹、黃金樹、泡桐等 21 科 40 多種植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南；日本、印度。
天 敵：Pentatomidae 蝽科
Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲
Rodolia candinalis Mulsant 澳洲瓢蟲
木毒蛾核型多角體病毒(幼蟲)
芽孢杆菌(幼蟲)
白僵菌(幼蟲)
松毛蟲黑點瘤姬蜂(幼蟲)
卵跳小蜂
紅尾追寄蠅(幼蟲)
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅(幼蟲)

2918. **Olene mendosa** (Hübner) 沁茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:146; Chang & Hung, 1986:93; Chen, 1981:45,

Heppner et Inoue, 1992:164; Lee et al., 1994:134; Tsai, 1965:117; Yen, 2000:70)
Olene mendosa Hübner, 1823:
=*Turriga invasa* Walker, 1869:
=*Dasychira tarowanensis* Matsumura, 1927:
別 名：*柑毒蛾、茶葉褐毒蛾、茶背帶毒蛾*。
寄 主：柑橘、無花果、蓮霧、咖啡、桑、茶、金寧、黃檀、榕樹、相思樹、竹、茄、番茄、蘿蔔、甘藍、芥菜、結球白菜、菜豆、大豆、甘薯、玉米、棉、黃麻、苧麻、亞麻、蓖麻、山黃麻、竹類(含筍)。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、四川；日本、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。
天 敵：*Enicospilus dasychirae* Cameron　茸毒蛾細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus lineolatus (Roman)　細線細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus pudibundae (Uchida)　茶毛蟲細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus striatus Cameron　(幼蟲)
Theronia rufescens Morley　(幼蟲)
Theronia zebra diluta Gupt　黑紋囊爪姬蜂(幼蟲)

2919. **Olene dudgeoni** (Swinhoe) 桃毒蛾 (Chang & Hung, 1986:96; Heppner et Inoue, 1992:164; Yen, 2000:70)
Dasychira dudgeoni Swinhoe, 1907:
=*Pseudodura dasychiroides* Strand, 1914:
=*Dasychira cruda* Wileman, 1915:
Olene dudgeoni (Swinhoe), Yen, 2000:70.
寄 主：桃、梅、李、柑橘類、桑、茶、相思樹、薔薇、棉、蓖麻、玉米、大豆、花椰菜、甘藍、芥菜、菜豆、落花生。
分 佈：臺灣。

2920. **Orgyia antiqua** (Linnaeus) 古毒蛾 (ASZI, 1987, 2:152; Beijing FC., 1980[ed.]:253-254; Chao, 1982:259; Luo et Jin, 1995:87; Wu et al., 1998(4):25; Xiao, 1992:1092)
別 名：*木麻黃古毒蛾*。
寄 主：栗、梨、李、蘋果、山楂、酪梨、柳、楊、樺、榛、桤木、鵝耳櫪、山毛櫸、櫟、槭、歐石楠、雪杉、落葉松、木麻黃、大麻、花生、大豆。
分 佈：福建、海南、西藏、青海、甘肅、寧夏、河南、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲。
天 敵：*Casinaria nigripes* (Gravenhorst)　黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Braconidae　繭蜂科
Chalcididae　闊小蜂科
Scelionidae　稜腹細蜂科
Exorista larvarum (Linnaeus)　古毒蛾追寄蠅
Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅
(文獻記載已知寄生性天敵 50 餘種)

2921. **Orguia ericae** Germar 灰斑古毒蛾 (ASZI, 1987, 2:154; Xiao, 1992:1093)
寄 主：蘋果、梨、李、山楂、楊梅、松、沙棗、沙拐棗、花棒、柳、楊、榆、樺、山毛櫸、櫟、踏朗、檸條、鼠李、薔薇、杜鵑花、檉柳、豆類、沙米、梭梭。
分 佈：陝西、甘肅、青海、寧夏、河北、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

天 敵：核型多角體病毒(幼蟲)
Ichneumonidae 姬蜂科
Braconidae 繭蜂科
Chalcididae 小蜂科
Eulophidae 釉小蜂科
Tetrastichus sp. 嚙小蜂
Exorista larvarum (Linnaeus) 古毒蛾追寄蠅(幼蟲)

2922. **Orgyia ericae leechi** Kirby 沙棗毒蛾 (Beijing FC., 1980[ed.]:248-249)
寄 主：花棒、沙棗、榆、旱柳及檸條、沙枴棗。
分 佈：陝西、寧夏。

2923. **Orgyia gonostigma** (Linnaeus) 角斑古毒蛾 (ASZI, 1987, 2:153; Hun., 1992:1059; Xiao, 1992:1095; Zhao et al., 1998(4):28)
=*Gynaephora recens* Hübner,
別 名：*楊白紋毒蛾，囊尾毒蛾。*
寄 主：蘋果、梨、桃、杏、李、山楂、梅、櫻桃、懸鉤子、落葉松、松、榛、桑、櫟、楊、柳、榆、樺、花楸、鵝耳櫪、泡桐、楤木、山毛櫸、薔薇、唐棣、鹽膚木、懸鈴木、花椒。
分 佈：貴州、湖南、湖北、甘肅、河南、江蘇、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。
天 敵：*Casinaria nigripes* (Gravenhorst) 黑足凹眼姬蜂(幼蟲)
Carcelia rasa (Macquart) 灰腹狹頰寄蠅

2924. **Orgyia postica** (Walker) 棉古毒蛾 (Chang, 1982:288; 1987:41; Chang & Hung, 1986:95; Chao, 1982:239; Chen, 1981:45; Chen et Chang, 1990:363; Heppner et Inoue, 1992:164; Luo, 1991:87; Luo et Jin, 1997:75; Luo et al., 1996:61; Su, 1985:53-61; 95-100; 1986:145-151; 1987:147-156; 1988:310-313; Su et Chiu, 1984:433; Tao, 1980:243; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Tsai, 1965:118; Tung et al., 2000, (3):179-185; Wu, 1977:86-88; Xiao, 1992:1097; Yen, 2000:70; Yunn., 1987:1102)
Lacida posticus Walker, 1855:
=*Notolophus australis postica* Walker,
別 名：*灰帶毒蛾、小白紋毒蛾、茶毛蟲。*
[Citrus tussoch moth]
寄 主：龍眼、檬果、蘋果、梅、枇杷、梨、李、桃、柿、棗、柑橘類、番石榴、葡萄、檬果、波羅蜜、西印度櫻桃、可可樹、錫蘭橄欖、腰果、藤胡頹子、鄧氏胡頹子、桑、松類、茶、奎寧樹、橡膠、桉樹、黑荊樹、銀合歡、烏桕、木臘樹、九芎、水柳、臺灣楤木、栓皮櫟、鹿仔樹、構樹、槭、相思樹、銀合歡、大葉合歡、鳳凰木、金龜樹、茄苳、木紅心、野桐、木麻黃、梧桐、蓖麻、魚藤、薔薇類、茉莉花、安南漆、榕樹、楓香、大葉合歡、南嶺黃檀、棉花、蕎麥、大豆、木豆、花生、甘薯、馬鈴薯、甘藍、瓜、茄、蔥、蘆筍、竹柏、莫勞、苗木、和各種花卉等60餘種。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、雲南；日本、菲律賓、婆羅洲、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲、大洋洲。
天 敵：*Charaps flavipetiolus* Sonan 黃腹姬蜂(幼蟲)
Delopia nigrifemur Sonan 黑足姬蜂(幼蟲)

Enicospilus dasychirae Cameron　茸毒蛾細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus lineolatus (Roman)　細線細顎姬蜂(幼蟲)
Enicospilus striatus Cameron　一點姬蜂(幼蟲)
Holocremnus posticae Sonan　圓姬蜂(幼蟲)
Hymenobosmia posticae Sonan　姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla punctata Fabricius　黃姬蜂(幼蟲)
Apanteles liparidis Bouché　(幼蟲)
Apanteles posticae Sonan　毒蛾絨繭蜂(赤足絨繭蜂)(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂
Telenomus abnormis Crawford　(卵)
Tachinia larvarum Linnaeus　寄蠅(幼蟲)
Exorista sorbillans (Wiedemann)　家蠶追寄蠅
Exorista larvarum (Linnaeus)　古毒蛾追寄蠅
中室彩寄蠅

2925. **Orgyia thyellina** Butler 旋古毒蛾 (ASZI, 1987, 2:154; Chang & Hung, 1986:95)
寄 主：桑、蘋果、李、梅、梨、櫻桃、柿、櫟、桐、柳、篠懸木。
分 佈：廣東、浙江；日本。

2926. **Porthesia scintillans** (Walker) 雙線盜毒蛾 (Chao, 1982:260; Huang et Gao, 1996:251; Xiao, 1992:1105; Zhao et al., 1997:190)
別 名：*灰毒蛾*、*棕衣黃毒蛾*。
寄 主：柑橘、梨、棒、桃、枇杷、龍眼、茶、黑荆樹、刺槐、楓樹、黃檀、白桐、白蘭、蓖麻、玉米、棉花、菜豆、葵菜、甕菜、十字花科植物。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、四川、河南；馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡。
天 敵：核型多角體病毒(幼蟲)
白僵菌(幼蟲,寄生率為 4.3-33.4 %)
細顎姬蜂
Apanteles sp. 絨繭蜂

2927. **Psalis pennatula** (Fabricius) 鈎茸毒蛾 (ASZI, 1987, 2:148; Chang & Hung, 1986:93; Heppner et Inoue., 1992:164; Hun., 1992:1049; Yunn., 1987:1099)
Bombyx pennatula Fabicius, 1793:
=*Aresta antica* Walker, 1855:
別 名：*甘蔗毒蛾*。
寄 主：濕地松、甘蔗、水稻、玉米、芒竹、白茅、檜柏。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲、大洋洲、非洲。

2928. **Stilpnotia candida** Staudinger 柳毒蛾 (Chen et Wang, 1987:54-55; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:244-245; Liu, 1982[ed.]:193;-196)
別 名：*楊雪毒蛾*。
寄 主：蘋果及其他果樹、楊、柳等森林樹木。
分 佈：湖南、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Lithosiidae 苔蛾科

2929. **Asura strigipennis** (Herrich-Schäffer) 條紋艷苔蛾 (Heppner et Inoue., 1992:168; Hun., 1992:937)
Raidia strigipennis Herrich-Schäffer, 1855:
=*Miltochrista sinica* Moore, 1877:
=*Lyclene terminata* Moore, 1878:
=*Lyclene discistriga* Moore, 1878:
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、華南地區；印尼、印度、錫金。

2930. **Carea rhodophila** (Walker) 玫痣苔蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24; Heppner et Inoue, 1992:187; Hun.,1992 :933)
Carea varipes Walker, 1857:
=*Chora curvifera* Walker, 1862:
=*Dabarita rhodophila* Walker, 1865:
寄 主：龍眼、板栗、牛毛氈。
分 佈：福建、廣西、四川、湖南、浙江、江蘇、山東、河南、陝西、山西、北京、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、沙勞越、爪哇、馬來西亞。

2931. **Cyana hamata** (Walker) 優雪苔蛾 (Heppner et Inoue, 1992:167; Hun., 1992:940; Yunn., 1987:1042)
Bizone hamata Walker, 1854:
=*Chionaema hamata var. rectivitta* Strand, 1917:
寄 主：柑橘、玉米、棉、豆類等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

2932. **Lithosia quadra** (Linnaeus) 四點苔蛾 (Hun., 1992:941; Yunn., 1987:1045)
寄 主：蘋果葉、樟子松、地衣。
分 佈：雲南、湖南、陝西、山東、內蒙古、東北地區；日本、西伯利亞、歐洲。

2933. **Miltochrista striata** Bremer et Grey 優美苔蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:229)
寄 主：柑橘、苦莓、大豆、玉米、豇豆、菊花、薔薇、棉。
分 佈：江西。

2934. **Stigmatophora flava** (Bremer) 黃痣苔蛾 (Heppner et Inoue, 1992:169; Hun., 1992:933)
Setina flava Bremer, 1852:
=*Setina sinensis* Walker, 1854:
=*Setina ochracea* Lederer, 1855:
寄 主：桑、高粱、玉米、牛毛氈。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、湖北、浙江、江蘇、山東、陝西、山西、河北、新疆、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

Arctiidae 燈蛾科

2935. **Alphaea phasma** (Leech) 褐點粉燈蛾 (ASZI, 1987, 2:177; Hun., 1992:927; Xiao, 1992:1037; Yunn.,

1987:1037)
別 名：*粉白燈蛾*。
寄 主：桃、梨、蘋果、柿、梅、桑、雲南松、藍桉、夾竹桃、梓樹、滇楸、女貞、玉米、大豆、高粱、蓖麻、南瓜、菜豆其它許多經濟林木、糧食作物、藥用植物、果樹、蔬菜、觀賞植物，已知寄主植物有 55 科 94 屬 111 種。
分 佈：湖南、雲南、四川、貴州。
天 敵：白僵菌(幼蟲,蛹)
Rhogas sp. 脊繭蜂(幼蟲)
Myxexoristops bicolor 兩色撑寄蠅(幼蟲和蛹)

2936. **Amsacta lactinea** (Cramer) 紅緣燈蛾 (Chang & Hung, 1986:84; Heppner et Inoue, 1992:170; Hun., 1992:928; Suzhou CS., 1985:213-214; Tsai, 1965:110; Yunn., 1987:1030; Zhang, 1987[ed.] 1:222; Zheng, 1982:213-214)
Phalaena lactinea Cramer, 1777:
別 名：*紅袖燈蛾*、*紅邊燈蛾*、*赤邊燈蛾*。
[Cotton caterpillar]
寄 主：柑橘、柿、草莓、咖啡、桑、馬尾松、楊、柳、黑荊樹、花櫚木、油茶、馬甲子、槐樹、紫穗槐、銀合歡、竹、烏桕、蓖麻、亞麻、棉、胡瓜、冬瓜、南瓜、越瓜、扁蒲、菜豆、豌豆、甘薯、馬鈴薯、芝麻、花生、玉米、高粱、煙、向日葵、大豆、綠豆、十字花科蔬菜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、越南、印尼、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。
天 敵：*Exorista sorbillans* (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

2937. **Arctia caja** (Linnaeus) 豹燈蛾 (ASZI, 1987, 2:185)
寄 主：桑、醋栗、甘藍、菊、蠶豆、接骨木、大麻。
分 佈：河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲、美國。

2938. **Asota paliura** Swinhoe 楔斑擬燈蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30-32)
寄 主：成蟲(吸果)吸食葡萄鮮果及爛果。
分 佈：湖南。

2939. **Asura strigipennis** (Herrich-Schäffer) 條紋艷苔蛾 (ASZI, 1987, 2:190; Heppner et Inoue., 1992:168; Zhao et al., 1997:190)
Raidia strigipennis Herrich-Schäffer, 1855:
=*Miltochrista sinica* Moore, 1877:
=*Lyclene terminata* Moore, 1878:
=*Lyclene discistriga* Moore, 1878:
寄 主：梂、柑橘。
分 佈：臺灣、福建、華東、湖南、廣東、廣西、雲南、四川；印尼、印度、錫金。

2940. **Callimorpha similis** (Moore) 黃腹麗燈蛾 (ASZI, ,1987, 2:189; Yunn., 1987:1029)
寄 主：桑、女貞、向日葵。

分 佈：雲南、西藏；錫金。

2941. **Camptoloma carum** Kishida 花布燈蛾 (Chao, 1982:269; Heppner et Inoue, 1992:187; Hun., 1992:929; Liu, 1982[ed.]:208-209; Wang, 1987[ed.]:217-219; Xiao, 1992:1039)
Camptoloma carum Kishida, 1984:
=*Camptoloma interiorata* auct. (*nec* Walker, 1865).
別 名：*黑頭櫟毛蟲*。
寄 主：板栗、刺槐、栓皮櫟、麻櫟、櫛栗、青岡櫟、槲櫟、楠、烏桕、櫧、東北楠、柳 (幼蟲取食葉、早春取食芽苞)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、江蘇、山東、陝西、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：病原微生物一種(幼蟲)
Pales pavida 刺蠅(幼蟲)
寄生蜂二種(幼蟲)

2942. **Carea varipes** Walker 姬白坦燈蛾 (Heppner et Inoue,1992:187; Hun., 1992:924)
Carea varipes Walker, 1857:
=*Chora curvifera* Walker, 1862:
=*Dabarita rhodophila* Walker, 1865:
別 名：*姬白污燈蛾*、*姬白燈蛾*。
寄 主：李、桑。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南、雲南、四川、陝西；日本、爪哇、沙勞越、緬甸、印度、錫金。

2943. **Chionaema coccinea** (Moore) 猩紅雪蘿蛾 (Luo et al., 1996:87)
寄 主：蓮霧。
分 佈：海南。

2944. **Chionaema phaedra** (Leech) 明雪蘿蛾 (ASZI, 1987, 2:189)
寄 主：桃、梨、蘋果。
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、湖北、陝西。

2945. **Creatonotos gangis** (Linnaeus) 黑條灰燈蛾 (ASZI, 1987, 2:184; Chang & Hung, 1986:85; Chao, 1982:269; Heppner at Inoue, 1992:170; Hun., 1992:928; Tsai, 1965:110; Weng et al., 1995(2):19-21; Yunn., 1987:1031; Zhang, 1987[ed.] 1:222)
Phalaena gangis Linnaeus, 1763:
=*Phalaena interrupta* Linnaeus, 1767:
寄 主：柑橘、咖啡、桑、馬尾松、茶、甘蔗、大豆。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、遼寧；日本、琉球、菲律賓、西里伯、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、澳洲、昆士蘭。
天 敵：*Carcelia kockiana* Townsend 善飛狹頰寄蠅

2946. **Creatonotos transiens** (Walker) 八點灰燈蛾 (ASZI, 1987, 2:184; Chang & Hung, 1986:85; Chao, 1982:269; Heppner et Inoue, 1992:170; Hun., 1992:929; Tsai, 1965110; Yunn., 1987:1031; Zhang, 1987[ed.] 1:222)
Spilosoma transiens Walker, 1855:

別 名：*灰燈蛾，黃腹燈蛾*。
寄 主：柑橘、桑、茶、稻、甘藷、馬鈴薯、茄、甘蔗、棉、蓖麻、絲瓜、十字花科蔬菜、豆類、向日葵、白茅、鴨跖草、竹、柏木、法桐、泡桐。
分 佈：臺灣、江西、華南、廣東、海南、雲南、西藏、四川、華東、華中、湖南、湖北、陝西、河南、山西；琉球、菲律賓、沙撈越、西里伯、越南、印尼、緬甸、印度、不丹、錫金。
天 敵：*Trichogramma chilonis* Ishii 螟黃眼蜂(卵)
Trichogramma japonicum Ashmead 稻螟赤眼蜂(卵)

2947. **Creatonotos transiens vacillans** Walker (Heppner et Inoue, 1992:170)
Creatonotos transiens vacillans Walker, 1855:
=*Creatonotos transiens koni* Miyake, 1909:
寄 主：
分 佈：臺灣、香港。

2948. **Cyana hamata** (Walker) 優雪蘚蛾 (ASZI, 1987, 2:190; Heppner et Inoue, 1992:167)
Bizone hamata Walker, 1854:
=*Chionaema hamata* var. *rectivitta* Strand, 1917:
寄 主：柑橘、玉米、棉、豆類。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

2949. **Diacrisia mori** Matsumura 桑葉黑燈蛾 (Chang et Hung, 1986:85)
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣。

2950. **Diacrisia rhodophila rhodophilodes** Hampson 桑燈蛾 (Chang et Hung, 1986:85; Tsai, :1965 10)
別 名：*桑葉白燈蛾*。
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣。

2951. **Diomea jankowskii** (Oberthür) 淡黃污燈蛾 (ASZI, 1987, 2:178; Heppner et Inoue, 1992:177)
Capnodes jankowskii Oberthür, 1880:
寄 主：珍珠梅、榛。
分 佈：西藏、雲南、四川、浙江、陝西、山西、河北、遼寧、黑龍江。

2952. **Hyphantria cunea** (Drury) 美國白蛾 (ASZI, 1987, 2:187; Chi et al., 1996, 22(6):18-20; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:261-262; Liu, 1982[ed.]:209-210; Liu et al., 1991, ; Shen-yang City, FPIPCS, 1995: ;Tan, 1995(2):19; Wang, 1987[ed.]:280-282; Wang, 1994, 20(5):52-53; Xiao, 1992:1040; Yang et Liang, 1996, 18(2):91-97)
別 名：*秋幕毛蟲，秋幕蛾*。
寄 主：極雜食，果樹、行道樹和觀賞樹木：蘋果、山楂、桃、李、海棠、梨、櫻桃、杏、葡萄、板栗、桑、糖槭、白臘、櫻花、楊、柳、懸鈴木、臭椿、榆、櫟、樺、刺槐、丁香、連翹、雪柳、山桃、小桃紅、五葉楓、南蛇藤、接骨木、爬山虎、繡球、珍珠梅、落葉松等，我國遼寧省發生區被害植物 100 多種，日本被害植物有 317 種，歐洲被害植物有 230 種，美國記載爲害 100 種以上的闊葉果樹、行道樹和林木、櫻桃、擄

匈牙利報道有 250 種植物。紅頭型幼蟲的寄主範圍較窄于黑頭型幼蟲。爲國際重要檢疫對象。

分 佈：陝西、山東、遼寧；北美、墨西哥、匈牙利、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞、奧地利、蘇聯、波蘭、保加利亞、朝鮮、日本。1979 年傳入我國遼寧丹東一帶。世界性檢疫害蟲。

天 敵：蜘蛛
Chrysopidae 草蛉科
Vespidae 胡蜂科
鳥類
多角體病毒(幼蟲)
顆粒體病毒(幼蟲)
白僵菌(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Conomoru patulum 金小蜂(蛹)
Psychophagus omnivorus (蛹)
Pleistophora schbergu (幼蟲)
Chouioia cunea Yang 白蛾周氏嚙小蜂
Clemelis pullata 寄蠅(幼蟲)
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅

2953. **Lemyra infernalis** (Butler) 坦燈蛾 (ASZI, 1987, 2:179; Heppner et Inoue, 1992:170; Hua., 1992:923)
Thanatarctia infernalis Butler, 1877:
別 名：*漆黑污燈蛾*。
寄 主：桃、李、梨、櫻桃、蘋果、桑、枸樹、柳等。
分 佈：湖南、江西、浙江、陝西、北京、遼寧；日本。

2954. **Lithosia quadra** (Linnaeus) 四點苔蛾 (ASZI, 1987, 2:189)
寄 主：蘋果、樟子松、地衣。
分 佈：雲南、江西、陝西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲。

2955. **Meganola albula** (Denis et Schiffermüller) 褐白洛瘤蛾 (ASZI, 1987, 2:191; Heppner et Inoue., 1992: 188)
Noctua albula Denis & Schiffermüller, 1775:
=*Pyralis albulalis* Hübner, 1796: emend.
=*Roeselia albulana* Hübner, 1825: emend.
=*Nola albula* var. *nivalis* Caradja, 1934:
寄 主：懸鉤子屬植物。
分 佈：江西、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

2956. **Meganola albula formosana** Wileman & West (Heppner et Inoue., 1992:188)
Roeselia albula formosana Wileman & West, 1928:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2957. **Melanographia flexilineata** Hampson 枇杷瘤蛾 (ASZI,1987, 2:191; Fang, 1980:37; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:381-382)

別 名：*枇杷黃毛蟲*。
寄 主：枇杷。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北；印度。
天 敵：*Charops* sp.　懸繭姬蜂
Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Goryphus basilaris Holmgren　橫帶溝姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla nana aequabilis Krieger　黃毛蟲黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Meteorus versicolor (Wesmael)　虹彩懸繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂(蛹)
金小蜂
寄生菌

2958. **Mimerastria mandschuriana** (Oberthür) 蘋米瘤蛾 (ASZI, 1987, 2:191)
寄 主：蘋果、櫟、青岡樹。
分 佈：四川、江西、北京、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

2959. **Nyctemera adversata** (Schaller) 粉蝶燈蛾 (ASZI, 1987, 2:188, Heppner et Inoue, 1992:169; Hun., 1992:931; Yunn., 1987:1028; Zhang, 1987[ed.] 1:225)
Phalaena adversata Schaller, 1788:
=*Nyctemera plagita* Walker, 1854:
=*Nyctemera lacticolora* Reich, 1926:
=*Nyctemera lacticolor* Reich, 1932:　emend.
寄 主：柑橘、無花果、菊科、狗舌草。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江；日本、馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

2960. **Parasemia planataginis** Linnaeus 車前燈蛾 (ASZI, 1987, 2:183)
寄 主：落葉松、車前、蔓櫻草。
分 佈：四川、青海、山西、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、加拿大、美國。

2961. **Siccia ynigra** Hampson 昏干蓑蛾 (ASZI, 1987, 2:190)
寄 主：杏。
分 佈：四川、江西、上海、河南、河北、黑龍江。

2962. **Spilarctia flammeola** (Moore) *火焰污燈蛾* (Zhao et al., 1997:190)
寄 主：栜。
分 佈：福建。

2963. **Spilarctia imparilis** Butler 桑斑燈蛾 (Suzhou CS., 1985:213-214)
Spilarctia imparilis Butler,
寄 主：桑。
分 佈：江蘇。

2964. **Spilarctia lubricipede** Linnaeus 黃腹燈蛾 (Suzhou CS., 1985:213-214; Zheng, 1982:213-214)
Spilarctia lubricipede Linnaeus,
寄 主：雜食，桑、棉、大豆、玉米、麥類、馬鈴薯、甘薯、綠肥、蔬菜等。

分 佈：全國。

2965. **Spilarctia melli** Daniel 近日污燈蛾 (Xiao, 1992:1042)
寄 主：核桃、山杏、葡萄、桑、泡桐、白蠟、楸、榆、臭椿、月季、北京楊、新疆楊、束槐、牽牛花等。
分 佈：雲南、浙江、陝西、甘肅、山西。
天 敵：*Chrysopa kulingensis* Navás 牯嶺草蛉(卵,初孵幼蟲)
斯馬蜂(幼蟲)
鳥類：白山雀、灰山雀(成蟲,幼蟲)

2966. **Spilarctia oblique** (Walker) 塵污燈蛾 (ASZI, 1987, 2:178; Chang et Hung, 1986:85; Chao, 1982:269; Tsai, 1965:110; Yunn., 1987:1036; Zhang, 1987[ed.] 1:223)
Diacrisia oblique Walker,
別 名：*人紋燈蛾、塵白燈蛾、黃腹燈蛾*。
寄 主：桑、茶、葡萄、棉花、黃麻、甘薯、玉米、花生、芝麻、豆類、蔬菜、萵苣、十字花科蔬菜、向日葵、柳、泡桐。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西；朝鮮、日本、緬甸、印度、錫金、不丹、尼泊爾、巴基斯坦。
天 敵：*Apanteles bosei* Bhatnagar 波氏絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂(卵)
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy 尖音狹頰寄蠅
Carcelia sumatrana Townsend 蘇門答臘狹頰寄蠅

2967. **Spilarctia punctaria** Cramer 點污燈蛾 (Chang et Hung, 1986:85)
寄 主：柿、桑。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、阿穆爾。

2968. **Spilarctia rhodophila** (Walker) 姬白污燈蛾 (ASZI, 1987, 2:180; Chang et Hung, 1986:85; Yunn., 1987:1034)
寄 主：李、桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、東北；日本、緬甸、印度、錫金。

2969. **Spilarctia rhodophila unilinea** (Rothschild) 姬白污燈蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:223)
寄 主：李、桑、芥菜、玫瑰、薔薇。
分 佈：江西。

2970. **Spilarctia seriatopunctata** (Motschulsky) 連星污燈蛾 (ASZI, 1987, 2:178; Chao, 1982:269; Zhang, 1987[ed.] 1:224)
寄 主：蘋果、桑、芥菜、葵菜、蔬菜。
分 佈：福建、江西、四川、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

2971. **Spilarctia subcarnea** Walker 桑葉黃燈蛾 (ASZI, 1987, 2:179; Chang & Hung, 1986:85; Heppner et al., 1992:170; Hun., 1992:926; Suzhou CS., 1985:213-214; Tan, 1980:247; Tsai, 1965:110; Yunn., 1987:1033; Zheng, 1982:)
Spilarctia subcarnea Walker, 1855:
=*Aloa bifrons* Walker, 1855:

=*Diacrisia* ab. *albipalpata* Matsumura, 1927:
別 名：*紅腹燈蛾、人紋污燈蛾、紅腹污燈蛾、紅腹白燈蛾、人字紋燈蛾*。
寄 主：梨、桃、梅、葡萄、柿、桑樹、山櫻花、榆、楊、柳、槐樹、木槿、薔薇、茄、十字花科蔬、菜豆類、瓜類、玉米、高粱、粟、甘薯、芝麻、煙草、棉花、向日葵、綠肥。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、雲南、四川、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、山東、河南、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、菲律賓。
天 敵：*Enicospilus lineolatus* (Roman) 細線細顎姬蜂(幼蟲)
Apanteles bosei Bhatnagar 波氏絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣腿小蜂(蛹)

2972. **Spilosoma imparilis** Bütler 桑斑燈蛾 (Zheng, 1982:213-214)
Spilosoma imparilis Bütler,
寄 主：桑、棉、大豆、玉米、麥類、馬鈴薯、甘薯、綠肥、蔬菜等。
分 佈：全國。

2973. **Spilosoma menthastri** (Esper) 星白雪燈蛾 (ASZI, 1987, 2:180; Hun, 1992:927; Yunn., 1987:1033; Zhang, 1987[ed.] 1:224)
寄 主：梨、桑、馬桑、馬尾松、水稻、芥菜、白菜、蘿蔔、向日葵、青岡櫟、木槿、油茶、楊、柳、楓楊、懸鈴木、法桐、千丈、甜菜、薄荷、蒲公英、蓼、杠板歸。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

2974. **Spilosoma urticae** (Esper) 稀點雪燈蛾 (ASZI, 1987, 2:180, Ren, 1987:86-88)
寄 主：西紅柿、桃、李、桑、玉米、豆類、棉花、甘薯、蓖麻、芝麻、向日葵、麻類、瓜類、小麥、高粱、穀子、黍子、苜蓿、白菜、辣椒、茄子、酸模屬、薄荷、柳、榆、泡桐、紫穗槐等。
分 佈：浙江、江蘇、河北、黑龍江；歐洲。

2975. **Spirama inaequails** (Butler) 角紋燈蛾 (Chang & Hung, 1986:86; Heppner et Inoue, 1992:181)
=*Phalaena retorta* Clerck, 1759:
=*Noctua spiralis* Fabricius, 1775:
=*Erebus chimista* Kollar, 1844:
=*Spirama isabella* Guenée, 1852:
=*Spirama suffumosa* Guenée, 1852:
=*Spirama cohaerens* Walker, 1858:
=*Hypopyra martha* Butler, 1878:
=*Spirama simplicior* Butler, 1881:
=*Spirama jinchuena* Butler, 1883:
Spirama inaequalis Butler, 1883:
寄 主：桑、櫻花、水金京、高粱泡。
分 佈：臺灣；日本。

2976. **Stigmatophora flava** (Motschulsky) 黃痣苔蛾 (ASZI, 1987, 2:190)
寄 主：桑、玉米、高粱、牛毛氈。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、山東、

山西、陝西、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

2977. **Utetheisa lotrix** (Cramer) 擬三色星燈蛾 (ASZI, 1987, 2:186; Heppner et Inoue, 1992:169)
Geometra lotrix Cramer, 1777:
=*Utethisa indica* Roepke, 1941:
寄 主：苗木、豬屎豆、太陽麻、大眼蘭、木豆、甘蔗。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川；日本、菲律賓、越南、印尼、新加坡、緬甸、印度、錫金、澳洲、新西蘭。

2978. **Utetheisa pulchella tenuella** Seitz 紅星燈蛾 (Luo, 1991:87)
寄 主：腰果(嫩梢)。
分 佈：海南。

Hypsiidae 擬燈蛾科

2979. **Asota caricae** (Fabricius) 一點擬燈蛾 (ASZI, 1987, 2:192; Heppner et Inoue, 1992:171; Hun., 1992:944; Yunn., 1987:1038)
Noctua caricae Fabricius, 1775:
=*Phalaena alciphron* Cramer, 1777:
別 名：*一點烏燈蛾*。
寄 主：野無花果、榕樹、油茶、母生樹、鐵刀木等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川；菲律賓、印度、斯里蘭卡、澳洲。

2980. **Asota tortuosa** (Moore) 扭擬燈蛾 (ASZI, 1987, 2:192; Heppner et Inoue, 1992:171; Hun., 1992:944; Yunn., 1987:1038)
Neochera tortuosa Moore, 1872:
寄 主：李、柑橘。
分 佈：湖南、雲南、四川；印度、錫金。

2981. **Digma abietis** Leech 杉擬燈蛾 (Hun., 1992:944)
寄 主：馬尾松。
分 佈：江西、湖南、廣西、江蘇。

2982. **Neochera dominia** (Cramer) 鉛閃擬燈蛾 (ASZI, 1987, 2:193; Heppner et Inoue, 1992:171)
Phalaena dominia Cramer, 1780:
=*Hypsa radiata* Matsumura, 1916:,
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁。
分 佈：臺灣、廣東、雲南；菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、錫金。

2983. **Peridrome orbicularis** Walker 圓擬燈蛾 (ASZI, 1987, 2:192)
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁。
分 佈：海南島；緬甸；印度、錫金。

Amatidae 鹿蛾科 (Ctenuchidae Euchromiidae)

2984. **Amata ganssuensis** (Grum-Grshimailo) 黑鹿蛾 (Zhao et al., 1997:190)

寄 主：榛。
分 佈：福建。

2985. **Amata germana** Felder 蕾鹿蛾 (Chen et al., 1992:209-211)
寄 主：桑、橘、茶、蓖麻、黑荆等。
分 佈：雲南、華南、華東；日本、印尼。
天 敵：*Coccygomimus parnarae* Viereck　稻苞蟲黑瘤姬蜂
Xanthopipla puctata (Fabricius)　廣黑點瘤姬蜂
Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅

2986. **Amata hirayamae** Matsumura 蕾鹿蛾 (ASZI, 1987, 2:193; Chang & Hung, 1986:84; Heppner et Inoue, 1992:171; Hun., 1992:946; Xiao, 1992:1036; Yunn., 1987:1026)
Amata hirayamae Matsumura, 1927:
=*Amata germana* auct., partum.　(*nec* Felder, 1862)
寄 主：柑橘、桑、櫻、茶、大豆、蓖麻、黑荆樹、薔薇類等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、華南、華東、東北；朝鮮、日本、印尼、阿穆爾。
天 敵：白僵菌(幼蟲)
Xanthopimpla punctata (Fabricius)　廣黑點瘤姬蜂
Exorista civilis Rondani　傘裙追寄蠅

2987. **Amata luteifascia** Hampson 荔枝鹿蛾 (Luo, 1991:87)
寄 主：腰果。
分 佈：海南。

2988. **Amata pascus** (Leech) 牧鹿蛾 (Hun., 1992:947; Yunn., 1987:1026)
寄 主：華山松、馬尾松、核桃、楷木、白夾竹、青杠、榆、漆樹、柏樹。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、陝西。

2989. **Amata perixanthia** (Hampson) 柑鹿蛾 (Chang & Hung, 1986:84; Heppner et Inoue, 1992:171; Tsai, 1965:110)
Syntomis perixanthia Hampson, 1898:
=*Syntomis interrupta* Wileman, 1910:
=*Syntomis perixanthoides* Strand, 1915:
寄 主：柑橘類、茶樹。
分 佈：臺灣、西藏；印度。

2990. **Amata sinensis sinensis** Rothschila 中華鹿蛾 (Luo et Jin, 1995:87; Luo et al., 1996:61)
寄 主：酪梨、檬果。
分 佈：海南。

2991. **Amata sperbius** (Fabricius) 南鹿蛾 (ASZI, 1987, 2:193; Yunn., 1987:1025)
寄 主：桑、女貞。
分 佈：廣東、廣西、雲南；泰國、緬甸、印度、不丹、日本。

2992. **Caeneressa diaphana** (Kollar) 清新鹿蛾 (Heppner et Inoue, 1992:171; Yunn., 1987:1025)
Syntomis diaphana Kollar, 1844:

=*Syntomis vitreata* Herrich-Schäffer, 1855:
=*Hydrusa baiaea* Swinhoe, 1891:
=*Caeneressa muirheadi* auct., partum. (*nec* Felder, 1862).
=*Syntomis horishana* Matsumura, 1911:
=*Syntomis hoppo* Matsumura, 1911:
寄 主：核桃、馬尾松、白夾竹、楠竹、櫧木、杉木、青杠、漆樹等。
分 佈：臺灣、華南、雲南、四川；緬甸、印度、尼泊爾。

2993. **Ceryx imaon** (Cramer) 伊貝鹿蛾 (Luo et Jin, 1995:87; Luo et al., 1996:61)
寄 主：酪梨、檬果。
分 佈：海南。

Nolidae 瘤蛾科

2994. **Meganola albula** (Denis et Schiffermüller) 褐白洛瘤蛾 (Heppner et Inoue, 1992:188; Hun., 1992: 932)
Noctua albula Denis et Schiffermüller, 1775:
=*Pyralis albulalis* Hübner, 1796: emend.
=*Roeselia albulana* Hübner, 1825: emend.
=*Nola albula* var. *nivalis* Caradja, 1934.
寄 主：懸鉤子屬植物。
分 佈：江西、湖南、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

2995. **Meganola albula formosana** (Wileman & West) 臺灣瘤蛾 (Heppner et Inoue, 1992:188)
Roeselia albula formosana Wileman & West, 1928:
寄 主：
分 佈：臺灣。

2996. **Melanographia flexilineata** Hampson 枇杷瘤蛾 (Huang et Gao, 1996:227; Zhang, 1987[ed.] 1:231)
寄 主：枇杷。
分 佈：福建、江西、長江以南各省。

2997. **Mimerastria mandschuriana** (Oberthür) 蘋米瘤蛾 (Hun.,1992 :932; Zhang, 1987[ed.] 1:231)
別 名：*蘋果瘤蛾*。
寄 主：蘋果葉、梨、櫟、青岡樹等。
分 佈：江西、湖南、四川、河南、北京、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

2998. **Nola distributa** Walker 核桃瘤蛾 (ASZI, 1987, 2:191; Chen et Wang, 1987:204-205; Huang, 1990[ed.] 2:333-335; Liu, 1982[ed.]:375-376; NZWDI, 1981:1767; Wang, 1987[ed.]:187-189;)
寄 主：核桃(葉片)，爲北方核桃產區重要害蟲
分 佈：雲南、上海、陝西、河南、山西、河北、北京；印尼、緬甸、印度、錫金、不丹。

2999. **Nola taeniata** Snellen 稻穗點瘤蛾 (ASZI, 1987, 2:190; Chao, 1982:270; Heppner et Inoue, 1992:187; Hun.,1992 :932; Zhang, 1987[ed.] 1:230)
Nola taeniata Snellen, 1875:
=*Nola candida* Butler, 1879:
=*Roeselia fragilis* Swinhoe, 1890:

=*Sorocostia mesozona* Lucas, 1890:
=*Celama anpingicola* Strand, 1917:
寄 主：桑、水稻、棉、苜蓿、木賊、問荊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、浙江、湖北、江蘇；日本、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。

3000. **Nola** sp. 梨瘤蛾 (Shaanxi et Hunan, 1990:19)
寄 主：梨。
分 佈：福建、廣東、江西、浙江、江蘇、湖北、陝西、河南、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。
天 敵：*Pristomerus chinensis* Ashmead　中華齒瘤姬蜂(幼蟲)
Scambus sp.　梨瘿蛾曲姬蜂
Apanteles sp.　梨瘿蛾絨繭蜂(幼蟲)

3001. **Roeselia albula** Denis et Schiffermüller 褐白洛瘤蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:231)
寄 主：懸鉤子屬。
分 佈：江西。

Agaristidae 虎蛾科

3002. **Chelonomorpha japona** Motschusky 日龜虎蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:273)
寄 主：梨。
分 佈：江西。

3003. **Sarbanissa subflava** (Moore) 葡萄修虎蛾 (ASZI, 1987, 2:243; He et al., 1993(4):47; Heppner et Inoue, 1992:193; Huang, 1990[ed.] 2:373; Hun., 1992:1042; Lu, 1996(2):48-49; Zhang, 1987[ed.] 1:274; Zhao et al., 1996(3):43)
Seudyra subflava Moore, 1877:
=*Zalissa jankowskii* Alphraky, 1897:
=*Seudyra japonica* Bytinski-Salz, 1939:
別 名：*葡萄虎蛾*。
寄 主：葡萄、爬山虎。
分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、江西、湖北、山東、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

3004. **Scrobigera amatrix** Westwood 愛委虎蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:273)
寄 主：烏斂莓。
分 佈：江西。

3005. **Seudyra transiens** (Walker) 修虎蛾 (ASZI, 1987, 2:244; Hun., 1992:1042; Yunn., 1987:1094; Zhang, 1987[ed.] 1:274)
=*Phaegorista catocaloides* Walker,
=*Agarista aegoceroides* Felder,
=*Seudyra dissimilis* Swinhoe,
別 名：*白斑葡萄虎蛾*。
寄 主：葡萄。
分 佈：江西、湖南、雲南；馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

3006. **Lithophane venusta** (Leech) 艷修虎蛾 (ASZI, 1987, 2:243; Heppner et Inoue, 1992:197; Hun., 1992:1042; Zhang, 1987[ed.] 1:274)
Lamprosticta venusta Leech, 1889:
別 名：*艷虎蛾*。
寄 主：葡萄。
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本。

3007. **Lithophane venusta yazakii** Yoshimoto (Heppner et Inoue, 1992:197)
Lithophane venusta yazakii Yoshimoto, 1988:
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

Noctuidae 夜蛾科

(Chen, 1986, viii+1-213; 吸果夜蛾: Chen et al., 1996(4):61; Chen et al., 2000(1):23-24; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Zhang et Hou, 1998(2):12; Zhu, 1993(2):44-45)

3008. **Achaea janata** (Linnaeus) 飛揚阿夜蛾 (ASZI, 1987, 2:233; Chang & Hung, 1986:87; Chao, 1982:261; Heppner et Inoue, 1992:182; Tsai, 1965:113; Yunn., 1987:1072)
Phalaena janata Linnaeus, 1758:
=*Noctua melicerta* Drury, 1773:
=*Phalaena tigrina* Fabricius, 1775:
=*Caticala traversii* Fereday, 1877:
=*Ophiusa ekeikei* Bethune-Baker, 1906:
別 名：*三點粗腳蛾*。
寄 主：成蟲(吸食果汁)吸食檬果、黃皮，常見於梨、蘋果、桃的爛果上；幼蟲為害可可樹、蓖麻、臺灣相思、飛楊草。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、湖北；日本、琉球、菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、南太平洋諸島、紐西蘭、大西洋。

3009. **Achaea serva** (Fabricius) 人心果阿夜蛾 (ASZI, 1987, 2:233; Heppner et Inoue, 1992:182; Yunn., 1987:1072)
=*Noctua serva* Fabricius, 1775:
=*Achaea fasciculipes* Walker, 1858:
=*Achaea ministra* Prout, 1919:
=*Achaea pentasema* Prout, 1919:
寄 主：人心果。
分 佈：廣東、雲南；新加坡、印尼(沙勞越)、緬甸、印度、馬達加斯加、大西洋、太平洋洲、新喀里多尼亞、新幾內亞、澳洲。

3010. **Acronicta aceris** Linnaeus 銳劍紋夜蛾 (Xiao, 1992:1044)
寄 主：蘋果、旱柳、白蠟、榆。
分 佈：陝西、寧夏、甘肅、內蒙古、新疆。

3011. **Acronicta auricoma** Schiffermüller 華劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:196)
寄 主：懸鉤子、樺、櫟等屬植物。
分 佈：河北、黑龍江；蘇聯、歐洲。

3012. **Acronicta euphorbiae** Schiffermüller 戟劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:198)

寄 主：楊梅、樺、歐石楠等屬植物。
分 佈：河北、新疆、黑龍江；蘇聯、土耳其、歐洲。

3013. **Acronicta gigasa** B. S. Chang 大安鈕夜蛾 (Chang & Hung, 1986:88; Heppner et Inoue, 1992:191; Xi, 1993:47; Suzhou CS., 1985:206-208)
=*Apatele major* auct. (*nec* Bremer, 1861).
Acronicta gigasa B. S. Chang 1991:
別 名：*桑白毛蟲、桑夜蛾、劍蛾、黃毛蟲*。
寄 主：蘋果、桃、杏、梅、桑、山櫻花、香椿、刺槐。
分 佈：臺灣、江西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞、印度。

3014. **Acronicta intermedia** (Warren) 桃劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:196; Chen et Wang, 1987:51; Heppner et Inoue, 1992:192; Hun., 1992:953; Xi, 1993:47; Yu et Zhao, 1998(4):11; Yunn., 1987:1054; Zhang, 1987[ed.] 1:233)
Acronita increta Butler, 1878: preocc. (*nec* Morrison, 1857)
Acronycta intermedia Warren, 1909: Repl. name.
=*Acronycta incretata* Hampson, 1909: Repl. name.
=*Acronycta jezoensis* Matsumura, 1925:
=*Acronycta formosana* Matsumura, 1928:
別 名：*蘋果劍紋夜蛾*。
寄 主：桃、梨、櫻桃、梅、蘋果、杏、李、核桃等果樹、楊、柳、榆。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、四川、安徽、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

3015. **Acronicta major** Bremer 桑劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:197; Hun., 1992:954; Yunn., 1987:1054; Zhang, 1987[ed.] 1:233)
寄 主：桑、桃、梅、李、杏、柑橘、花卉等。
分 佈：江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、河北、遼寧、黑龍江；日本、蘇聯。
天 敵：*Metopius dissecterius dissecterius* (Panz.) 桑夜蛾盾臉姬蜂(幼蟲)
Netelia (s. str.) *ocellaris* (Thomson) 甘藍夜蛾擬瘦姬蜂(幼蟲)
Ophion luteus (Linnaeus) 夜蛾瘦姬蜂(幼蟲)

3016. **Acronicta pruinosa** (Guenée) 白腹圈紋夜蛾 (Chang & Hung, 1986:87; Heppner et Inoue, 1992:192; Tsai, 1965:113)
Acronycta pruinosa Guenée, 1852:
=*Polia soluta* Walker, 1856:
=*Acronycta consanguis* Butler, 1879:
=*Acronycta asiatica* Poujade, 1888:
寄 主：柑橘類、藤胡頹子、鄧氏胡頹子、胡頹子。
分 佈：臺灣、西藏；日本、印尼、印度。

3017. **Acronicta psi** (Linnaeus) 賽劍紋夜蛾 (ASZI, 1987,2:198; Chang & Hung, 1986:87, 88; Tsai, 1965:113)
Apatele psi Linnaeus,
別 名：*梨劍紋夜蛾、北夜蛾*。
寄 主：蘋果、梨、李、枇杷、山櫻花、薔薇類、柑橘、赤楊、榭樹、楊、柳、樺、薔薇等植物。
分 佈：臺灣、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(烏蘇里、阿穆爾)、小亞細亞、歐洲。

3018. **Acronicta rumicis** (Linnaeus) 梨劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:196; Chao, 1982:261; Chen et Wang, 1987:51; Hun., 1992:952; Xi, 1993:47; Yunn., 1987:1053; Zhang, 1987[ed.] 1:233; Zhao et al., 1997:190)

寄 主：梨、桃、蘋果、梅、李、榛、杏、山楂、懸鉤子等果樹、楊、柳、泡桐、烏桕、多種低矮植物、蓼、棉、玉米、大豆、豌豆、蠶豆、十字花科蔬菜。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、新疆、遼寧、黑龍江；日本、蘇聯、亞洲(西部)、敘利亞、土耳其、歐洲。

3019. **Acronicta strigosa** (Schiffermüller) 果劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:196; Chao, 1982:261; Chen et Wang, 1987:51; Hun., 1992:952; Yunn., 1987:1056; Zhang, 1987[ed.] 1:233)

寄 主：梨、山楂、桃、蘋果、李、杏、梅、櫻桃。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、陝西、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

3020. **Acronicta tridens** Schiffermüller 三齒劍紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:197)

寄 主：山楂、櫟、樺等屬植物。

分 佈：甘肅、新疆、黑龍江；蘇聯、敘利亞、歐洲。

3021. **Adris tyrannus** (Guenée) 枯葉夜蛾 (Chang & Hung, 1986:87; Chen, 1995(3):38; Chen et Wang, 1987:33; Heppner et Inoue, 1992:180; Huang, 1990[ed.] 2:251; Huang et Gao, 1996:192; Hun., 1992:1020; Luo et al., 1996:60; NZWDI, 1981:1697, 1919; Tsai, 1965:112; Wu et Chou, 1985:165-172; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1080; Zhang, 1987[ed.] 1:263; Zhang, 1988:442)

Ophideres tyrannus Guenée, 1852:

=*Ophideres amurensis* Staudinger, 1892:

別 名：*通草木葉蛾*。

寄 主：成蟲(吸食果汁)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、葡萄、枇杷、無花果、檬果等果汁、幼蟲爲害木通 (*Akbia quinata* Dcne)、木防己、十大功勞 (*Berberis bealei* Fort)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、東西伯利亞、印度。

3022. **Agrotis exclamationis** (Linnaeus) 警紋地老虎 (Chen, 1986:37-38; Chen et al., 1993:92)

寄 主：棗、甘藍屬、繁縷、車前屬、酸模屬、藜屬、前胡屬等。

分 佈：西藏、新疆、內蒙古、黑龍江；蘇聯、歐洲。

3023. **Agrotis segetum** (Schiffermüller) 黃地老虎 (Chao, 1982:264; Chen, 1986:38-40; Chen et al., 1993:91; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:171-173; Heppner et Inoue, 1992:200; Huang, 1990[ed.] 2:393-398; Hun., 1992:961; Liu, 1982[ed.]:162-165; Suzhou CS., 1983:241-243; Wang, 1987[ed.]:341-343; Wu et Wu, 1998:41-42; Xioa,1992 :1048; Yunn., 1987:1058; Zhang, 1987[ed.] 1:241; Zheng, 1982:241-243)

Noctua segetum Denis & Schiffermüller, 1775:

=*Noctua sordida* Denis & Schiffermüller, 1775:

=*Noctua segetis* Fabricius, 1794: Emend.

=*Bombyx catenatus* Haworth, 1803:

=*Bombyx connexus* Haworth, 1803:

=*Bombyx monileus* Haworth, 1803:

=*Bombyx nigricornutus* Haworth, 1803:

=*Bombyx pectinatus* Haworth, 1803:

=*Bombyx subatratus* Haworth, 1803:
=*Noctua fervida* Hübner, 1824:
=*Agrotis segetum* var. *affinis* Stephens, 1829:
=*Agrotis sicula* Boisduval, 1840:
=*Agrotis dimidia* Zeller, 1847:
=*Agrotis sicania* Guenée, 1852:
=*Agrotis aversa* Walker, 1857:
=*Agrotis correcta* Walker, 1857:
=*Agrotis marginalis* Walker, 1857:
=*Agrotis obliviosa* Walker, 1857:
=*Agrotis denticulosa* Walleingren, 1860:
=*Agrotis certificata* Walker, 1865:
=*Agrotis conspurcata* Walker, 1865:
=*Agrotis repulsa* Walker, 1865:
=*Agrotis ingrata* Bulter, 1878:
=*Agrotis fucosa* Butler, 1881:
=*Agrotis lassa* Swinhoe, 1886:
=*Agrotis segetum* f. *albiptera* Turati, 1921:
=*Noctua glaucina* Kozhantshikow, 9123:

寄 主：雜食性，桑(苗)、棉花、玉米、小麥、高粱、煙草、棉、麻、甜菜、馬鈴薯、瓜類、多種蔬菜及松、櫟、山楊、杉、柏及多種農作物和苗木、棗。在雨量較少的新疆、甘肅河西、青海西部及內蒙古部分地區造成嚴重災。

分 佈：江西、湖南、雲南、西南、中南、華東、華北、西北、東北；朝鮮、日本、蘇聯、印度、錫金、亞洲、非洲、歐洲。

天 敵：*Calosoma maderae chinense* Kirby　中華金星步甲
Ctenichneumon panzeri susuki (Matsumura)　地蠶大凹盜蜂(幼蟲)
Eutanyacra picia (Schrank)　地蠶大鋏盜蜂(幼蟲)
Ophion luteus (Linnaeus)　夜蛾瘦盜蜂
Trichogramma evanescens Westwood　廣赤眼蜂(卵)
Trichogramma pintoi Voegele　暗黑赤眼蜂(卵)
Linnaemyia compta (Fallén)　飾額短鬚寄蠅
Salmacia bimaculata Wiedemann　雙斑撒寄蠅
Wagneria nigrans Meigen　黑頭猛寄蠅

3024. **Agrotis tokionis** Butler 大地老虎 (Beijing FC., 1980[ed.]:161-162; Chao, 1982:261; Chen, 1986:36-37; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:171-173; Huang, 1990[ed.] 2:393-398; Hun., 1992:961; Liu, 1982[ed.]:162-165; Suzhou CS., 1985:241-243; Wang, 1987[ed.]:341-343; Wu et Wu, 1998:41-42; Zhang, 1987[ed.] 1:241; Zheng, 1982:241-243)

寄 主：桑(苗)、果樹及林木幼苗、大麥、小麥、蠶豆、豌豆、十字花科蔬菜、棉花、玉米、高粱、馬鈴薯、煙草等。

分 佈：福建、江西、湖南、全國各地；日本、蘇聯。

天 敵：*Calosoma maderae chinense* Kirby　中華金星步甲
Ophion luteus (Linnaeus)　夜蛾瘦盜蜂

3025. **Agrotis vestigialis** (Rottemberg) 佚地夜蛾 (Chen, 1986:43-44)

寄 主：萵苣、蓬子菜、繁縷、蒲公英、白豬殃殃、千里光、蚤綴等屬，在蘇聯為害松樹幼苗

分 佈：新疆；蘇聯、歐洲。

3026. **Agrotis ypsilon** (Rottenberg) 小地老虎 (Beijing FC., 1980[ed.]:159-161; Cao et al., 1990, 24(30:368-373; Chang & Hung, 1986:88; Chao, 1982:261; Chen, 1986:34-36; Chen et al., 1993:90; Heilongjiang, Mudingjiang FS., 1988[ed.]:171-173; Huang, 1990[ed.] 2:393-398; Hun., 1992:961; Li et Wu, 1994, 11(3):194; Liang et Liu, 1958:43-47; Liu, 1982[ed.]:162-165; Luo et al., 1999, 26(3):225-229; Suzhou CS., 1985:241-243; Wang, 1987[ed.]:341-343; Wang et al., 1987, 14(1):9-14; Wu et Wu, 1998:41-42; Xiao, 1992:1045; Yunn., 1987:1058; Zhang, 1985[ed.]:249-250; Zhang, 1987[ed.] 1:241; Zhang et al., 1982, 19(3):19-22; Zheng, 1982:241-243; Zhu et al., 1993, 20(4):325-330)

別 名：*球菜夜蛾、切根蟲、土蟲、沙蟲、夜盜蟲、烏肚蟲*。

寄 主：雜食性，柑橘、梨、桃、棗、咖啡、桑、紅松、茶、楊、水曲柳、泡桐，杉、胡桃楸、椴、蓖麻、魚藤等多種果樹，林木苗木及各種作物和蔬菜幼苗等

分 佈：廣布性種類，臺灣、福建、江西、湖南、雲南，全國各地；世界各地。

天 敵：*Calosoma maderae chinense* Kirby 中華金星步甲

鳥類：知更鳥、鴉雀

蟾蜍

鼬鼠

細菌

真菌

Ctenichneumon panzeri susukii (Matsumura) 地蠶大凹姬蜂(幼蟲)

Enicospilus dasychirae Cameron 茸毒蛾細顎姬蜂(幼蟲)

Netelia (s. str.) *ocellaris* (Thomson) 甘藍夜蛾擬瘦姬蜂(幼蟲)

Ophion luteus (Linnaeus) 夜蛾瘦姬蜂(幼蟲)

Ophion pungens 瘦姬蜂

Apanteles ruficrus (Haliday) 螟蛉絨繭蜂

Meteorus rubens (Nees von Esenbeck) 伏虎懸繭蜂(幼蟲)

繭蜂(寄生率達 10 %)

Cuphocera varia (Fabricius) 粘蟲缺須寄蠅

Exorista fallax Meigen 傘裙追寄蠅

Gonia chinensis Wiedemann 中華膝芒寄蠅

Isomera cinerascens Rondani 灰等腿寄蠅

Linnaemyia compta (Fallén) 飾額短鬃寄蠅

Linnaemyia zachvatkini Zimin 粘蟲側須寄蠅

Salmacia bimaculata Wiedemann 雙斑撒寄蠅

Turanogonia chinensis Wiedemann 夜蛾土藍寄蠅

Wagneria nigrans Meigen 黑頭猛寄蠅

3027. **Amathes baja** (Schiffermüller) 魯夜蛾 (Chen, 1986:148-149)

寄 主：山楂、柳、樺、報春等屬及多種草本植物。

分 佈：新疆；蘇聯、歐洲。

3028. **Amathes c-nigrum** (Linnaeus) 八字地老虎 (Chen, 1986:156; Chen et al., 1993:93; Yunn., :1059; Zhang, 1987[ed.] 1:241)

=*Agrotis c-nigrum* (Linnaeus)

寄 主：雜食性，葡萄、甜菜苗、禾穀類，玉米、馬鈴薯、茄、番茄、豌豆、棉、醋栗、柳、酸模、牛蒡、野芝麻、車前、繁縷等。

分 佈：江西、雲南，全國各地；亞洲、歐洲、美洲。

天 敵：*Ctenichneumon panzeri susukii* (Matsumura) 地蠶大凹姬蜂(幼蟲)

3029. **Amathes ditrapezium** (Schiffermüller) 兀魯夜蛾 (ASZI, 1987, 2:207; Chen, 1986:166-167)
寄 主：懸鈎子、柳、酸模等屬植物。
分 佈：陝西、河北、新疆、黑龍江；蘇聯、歐洲。

3030. **Amathes sexstrigata** (Haworth)褐脈魯夜蛾 (Chen, 1986:150-151)
寄 主：懸鈎子、酸模、車前等屬。
分 佈：新疆；歐洲。

3031. **Amathes tabida** Butler 消魯夜蛾 (ASZI, 1987, 2:207)
寄 主：山楂、樺、報春等屬植物。
分 佈：新疆、黑龍江；日本。

3032. **Amathes triangulum** (Hufnagel) 三角魯夜蛾 (Chen, 1986:163-164)
寄 主：山楂、烏刺李、柳屬、繁縷屬、酸模屬、大戟屬、報春屬等。
分 佈：黑龍江；印度、蘇聯、歐洲。

3033. **Amathes xanthographa** (Schiffermüller) 淡紋魯夜蛾 (Chen, 1986:175-176)
寄 主：山楂屬、酸模屬、車前屬、早熟禾屬、柳屬等
分 佈：新疆；蘇聯、土耳其、敘利亞、歐洲。

3034. **Amphipyra pramlidea** (Linnaeus) 果紅裙雜夜蛾 (ASZI, 1987, 2:200; Hun., 1992:973; Zhang, 1987[ed.] 1:234)
=*Amphipyra obliquilimbata* Graes.
=*Amphipyra yama* Swinhoe,
=*Amphipyra apyra* Bryk.
Amphipyra pyramidea, Zhang, 1987[ed.] 1:234.
別 名：*果紅裙扁身夜蛾*。
寄 主：桃、梨、蘋果、櫻桃、葡萄、胡桃、櫟、楓、榆、楊、柳、榛、接骨木、烏荆子、樺等。
分 佈：湖南、江西、廣東、四川、湖北、河北、黑龍江；日本、蘇聯、印度、伊朗、歐洲。

3035. **Anadevidia peponis** (Fabricius) 葫蘆夜蛾 (Chang & Hung, 1986:90; Heppner et Inoue, 1992:183; Zhang, 1987[ed.] 1:256)
Noctua peponis Fabricius, 1775:
=*Plusia agramma* Guenée, 1852:
=*Plusia inchoata* Walker, 1865:
=*Plusia fumifera* Graeser, 1889:
寄 主：桑樹、葫蘆、南瓜。
分 佈：臺灣、江西、浙江、河北、黑龍江；日本、印尼、印度、斯里蘭卡、澳洲。

3036. **Anaplectoides prasina** (Schiffermüller) 綠組夜蛾 (ASZI, 1987, 2:208; Chen, 1986:)
寄 主：懸鈎子屬、樺屬、蕎蓄、酸模屬、馬林果、柳屬、烏飯樹屬、報春屬、蓼屬等植物。
分 佈：新疆、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

3037. **Anomis flava** (Fabricius) 小造橋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:236; Chao, 1982:262; Chen et Wang, 1987:33; Heppner et Inoue, 1992:180; Huang et Gan, 1996:192; Hun., 1992:1019; Luo et al., 1996:60; Wu et Chou, 1985:165-172; Yu et Tu, 1969:151-157; 1971:184; Yunn., 1987:1082; Zhang, 1987[ed.] 1:263)

Noctua foava (Fabricius 1775).

=*Noctua stigmatizan* Fabricius, 1775:

=*Cosmorphila xanthyndima* Boisduval, 1833:

=*Cosmorphila indica* Guenée, 1852:

別 名：*小造橋蟲、小赤切翅蛾*。

寄 主：成蟲(吸食果汁)，吸食柑橘、檬果、番石榴、黃皮、桃、梨、蘋果、杏、梅、楊梅、枇杷、胡瓜、番茄等果汁；幼蟲爲害棉、木槿、芙蓉、薯芋、錦葵、木槿、蜀葵、苘麻、甘薯、多莧菜、煙草、木耳菜。

分 佈：福建、江西、海南、雲南，除西北各省(區)外，各棉區均有；亞洲、非洲、歐洲。

天 敵：*Apanteles anomidis* Watanabe 橋夜蛾絨繭蜂(幼蟲)

Sigalphus nigripes He et Chen 黑足屏腹繭蜂(幼蟲)

Brachymeria lasus (Walker) 廣腿小蜂(蛹)

Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂(卵)

Sisyropa formosa Mesnil 臺灣皮寄蠅

3038. **Anomis fulvida** (Guenée) 超橋夜蛾 (ASZI,1987, 2:237; Chen et al., 2000(1):23-24; Huang, 1990[ed.] 2:251; Huang et Gao, 1996:192; Hun.,1992:1019; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1082; Zhang, 1987[ed.] 1:263)

寄 主：成蟲(吸食果汁)，吸食柑橘、檬果、龍眼、黃皮等果汁；幼蟲爲害棉。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、大西洋。

3039. **Anomis mesogona** (Walker) 橋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:237; Chao, 1982:262; Chen, 1995(3):38; Chen et Wang, 1987:33; Heppner et Inoue, 1992:180; Huang et Gao, 1996:192; Hun., 1992:1019; NZWDI, 1981:1697, 1918; Wu et Chou, 1985:165-172; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1081; Zhang, 1987[ed.] 1:263; Zhang, 1988:442; Zhao et al., 1997:190)

Gonitis mesogona Walker, 1858:

寄 主：成蟲(吸食果汁)，吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、榛、李、葡萄、櫻桃、無花果、紅懸鈎、酸棗果汁，幼蟲爲害薅田藨 (*Rubus parvifolius* Linnaeus)、高粱泡、野板栗(*Quercus dentata* Thunb.)。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、西藏、貴州、浙江、湖北、山東、河北、黑龍江；朝鮮、日本、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

天 敵：Namatoda 線蟲一種

Microplitis sp. 盆蜂

其它四種

Trichogramma sp. 赤眼蜂

Telenomus sp. 黑卵蜂

3040. **Anomis sabulifera** Guenée 黃麻橋夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:263)

寄 主：幼蟲爲害黃麻，成蟲(吸食果汁)吸食柑橘等果汁。

分 佈：江西。

3041. **Anua coronata** Fabricius 枯安紐夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251; Zhang, 1987[ed.] 1:257)

寄 主：幼蟲爲害使君子，成蟲(吸食果汁)吸食柑橘、梨等果汁。

分 佈：江西。

3042. **Anua indiscriminata** Moore 同安鈕夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24)
寄 主：龍眼。
分 佈：福建。

3043. **Anua tirhaca** (Cramer) 青安鈕夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24; Huang, 1990[ed.] 2:251; Luo et al., 1996:60; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：幼蟲爲害乳香、漆樹，成蟲(吸食果汁)吸食柑橘、龍眼、梨、榛、檬果、葡萄等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、海南、貴州。

3044. **Anua trapezium** Guenée 直安鈕夜蛾 (Yang, 1992:207-208)
寄 主：梨(吸食果汁)。
分 佈：貴州。

3045. **Anua triphaenoides** Walker 橘安紐夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251;Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Zhang, 1987[ed.] 1:257)
寄 主：成蟲(吸食果汁)，吸食柑橘、李、梅、桃、梨、葡萄、枇杷等果汁。
分 佈：江西、湖南。

3046. **Apatela major** Bremer 大劍紋夜蛾 (Pang et Long, 1981:25-26; Zheng, 1982:206-208)
別 名：*桑夜蛾*、*白毛蟲*。
寄 主：桑、桃、杏、梅、香椿、榆。
分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江。
天 敵：*Trichogramma* sp. 赤眼蜂(卵)
白毛蟲脊腹繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣閤小蜂(蛹)
桑蟥寄蠅(蛹)

3047. **Araeognatha cineracea** Butler 灰薄夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:263)
寄 主：無花果。
分 佈：江西。

3048. **Argyrogramma albostriata** Bremer et Grey 白條銀紋夜蛾 (Chao, 1982:262; Zhang et Zhang, 1999:26)
寄 主：蘋果、桃(見於爛果上)、菊。
分 佈：福建。

3049. **Argyrogramma brevistriata** Chou et Lu 短條夜蛾 (Chou et Lu, 1979:62)
Argyrogramma brevistriata Chou et Lu, 1979:62.
寄 主：檬果。
分 佈：雲南。

3050. **Argyrogramma hainanensis** Chou et Lu 海南銀紋夜蛾 (Chou et Lu, 1979:61)
Argyrogramma hainanensis Chou et Lu, 1979:61.

寄 主：可可。
分 佈：海南。

3051. **Azazia rubricans** B. 干煞夜蛾 (Chao, 1982:262)
寄 主：梨、蘋果、桃(於爛果上)
分 佈：福建。

3052. **Balsa malana** Fitch 洼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:200)
寄 主：蘋果。
分 佈：吉林、黑龍江；日本、蘇聯、美洲(北部)。

3053. **Blenina senex** (Butler) 柿癬皮夜蛾 (Heppner at Inoue, 1992:185; Hun., 1992:1004; Yunn., 1987:1069; Zhang, 1987[ed.] 1:254)
Dandaca senex Butler, 1878:
=*Dandaca megei* Oberthür, 1881:
別 名：*柿癬皮蛾*。
寄 主：柿。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、四川、江蘇；朝鮮、日本。

3054. **Blepharita amica** Treitschke 毛眼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:206)
別 名：*毛眼地老虎*。
寄 主：稠李、烏頭屬植物。
分 佈：遼寧；蘇聯、歐洲。

3055. **Bombolelia jocosatrix** (Guenée) 檬果重尾夜蛾 (Chao, 1982:262; Luo, 1991:87; Luo et Li, 1998:66; Luo et al., 1996:60; Wu et Zhu, 1981:29)
寄 主：檬果、腰果(幼葉)。
分 佈：廣東、海南、廣西。
天 敵：*Euplectrus taiwanus* Sonan 臺灣長距釉小蜂(幼蟲)

3056. **Callopistria venata** Leech 脈散紋夜蛾 (Yang, 1992:207-208)
寄 主：梨(吸果)
分 佈：貴州。

3057. **Calpe minuticornis** Guenée 壺夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:231)
寄 主：柑橘(吸果)。
分 佈：中國。

3058. **Calymnia pyralina** Schiffermüller 果兜夜蛾 (ASZI, 1987, 2:204)
寄 主：蘋果、梨。
分 佈：黑龍江；日本、歐洲。

3059. **Calyptra capucina** Esper 壺夜蛾 (Chen et Wang, 1987:33; NZWDI, 1981:1697; Sun et al., 1996:46; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:263; Zhang, 1988:442)
別 名：*羽壺夜蛾*、*鳥嘴壺夜蛾*。
寄 主：幼蟲為害唐松草，成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果等果汁。

分 佈：江西、湖南、貴州、山東。

3060. **Calyptra minuticornis** (Guenée) 審角壺夜蛾 (Chao, 1982:263; Chen et Wang, 1987:33; Chen et al., 2000(1):23-24; Heppner et Inoue, 1992:180; Huang et Gao, 1996:191; Hun., 1992:1028; NZWDI, 1981: 1697; Wu et Chou, 1985:165-172; Xie et al., 1994, 20(4):30-32)
Culasta minuticornis Guenée, 1852:
別 名：*壺夜蛾*。
寄 主：千金藤、木防己屬。成蟲(吸果)吸食柑橘、桃、葡萄、番石榴等液汁。
分 佈：福建、廣東、湖南、浙江；印尼、印度、斯里蘭卡。

3061. **Calyptra thalictri** (Borkhausen) 壺夜蛾 (Hun., 1992:1028)
=*Calpe sodalis* Butler,
別 名：*釋壺夜蛾*。
寄 主：唐松草。成蟲(吸果)吸食水果液汁。
分 佈：湖南、雲南、四川、浙江、河北、新疆、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

3062. **Carea subtilis** Walker 白裙赭夜蛾 (Luo et Li, 1998:89; Luo et al., 1996:87; 1996:91; Xiao, 1992:1032)
寄 主：蒲桃、蓮霧、檸檬桉、烏墨、黃檀、水楊、藤藍屬。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；印尼、印度、斯里蘭卡。
天 敵：蜘蛛
Hierodula patellifera Serville　廣腹螳螂
獵蝽
Brachymeria sp.　大腿蜂
Formicidae　蟻科
Vespidae　胡蜂科
鳥

3063. **Catocala electa** Borkhausen 柳裳夜蛾 (ASZI, 1987, 2:228)
寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果果汁；幼蟲為害柳、楊。
分 佈：湖北、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。

3064. **Catocala hymenaea** Schiffermüller 普裳夜蛾 (ASZI, 1987, 2:230)
寄 主：黑刺李、李、烏荊子。
分 佈：遼寧、黑龍江；蘇聯、亞洲(西部)、歐洲。

3065. **Catocala mirifica** Butler 鴟裳夜蛾 (Zhang, 1987(ed.) 1:258)
寄 主：成蟲(吸果)吸食梨果汁。
分 佈：江西。

3066. **Catocala nivea** Butler 白光裳夜蛾 (Heppner et Inoue, 1992:183; Hun., 1992:1009)
Catocala nivea Butler, 1877:
寄 主：蘋果、櫻桃。
分 佈：湖南、湖北；日本、印度。

3067. **Catocala patala** Felder 鴟裳夜蛾 (ASZI, 1987, 2:229)

寄 主：成蟲(吸果)吸食梨果汁；幼蟲為害藤。
分 佈：江西、浙江、寧夏、黑龍江；日本、印度。

3068. **Chalciope geometrica** (Fabricius) 中華三角夜蛾 (Chao, 1982:263; Chen et al., 2000(1):23-24; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1988:443; Zhang, 1987[ed.] 1:258; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：幼蟲為害石榴、柑橘、龍眼、懸鈎子、水稻、大豆、花生、蓖麻、烏桕、金雀兒、蓼。成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、棕、李、櫻桃、葡萄、無花果、無患子等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、山東。

3069. **Chalciope mygdon** Fabricius 斜帶三角夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24; Zhao et al., 1997:191; Zhang, 1987[ed.] 1:258)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、龍眼、棕等果汁
分 佈：福建、江西。

3070. **Chalciope stolida** Fabricius 曲線三角夜蛾 (ASZI, 1987, 2:234; Chao, 1982:263; Yunn., 1987:1073)
寄 主：懸鈎子、櫟、馬甲子等屬植物、三葉豆。
分 佈：雲南；緬甸、印度、亞洲(西部)、非洲、歐洲。

3071. **Characoma ruficirra** Hampson 栗皮夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:355-356; Wang, 1987[ed.]:215-216)
寄 主：板栗、茅栗、橡樹(蛀食果實)。
分 佈：山東、各產栗區。

3072. **Chasmina sigillata** (Ménétriés) 日月夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:235)
寄 主：核桃。
分 佈：江西。

3073. **Chlumetia guangxiensis** Wu et Zhu 檬果葉尾夜蛾 (Luo et al., 1996:60; Wu et Zhu, 1981:29)
Chlumetia guangxiensis Wu et Zhu, 1981:29.
寄 主：檬果(花梢、嫩梢、幼葉)。
分 佈：海南、廣西。

3074. **Chlumetia transversa** Walker 檬果橫線尾夜蛾 (ASZI, 1987, 2:226; Chang & Hung, 1986:88; Chao, 1982:263; Chen et Chang, 1995:457; Heppner et Inoue 1992:185; Huang, 1990[ed.] 2:294-296; Huang et Gao, 1996:280; Huang et al., 1966:233; Lin, 1995(3):44; Luo et Li, 1998:63; NZWDL, 1981:1983; Pingtung AC., 1986:11; Tsai, 1961:116-117; Tsai, 1965:114; Wu et Zhu, 1981:29)
Nachaba transversa Walker, 1865:
=*Chlumetia guttiventris* Walker, 1866:
=*Chlumetia guangxiensis* Wu & Zhu, 1981:
別 名：*檬果螟蛾、檬果尾夜蛾*。
[Mango shoot borer]
寄 主：檬果(嫩梢、花穗)。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南；馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3075. **Chrysopera cambinens** Walker 純夜蛾 (ASZI, 1987, 2:241)
寄 主：人心果。

分 佈：廣東、四川；印度。

3076. **Chrysodeixis chalcytes** (Esper) 銀輝夜蛾 (Yunn., 1987:1091)

寄 主：無花果、蕁麻、夏至草、薊薊、玉米、棉、花椰菜、鼠尾草。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州、江西、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、山東、新疆；朝鮮、日本、蘇聯、阿富汗、伊朗。

3077. **Chrysorithrum amata** Bremer 客來夜蛾 (Xi, 1993:47; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:266; Zhang, 1988:442)

寄 主：幼蟲爲害胡枝子，成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果等果汁。
分 佈：江西、貴州、山東。

3078. **Cirrhia divergens** Butler 委美冬夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:246)

寄 主：桃(花，幼果)。
分 佈：江西。

3079. **Cocytodes caerulea** Guenée 苧麻夜蛾 (Chao, 1982:263; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:258)

寄 主：幼蟲爲害苧麻、大豆、黃麻、蕁麻、亞麻、椿，成蟲(吸果)吸食梨、蘋果、桃(於爛果上)、葡萄(爛果)、柑橘。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州。

3080. **Conistra ligula** Esper 紅棕襟冬夜蛾 (ASZI, 1987, 2:218)

寄 主：山楂屬植物、忍冬。
分 佈：遼寧、黑龍江；蘇聯、土耳其、歐洲。

3081. **Corgatha dictaria** Walker 柑橘孔夜蛾 (ASZI, 1987, 2:223; Zhang, 1987[ed.] 1:249)

寄 主：柑橘。
分 佈：江西、四川、浙江、江蘇；日本。

3082. **Cymatophoropsis trimaculata** Bremer 三斑蕊夜蛾 (Zhang, 1987[ed] 1:253)

寄 主：鼠李。
分 佈：江西。

3083. **Daddala lucilla** (Butler) 蘋眉夜蛾 (ASZI, 1987, 2:242; Heppner et Inoue, 1992:181; Hun., 1992:1032)

Sypna lucilla Butler, 1881:
=*Sypna obscurata* Butler, 1881:
寄 主：蘋果、梨。
分 佈：湖南、河北、黑龍江；朝鮮、日本。

3084. **Diarsia brunnea** (Schiffermüller) 棕色歹夜蛾 (Chen, 1986:137; Hun., 1992:960)

=*Noctua lucifera* Esp.,
=*Noctua fragaria* Brikn.,
=*Nicus arvensis* Gmel.,
=*Nictua carnea* Thnb.,
=*Agrotis hospitalis* Grt.,
=*Cerastis subdolens* Butler,

寄 主：懸鉤子屬、柳屬、酸模屬等。
分 佈：湖南、新疆、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

3085. **Diarsia dahlii** (Hübner) 歹夜蛾 (Chen, 1986:141-142)
寄 主：山楂、柳、報春、酸模、車前等屬。
分 佈：雲南、四川、山西、青海、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

3086. **Diarsia festiva** (Schiffermüller) 斑歹夜蛾 (Chen, 1986:126-127)
寄 主：李、山楂、懸鉤子、報春、柳、酸模、堇菜、烏飯樹、蓼等屬。
分 佈：青海、新疆；蘇聯、歐洲。

3087. **Dinumma deponens** (Walker) 曲帶雙衲夜蛾 (ASZI, 1987, 2:239; Heppner et Inoue, 1992:178; Hun., 1992:1024; Zhang, 1987[ed.] 1:267)
Dinumma deponens Walker, 1858:
=*Dichonia bipunctata* Motschulsky, 1860:
=*Amphipyra largeteaui* Oberthür, 1884:
別 名：*雙衲夜蛾*。
寄 主：櫻桃、大葉合歡。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、山東；朝鮮、日本、印度。

3088. **Dysgonia analis** Guenée 月牙巾夜蛾 (Chao, 1982:266)
Ophiusa analis Guenée, 1852:
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：福建；印尼。

3089. **Dysgonia arctotaenia** (Guenée) 玫瑰巾夜蛾 (Chang & Hung, 1986:86; Chao, 1982:266; Heppner et Inoue 1992:182; Tsai, 1965:112; Xi, 1993:47; Zhang, 1988:443)
Ophiusa arctotaenia Guenée, 1852:
別 名：*柿夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁、薔薇科植物、蓖麻。
分 佈：臺灣、福建、山東；朝鮮、日本、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、斐濟群島。

3090. **Dysgonia arcuata** Moore 污巾夜蛾 (Chao, 1982:266; Chen et al., 2000(1):23-24; Heppner, et Inoue, 1992:182)
Ophiusa arcuata Moore, 1887:
=*Ophiusa guenei* Snellen, 1880:
=*Ophiusa curvata* Leech, 1889:
別 名：*弓巾夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、龍眼果汁。
分 佈：臺灣、福建；朝鮮、印尼、安德曼群島。

3091. **Dysgonia fulvotaenia** (Guenée) 寬巾夜蛾 (Chao, 1982:266; Heppner et Inoue, 1992:182; Yunn., 1987:1074)
Ophiusa fulvotaenia Guenée, 1852:
=*Parallelia unipuncta* Warren., 1913:
=*Paralelia contracta* Warren., 1913:

=*Dysgonia flavataenis* Kishida, 1979: missp.
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、浙江；日本、菲 律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3092. **Dysgonia joviana** Stoll 隱巾夜蛾 (Chao, 1982:266; Heppner et Inoue, 1992:182)
Ophiusa joviana Stoll, 1782:
=*Noctua sinuata* Fabricius, 1781: preocc. (*nec* Fabricius, 1775)
=*Noctua jovis* Hübner, 1823: emend.
=*Ophiusa myops* Guenée, 1852:
=*Ophiusa affinis* Guenée, 1852:
=*Parallelia joviana* ab. *muza* Strand, 1919:
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、蘋果、桃等果汁。
分 佈：臺灣、福建；印尼、印度。

3093. **Dysgonia maturata** (Walker) 雷巾夜蛾 (Chang & Hung, 1986:86; Chao, 1982:266; Heppner et Inoue, 1992:182; Zhang, 1988:443)
Ophiusa maturata Walker, 1858:
=*Ophiusa falcata* Moore, 1882:
別 名：*裂巾夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。
分 佈：臺灣、福建、中國大陸、山東；朝鮮、日本、馬來亞、印度。

3094. **Dysgonia palumba** (Guenée) 柚巾夜蛾 (ASZI, 1987, 2:234; Chang & Hung, 1986:86; Heppner et Inoue,1992:182; Tsai, 1965:112)
Hulodes palumba Guenée, 1852:
=*Ophisma laetabilis* Guenée, 1852:
=*Remigia colligens* Walker, 1865:
寄 主：柚子、律草；成蟲(吸果)吸食柑橘、檬果等果汁。
分 佈：臺灣、廣東、廣西；新加坡、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3095. **Dysgonia stuposa** (Fabricius) 石榴巾夜蛾 (ASZI, 1987, 2:233; Chang & Hung, 1986:86; Heppner et Inoue, 1992:182; Hun., 1992:1015; Xi, 1993:47; Yunn., 1987:1075; Zhang, 1988:443)
Noctua stuposa Fabricius, 1794:
=*Ophiusa festinata* Walker, 1858:
=*Parallelia tumefacta* Warren., 1913:
=*Parallelia japonibia* Bryk., 1949:
=*Dysgonia algira* auct. (*nec* Linnaeus, 1767).
寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果、石榴、懸鈎子等果汁、合歡。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北；朝鮮、日本、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

3096. **Eligma narcissus** (Cramer) 旋皮夜蛾 (ASZI, 1987, 2:227; Chao, 1982:263; Heppner et Inoue, 1992:185; Hun., 1992:1003; Xiao, 1992:1054; Yunn., 1987:1069)
Phalaena narcissus Cramer, 1771:
=*Eligma indica* Roths.,
=*Eligma javanica* Roths.,
=*Eligma philippinensis* Roths.,
別 名：*臭椿皮蛾*。

寄 主：桃、臭椿、香椿、樗樹。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、陝西、江蘇、山東、河北、北京、遼寧；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度。
天 敵：Ichneumonidae 姬蜂科
Pimpla inctuosa
Sympiesis sp.
寄生蠅

3097. **Enmonodia vespertilio** Fabricius 昏變色夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251; Zhang, 1987[ed.] 1:259)
寄 主：幼蟲爲害紫藤，成蟲(吸果)吸食柑橘等果汁。
分 佈：江西。

3098. **Ephesia fulminea** (Scopoli) 光裳夜蛾 (ASZI, 1987, 2:231; Hun., 1992:1010; Zhang, 1987[ed.] 1:259)
=*Catocala protonympha* Bsd.,
=*Catocala koreana* Stgr.,
寄 主：梅、梨、山楂、烏荊子、槲。
分 佈：江西、湖南、遼寧、黑龍江。

3099. **Ercheia umbrosa** Butler 果夜蛾 (Chang & Hung, 1986:89; Heppner et Inoue, 1992:181)
Ercheia umbrosa Butler, 1881:
=*Ercheia cyllaria* Strand, 1919: partim. (*nec* Cramer, 1779)
寄 主：多種果樹。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、印度。

3100. **Erebus ephesperis** (Hübner) 玉鉗魔目夜蛾 (Chao, 1982:266; Zhang, 1987[ed.] 1:259)
Nyctipao ephesperis Hübner, 1823:
=*Nyctipao laetita* Butler, 1879:
=*Erebus niasana* Swinhoe, 1918:
=*Erebus malanga* Swinhoe, 1918:
=*Nyctipao crepuscularis* auct. (*nec* Linnaeus, 1758)
=*Nyctipao* ab. *noctualis* Strand, 1919:
寄 主：成蟲(吸果)吸食梨、柑橘等果汁。
分 佈：臺灣、福建、江西；印尼、日本。

3101. **Erebus gemmans** Guenée 玉線魔目夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:259)
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁。
分 佈：江西。

3102. **Erebus pilosa** Leech 魔目夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:260)
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁。
分 佈：江西。

3103. **Eredus creoyscykarus** Linnaeus 魔目夜蛾 (Yang, 1992:207-208)
寄 主：梨(吸果)。
分 佈：貴州。

3104. **Eublemma versicolora** Walker 幻獵夜蛾 (ASZI, 1987, 2:223)
寄 主：紅毛榴蓮。

分 佈：廣東；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

3105. **Eudocima salaminia** (Cramer) 艷葉夜蛾 (ASZI, 1987, 2:238; Chang & Hung, 1986:89; Chao, 1982:265; Heppner et Inoue, 1992:180; Hun., 1992:1020; Tsai, 1965:115; Wu et Chou, 1985:165-172; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1080; Zhang, 1988:442)
Phalaena salaminia Cramer, 1777:
別 名：*前黃木葉蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、桃、蘋果、梨、檬果、黃皮、番石榴等果汁；幼蟲爲害蝙蝠葛屬植物。
分 佈：臺灣、福建、浙江、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、山東；印度、大洋洲、南太平洋諸島、澳洲、非洲。

3106. **Eugraphe subrosea** (Stephens) 化圖夜蛾 (ASZI, 1987, 2:207; Chen, 1986:109-110)
寄 主：楊梅、柳、桉木等屬植物。
分 佈：黑龍江；歐洲。

3107. **Eumonodia vespertilio** (Fabricius) 變色夜蛾 (Chao, 1982:264; Xi, 1993:47; Zhang, 1988:443)
寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。
分 佈：福建、山東。

3108. **Eupatula macrops** Linnaeus 卷裳魔目夜蛾 (Yang, 1992:207-208)
寄 主：梨(吸果)。
分 佈：貴州。

3109. **Eutelia geyeri** Felder 漆尾夜蛾 (Xi, 1993:47; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1988:443)
寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。
分 佈：貴州、山東。

3110. **Euxoa conspicua** (Hübner) 顯紋切夜蛾 (Chen, 1986:28)
寄 主：葡萄(幼苗)、春麥、蒿草等。
分 佈：新疆、黑龍江；蘇聯、印度、喀什米爾、敘利亞、歐洲。

3111. **Euxoa sibirica** (Boasduval) 西伯利亞地老虎 (Chen, 1986:26; Chen et al., 1993:92)
別 名：*麥切夜蛾*。
寄 主：棗。
分 佈：黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

3112. **Grammodes geometrica** (Fabricius) 中帶三角夜蛾 ASZI, 1987, 2:234; Heppner et Inoue, 1992:182; Hun., 1992:1016; Yunn., 1987:1073)
Noctua geometrica Fabricius, 1775:
=*Phalaena ammonia* Cramer, 1779:
=*Grammodes orientalis* Warren, 191:.
寄 主：石榴、柑橘、懸鉤子、馬林果等。
分 佈：臺灣、浙江、湖南、廣東、雲南、四川、湖北；新加坡、印尼、緬甸、印度、亞洲(西部)、大洋洲、非洲、伊朗、土耳其、歐洲。

3113. **Hamodes butleri** Leech 斜線哈夜蛾 (Yang, 1992:207-208)

寄 主：梨(吸果)。
分 佈：貴州。

3114. Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲 (Bai et al., 1997, 24(1):1-6; Chai et al., 1995, 21(6):46; Chang, 1971:72-74; Chang et Tao, 1962:152-155; Chang et al., 1982:103; Chen et al., 1998, 20(2):64-68; Chu, 1995(2):14; Chu et al., 1976:219-230, 361-368; Dai et al., 1991, 8(3):195-205; Dai et al., 1992, 8(3):190-205; Dong et al., 1995, 21(2):32-33; Dong et al., 1997, 24(4):373-374; Dong et al., 1998, 25(1):72-78; Fan et Ning, 1993(3):36; Fan et al., 1995:335-338; Fan et al., 1997, 24(1):75-80; Fang, 1992:355; Fan et al., 1996, 22,(4):24-26; Fan et al., 1999, 15(1):27-30; Feng et al., 1995:64; Guo et al., 1994, 21(4):339-344; Hsia et Kao, 1987:165; Hung, 1985:448-449; Huo et Zhang, 1986, 6:23-27; Jiang et Zhang, 1996, 23(4):375-376; Jin et al., 1995, 21(3):30-32; Jiang et al., 1998(1):43-44; Jiang et al., 1999, 26(2):183-186; Kao et Hsia, 1984:432; 1987:173-174; Kou et Chow, 1985:419; 1987:414-415; Lei et al., 1995, 21(5):10-12; Lei et al., 1996, 23(2):189-190; Li, 1982, (4):12-14; Li et Li, 1994, 20(1):25; Li et Shen, 1996, 18(4)(Suppl.):49-62; Liang et al., 1996, 23(1):66-72; Lin et Wu, 1993, 19(3):53; Liu et al., 1996, 35(5):10-15; Liu et al., 1996:31-32; Lu et al., 1996, 19(Suppl.):63-66; Ma et al., 1994, 20(2):24; Meng et Ge, 1993:301; Ru et al., 1997, 24(4):356-360; Rui et al., 1995:311-315; Rui et al., 1999, 25(7):260-264; Shen et al., 1991, 28(6):337-340; Shen et al., 1997, 24(3):283-284; Shih et Chu, 1988:131-141; Tan et Zhao, 1990, 33:155; Tan et al., 1987, (4)(Suppl.):36-43; Tan et al., 1992,:283-287; Tan et al., 1993, 19(1):6-8; Tan et al., 1993, 20(2):147-154; Wang, Du-hing, 1994:108; Wang, 1996, 24(1):13-18; Wang et Lai, 1997:411; Wang et Qin, 1996, 39(1):7-13; Wang et al., 1990, :99-104; Wang et al., 1993, 19(Suppl.):66-70; Wang et al., 1996(3):51; Wang et al., 1998, 25(3):238-262; Wei et al., 1992, 25(6):9-14; Wei et al., 1993:45-48; Wei et al., 1996, 23(2):152-156; Wu et Guo, 1994, 20(4):16-17; Wu et Guo, 1995, 22(4):331-336; Wu et Guo, 1995, 12(Suppl.):173-173; Wu et Guo, 1996, 29(1):30-35; Wu et Guo, 1996:408-413; Wu et Guo, 1996, 16(6):612-618; Wu et Guo, 1997, 40(1):51-57; Wu et Guo, 1997, 24(2):142-146; Wu et Guo, 1997, 17(3):298-303; Wu et Guo, 1997, 40(Suppl.):7-12, 1997, 40(Suppl.):79-83; Wu et Guo, 1998, 25(1):6-10; Wu et Lin, 1990:151-158; Wu et al., 1994, 37(2):129-135; Wu et al., 1995, 38(1):20-24; Wu et al., 1995, 18(2):60-66; Wu et al., 1995, 18(3):48-53; Wu et al., 1995:316-319; Wu et al., 1996, 22(5):3-6; Wu et al., 1998, 25(4):337-; Xia, 1989, 16(1):19-20; Xia et al., 1997, 24(4):375-376; Xu et Qin, 1987, 30:359; Yang et al., 1996, 23(2):163-169; Yeh et al., 1988:379-385; Yen et Chang, 1988:192; Yu et al., 1993, 20(1):18; Yuan et al., 1979, 6(1):25-36; Yuan et al., 1979, 6(1):37-50; Zhang et al., 1980, 17(1):9-13; Zhang et al., 1993,:49-51; Zhang et al., 1994, 20(4):29-30; Zhang et al., 1995, 21(3):32-34; Zhang et al., 1996, 23(4):349-354; Zhang et al., 1996, 23(2):157-162; Zhang et al., 1999, 26(2):191-192; Zhao et Xue, 1994:40-41; Zheng et al., 1993(4):47; Zhou et al., 1995:65; Zuo et al., 1994, 20(2):2-4)

Helicoverpa armigera (Hübner)
別 名：*玉米穗蟲*、*番茄夜蛾*。
寄 主：多食性，蘋果、紅花、桃、椒子等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、山東，全國；全世界。
天 敵：*Litomastitix heliothis* Liao 棉鈴蟲多胚跳小蜂
Bacillus thuringiensis 蘇雲金桿菌
Beauveria brongniartii 白僵菌
Metarhizium anisopliae 綠僵菌
HaNPV 棉鈴蟲核型多角體病毒
HaCPV 棉鈴蟲質型多角體病毒
HaGV 棉鈴蟲顆粒體病毒

3115. Helicoverpa assulta (Guenée) 柑橘阿夜蛾 (Chang & Hung, 1986:89; Du, 1988, ; Heppner et Inoue, 1992:202; Luo et al., 1999, 26(3):225-228; Song et al., 1997, 13(2):79-81; Zhang, 1993, 9(2):80-86)

Heliothis assulta Guenée, 1852:
=*Heliothis temperata* Walker, 1857:
=*Heliothis separata* Walker, 1857:
=*Heliothis succinea* Moore, 1881:
=*Helicoverpa afra* Hardwick, 1865:
別 名：*煙青蟲*。
寄 主：柑橘類、煙草。
分 佈：臺灣、河南、中國大陸；朝鮮、日本、印度、法國、西非、大溪地、薩摩亞。

3116. **Hulodes caranea** (Cramer) 木夜蛾 (ASZI, 1987, 2:239; Heppner et Inoue, 1992:178; Hun., 1992:1020; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1083)

Phalaena caranea Cramer, 1780:

=*Hulodes carenea* Poole, 1989: missp.

寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁(梨)；幼蟲為害老鴉企屬植物。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3117. **Hyblaea pupera** Cramer 全鬚夜蛾 (Xiao, 1992:1057; Zhang, 1987[ed.] 1:273)

別 名：*柚橙帶夜蛾*。

寄 主：柿、核桃科、馬鞭草科、五加科、紫葳科、木犀科植物，主要有柚木、海南石梓、小葉牡荊、淡紫花牡荊、白花紫珠、裸花紫珠、臘腸樹、木蝴蝶等。

分 佈：臺灣、江西、海南、廣東、廣西、雲南、江蘇、湖北、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲南部、美洲南部。

天 敵：賽氏杆菌(幼蟲,蛹,致病力很強)

Camptotypus formosanus Matsumura 姬蜂(幼蟲)

Cryptus flavicoxatus Sonan (幼蟲)

Echthromorpha notulatoria Fabricius (幼蟲)

Epirhyssa hyblaeana Sonan (幼蟲)

Frion okinawana Uchida 沖繩弗姬蜂(幼蟲)

Teleutaea gracilis Cushman (幼蟲)

Theronia rufescens Morley (幼蟲)

皺彎姬蜂

松毛蟲惡姬蜂

柚木夜蛾長痣姬蜂

柚木夜蛾弗姬蜂

小繭蜂

Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)

3118. **Hydroecia basilipunctata** Graeser 高山角劍夜蛾 (Li, et al., 1980:116-118)

寄 主：懸鉤子、玉米、小麥、黃豆、馬鈴薯、南瓜、向日葵、菜豆、菊芋(洋姜)(*Helianthus tuberosus* L.)、蘘荷(*Zingiber mioga* (Thumberg) Rosc.) 大蕁麻(*Urtica* sp.)、大籽蒿(白蒿)(*Artemisia sieversiana* Willd.)、尾穗莧(*Amaranthus caudatus* L.)、天名精(*Carpesium abrotanoides* L.)等多種植物。

分 佈：四川。

3119. **Hylophilodes sylpha** Butler 狹帶粉翠夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:248)

寄 主：桃。

分 佈：江西。

3120. **Hypocala deflorata** (Fabricius) 柿梢鷹夜蛾 (ASZI, 1987, 2:241; Chang & Hung, 1986:86; Heppner et Inoue, 1992:179; Hung et Gao, 1996:288; Hun., 1992:1028; Tsai,1965 :112; Yunn., 1987:1097; Zhang, 1987[ed.] 1:268)

Hyblaea deflorata Fabricius, 1794:

=*Hypocala australiae* Butler, 1892:,

=*Hypocala moorei* Butler, 1892:

別 名：*莫利黃夜蛾*。
寄 主：柿、君遷子、象牙樹，成蟲(吸果)吸食梨等果汁。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、河北；日本、泰國、印度、斯里蘭卡、非洲、澳洲。

3121. **Hypocala subsatura** Guenée 蘋梢鷹夜蛾 (ASZI, 1987, 2:241; Chang & Hung, 1986:86; Chen et Wang, 1987:49-50; Heppner et Inoue, 1992:179; Huang, 1990[ed.] 2:58-59; Hun., 1992:1027; NZWDI, 1981:1699; Tsai, 1965:112; Wei, 1988:284-286; Xi, 1993:47; Xiao, 1992:1060; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1079; Zhang, 1987[ed.] 1:268)
Hypocala subsatura Guenée, 1852:
=*Hypocala aspersa* Butler, 1883:
=*Hypocala limbata* Butler, 1889:
=*Pseudophia tungusa* Graeser, 1890:
別 名：*臺灣下黃夜蛾，蘋梢夜蛾*。
寄 主：蘋果、梨、柿(苗木)、櫟、高山栲，成蟲(吸果)吸食梨等果汁。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、浙江、江蘇、河南、陝西、甘肅、山西、山東、河北、遼寧；日本、印度。

3122. **Hyppa rectilinea** Esper 回夜蛾 (ASZI, 1987, 2:204)
寄 主：懸鉤子、柳。
分 佈：新疆、黑龍江；蘇聯、歐洲。

3123. **Hyssia adusta** Draudt 焦藝夜蛾 (Gong et al., 1988:280-286; Hun., 1992:964; Xiao, 1992:1062)
寄 主：馬尾松。
分 佈：福建、廣東、湖南、湖北、浙江。

3124. **Ilattia octo** (Guenée) 坑翅夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:250)
寄 主：蘋果、大豆、甘薯。
分 佈：江西。

3125. **Iscadia inexacta** (Walker) 烏桕癩皮蛾 (Chao, 1982:264)
Gadirtha inecacta Walker, 1858:
=*Gadirtha impingens* Walker, 1858:
=*Scolopocneme bufonia* Felder et Felder, 1862:
=*Checupa tinctoides* Snellen, 1877:
=*Gadirtha buruensis* Prout, 1926:
=*Iscadia buffonia* Poole, 1989: missp.
寄 主：梨、蘋果、桃(爛果上)、烏桕。
分 佈：福建、香港、浙江；印尼、印度。

3126. **Ischyia manlia** (Cramer) 藍條夜蛾 (ASZI, 1987, 2:240; Chao, 1982:264; Heppner et Inoue, 1992:179; Hun., 1992:1026; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1080)
Ischyia manlia auct. (*nec* Cramer, 1776).
=*Ischyia malia* Kishida, 1979: missp.
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁(梨)、葡萄；幼蟲爲害欖仁樹、樟屬植物。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江；菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3127. **Lacera alope** Cramer 戟夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:269)

寄 主：幼蟲爲害豆科植物，成蟲(吸果)吸食柑橘等果汁。
分 佈：江西。

3128. **Lagoptera dotata** (Fabricius) 橘肖毛翅夜蛾 (ASZI, 1987, 2:232; Chen et al., 2000(1):23-24; Heppner et Inoue 1992:181; Hun., 1992:1013; Luo et al., 1996:60; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1074, Zhang, 1987[ed.] 1:260; Zhang, 1988:422)
Noctua dotata Fabricius, 1794;
別 名：*肖毛翅夜蛾*，*橘毛翅夜蛾*。
寄 主：幼蟲爲害柑橘、石柯屬植物，成蟲(吸果)吸食柑橘、檬果、龍眼、蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果的果汁。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、貴州、湖北、浙江、江蘇、山東、陝西；新加坡、緬甸、印度。

3129. **Lagoptera juno** Dalman 肖毛翅夜蛾 (Chao, 1982:263; Chen et al., 12000(1):23-24; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:260; Zhang, 1988:442)
別 名：*木槿夜蛾*，*毛翅夜蛾*。
寄 主：幼蟲爲害李、楓楊、樺、木槿，成蟲(吸果)吸食柑橘、龍眼、蘋果、梨、梅、桃、杏、李、枇杷、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、山東。

3130. **Lamprothripa lactaria** (Grueser) 蘋美皮夜蛾 (ASZI, 1987, 2:226; Hun., 1992:1003, Zhang, 1987[ed.] 1:254)
=*Asinduma korbi* Pglr.,
=*Dialithoptera stellata* Wlm.,
別 名：*蘋美皮蛾*。
寄 主：蘋果、枇杷。
分 佈：江西、湖南、四川、陝西、河北；日本。

3131. **Maenas salaminia** (Fabricius) 艷葉夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24, Huang et Gan, 1996:192; Luo et al., 1996:60; Zhang, 1987[ed.] 1:269)
寄 主：幼蟲爲害蝙蝠葛、千金藤，成蟲(吸果)吸食檬果、龍眼、柑橘、蘋果、梨、桃等果汁。
分 佈：福建、江西、海南。

3132. **Mamestra brassicae** (Linnaeus) 甘藍夜蛾 (ASZI, 1987, 2:211; Heppner et Inoue, 1992:198; Hu, 1990:144-147; Hun., 1992:962; Pan, 1993, 9(3):106-110, Yunn., 1987:1060)
Phalaena brassicae Linnaeus, 1758:
=*Phalaena omicron* Geoffroy, 1785:
=*Noctua albidilinea* Haworth, 1809:
=*Mamestra brassicae* var. *andalusica* Staudinger, 1871:
=*Mamestra brassicae* var. *decolorata* Staudinger, 1889:
寄 主：柑橘、葡萄、桑、松類、楊柳、柳杉、扁柏、松柏、羅漢松、蔬菜類 甘藍、蕓薹、白菜、茄子、胡蘿蔔、蔥、蠶豆、豌豆、馬鈴薯、甘蔗、棉、麥、麻類、煙草、甜菜、高粱及其它十字花科蔬菜。
分 佈：西藏、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、印度、歐洲。
天 敵：*Netelia* (s. str.) *ocellaris* (Thomson) 甘藍夜蛾擬瘦姬蜂(幼蟲)
Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂(卵)

3133. **Maurilia iconica** Walker 栗摩夜蛾 (ASZI, 1987, 2:221)

寄 主：栗。

分 佈：廣西、江西；新加坡、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、大洋洲。

3134. **Metopta rectifasciata** (Ménétriés) 蚪目夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251; Zhang, 1987[ed.] 1:260; Zhao et al., 1997:191)

寄 主：幼蟲爲害菝葜、牛尾菜，成蟲(吸果)吸食桃、梨、棗、枇杷、柑橘等果汁。

分 佈：福建、江西。

3135. **Mniotype satura** Schiffermüller 櫻毛多夜蛾 (ASZI, 1987, 2:217)

寄 主：櫻桃、律草、忍冬屬等植物。

分 佈：新疆、黑龍江；歐洲。

3136. **Mocis annetta** Butler 懈毛胫夜蛾 (Xi, 1993:47; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1988:443)

寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。

分 佈：貴州、山東。

3137. **Mocis dolosa** Butler 奸毛胫夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:260)

寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘等果汁。

分 佈：江西。

3138. **Mocis frugalis** (Fabricius) 毛跗夜蛾 (ASZI, 1987, 2:235; Heppner et Inoue, 1992:182; Yunn., 1987:1073)

Noctua frugalis Fabricius, 1775:

=*Chalciope hycopodia* Geyer, 1837:

=*Mocis translata* Walker, 1865:

寄 主：蘘荷科植物；成蟲(吸果)吸食檬果、黃皮等果汁。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南；馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡、大洋洲等。

3139. **Mocis undata** (Fabricius) 毛胫夜蛾 (ASZI, 1987, 2:235; Chang & Hung, 1986:89; Chao, 1982:265; Heppner et Inoue, 1992:182; Wu et Chou, 1985:165-172; Xi, 1993:47; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1073; Zhang, 1987[ed.] 1:260; Zhang, 1988:443)

Noctua undata Fabricius, 1775:

=*Phalaena virbia* Cramer, 1780:

=*Phalaena archesia* Cramer, 1780:

=*Remigia gregalis* Guenée, 1852:

=*Ophiusa velata* Walker, 1863:

=*Remigia bifasciata* Walker, 1865:

=*Cauninda bifasciata* Warren, 1913: preocc. (*nec* Walker, 1865).

別 名：*魚藤毛胫夜蛾*。

寄 主：幼蟲爲害花生、大豆、魚藤、山馬蝗屬植物，成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果等果汁。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、山東、河南、河北；朝鮮、日本、菲律賓、新加坡、沙勞越、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲。

3140. **Mormonia bella** Butler 蘋刺裳夜蛾 (ASZI, 1987, 2:228)

寄 主：蘋果。

分 佈：黑龍江；日本。

3141. Mythimna **separata** (Walker) 普通粘蟲 (Chao, 1982:265; Li, 1993, 19(4):2-4; Su et Lin, 1986, 6(1):65-73; Wang et al., 1996, 22(1):37-39; Wu et Huang, 1982, 2(1): ; Yang et al., 1995, 21(3):2-5; Yu et al., 1987, (Suppl.):86-92; Zhao, 1988, 15(1):40, 72)

Leucania separata (Walker),

別 名：*粟夜蛾*、*行軍蟲*。

寄 主：果樹及林木幼苗、水稻、小麥、玉米、高粱、甘蔗、粟、禾本科牧草、棉、麻、甜菜、番茄、豆類、甘薯、蕎麥等。

分 佈：除西藏、新疆外，全國各省區均有，福建；古北區東部、東南亞等地區。

天 敵：*Charops bicolor* Szèpligeti　稻螟蛉懸繭姬蜂(幼蟲)

Vulgichneumon leucaniae Uchidae　粘蟲白星姬蜂(幼蟲)

Apanteles ruficrus (Haliday)　螟蛉絨繭蜂(幼蟲)

Meteorus sp.　粘蟲黃繭蜂(粘蟲方室繭蜂)(幼蟲)

褐斑內繭蜂

Cuphocera varia Fadren　粘蟲欽缺須寄蠅(粘蟲側須寄蠅)(幼蟲)

Isomera cinerascens Rondani　灰等腿寄蠅(幼蟲)

3142. **Noctua pronuba** Linnaeus 模夜蛾 (Chen, 1986:100-101)

寄 主：葡萄、甘藍、蒲公英、酸模等屬及多種草本植物和多種灌木。

分 佈：新疆；印度、蘇聯、亞洲中部和西部、歐洲、非洲北部。

3143. **Nyctipao crepuscularis** (Linnaeus) 玉鉗魔目夜蛾 (Zhao et al., 1997:191)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

3144. **Nyctipao pilosa** Leech 魔目夜蛾 (Zhao et al., 1997:191)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

3145. **Ochropleura fennica** (Tauscher) 黑地狼夜蛾 (Chen, 1986:54-55; Xiao, 1992:1064)

寄 主：草莓、懸鉤子、蘋果、白頭翁、柳蘭、大葉薔薇、越橘、興安杜鵑、細葉杜香、山楊、甜楊、紅毛柳、東北赤楊、白樺、興安落葉松、樟子松等。

分 佈：新疆、黑龍江；蘇聯、歐洲、北美。

天 敵：姬蜂(寄生率 35.96 %)

寄蠅(寄生率 42.98 %)

3146. **Ochropleura flammatra** (Schiffermüller) 焰色狼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:209; Chen, 1986:49-50)

寄 主：草莓、蒲公英等屬植物。

分 佈：西藏、新疆；蘇聯、印度、巴基斯坦、錫金、敘利亞、伊朗。

3147. **Ochropleura praecox** (Linnaeus) 翠色狼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:209; Chen, 1986:56; Heppner et

Inoue, 1992:201)
Phalaena praecox Linnaeus, 1758:
=*Noctua praecps* Denis & Schiffermüller, 1775:
=*Agrotis praecox* var. *flavomaculata* Graeser, 1889:
寄 主：桃、梨、葡萄、繁縷、柳屬、蒿屬等植物。
分 佈：臺灣、河北、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

3148. **Ophideres fullonica** Linnaeus 落葉夜蛾 (Cai, 1998:45-46; Huang et Gao, 1996:191; Luo et al., 1996:60; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:169; Zheng, 1999(4):23; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：幼蟲爲害通草，成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、桃、棕、檬果、葡萄等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、海南、貴州。

3149. **Ophiusa coronata** (Fabricius) 枯安鈕夜蛾 (ASZI, 1987, 2:232; Chao, 1982:262; Heppner et Inoue, 1992:183; Yunn., 1987:1072)
Noctua coronata Fabricius, 1775:
=*Noctua leonina* Fabricius, 1775:
=*Noctua ancilla* Fabricius, 1794:
=*Corycia magica* Hübner, 1831:
=*Ophiodes ponderosa* Mabille, 1879:
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、檬果等果汁；幼蟲爲害使君子。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南；菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、印度、斯里蘭卡、大洋洲、非洲(東部)。

3150. **Ophiusa disjungens indiscriminata** (Hampson) 同安鈕夜蛾 (ASZI, 1987, 2:233; Heppner et Inoue, 1992:183; Yunn., 1987:1072)
Minucia disjungens indiscriminata Hampson, 1893:
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、檬果、黃皮等果汁；幼蟲爲害桃金孃科、桉樹屬等植物。
分 佈：廣東、廣西、雲南；菲律賓、越南、印度、斯里蘭卡。

3151. **Ophiusa tirhaca** (Cramer) 青安鈕夜蛾 (ASZI, 1987, 2:232; Chao, 1982:262; Heppner et Inoue, 1992:183; Yunn., 1987:1072; Zhang, 1988:443)
Phalaena tirhaca Cramer, 1777:
=*Noctua auricularis* Hübner, 1803:
=*Noctua vesta* Esper, 1789:
=*Ophiodes hottentotta* Guenée, 1852:
=*Ophiodes separans* Walker, 1858:
=*Ophiodes speparans* Kishida, 1979: missp.
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、黃皮、檬果、蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果等果汁；幼蟲爲害乳香、漆樹。
分 佈：西藏、雲南、四川、貴州、廣西、廣東、江西、福建、湖北、浙江、江蘇；菲律賓、新加坡、印度、錫金、斯里蘭卡、南非、敘利亞、土耳其、歐洲。

3152. **Ophiusa trapezium** (Guenée) 直安鈕夜蛾 (Heppner et Inoue, 1992:183; Yunn., 1987:1072)
Ophiodes trapezium Guenée, 1852:
=*Ophisma circumferens* Walker, 1865:
=*Ophisma cognata* Walker, 1865:
=*Ophiodes adusta* Moore, 1882:
=*Minucia prunicolor* Moore, 1883:
=*Ophiusa kebeae* Bethune-Baker, 1906:

寄 主：成蟲(吸果)吸食檬果等果汁。
分 佈：廣東、廣西、雲南、西藏；新幾內亞、新加坡、印度、斯里蘭卡。

3153. **Ophiusa triphaenoides** (Walker) 橘安鈕夜蛾 (ASZI, 1987, 2:233; Chao, 1982:262; Heppner et Inoue, 1992:183; Hun., 1992:1013; Yunn., 1987:1072)
Ophiodes triphaenoides Walker, 1858:
=*Ophiodes caprea* Moore, 1867:
別 名：*安鈕夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：臺灣、福建、浙江、江西、湖南、廣東、雲南；緬甸、印度。

3154. **Oraesia emerginata** (Fabricius) 嘴壺夜蛾 (Chang & Hung, 1986:90; Chen, 1995(3):38; Chen, 1996, 22(2):28; Chen et al., 2000(1):23-24; Heppner et Inoue, 1992:180; Huang, 1990[ed.] 2:251-253; Huang et Gao, 1996:191;NZWDI, 1981:1918; Wu et Chou, 1985:165-172; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1078; Zhang, 1987[ed.] 1:269; Zhang, 1988:442; Zhao et al., 1997:191)
Noctua emarginata Fabricius, 1794:
=*Oraesia rectistria* Guenée, 1852:
別 名：*桃黃褐夜蛾*、*吸果夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)雜食性，吸食柑橘、龍眼、桃、梨、李、棗、蘋果、枇杷、葡萄、檬果、楊梅、無花果，野木瓜，六葉野瓜等果汁，幼蟲爲害漢防己、木防己、通草、薯芋、十大功勞。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇；朝鮮、日本、印度。

3155. **Oraesia excavata** Butler 鳥嘴壺夜蛾 (Chang & Hung, 1986:90; Chao, 1982:266, Chen et Wang, 1987:32; Chen, 1995(3):38; Chen et al., 2000(1):23-24; Huang, 1990[ed.] 2:231; Huang et Gao, 1996:191; NZWDI, 1981:1918; Wu et Chou, 1985:165-172; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1079; Zhang, 1987[ed.] 1:269; Zhang, 1988:442; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、龍眼、蘋果、梨、李、棗、桃、梅、葡萄、無花果、檬果、黃皮等果汁，幼蟲爲害木防己(*Cocculus trilobus* DG.)、漢防己(*Linomenium acutum* Rehd.)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

3156. **Oraesia lata** (Butler) 平嘴壺夜蛾 (Chao, 1982:266; Chen et Wang, 1987:33; Hun., 1992:1029; NZWDI, 1981:1697; Yang, 1992:207-208; Yunn., 1987:1079; Zhang, 1987[ed.] 1:270; Zhang, 1988:442)
=*Calpe aureola* Graes.,
寄 主：柑橘、蝙蝠葛、紫堇、唐松草；成蟲(吸果)吸食柑橘等果汁。
分 佈：江西、湖南、雲南、河北、黑龍江；朝鮮、日本。

3157. **Orthosia carnipennis** (Butler) 鮮翅夜蛾 (Chang & Hung, 1986:90; Heppner, et Inoue 1992:199)
Taeniocampa carnipennis Butler, 1878:
寄 主：蘋果、梨、梅、桃、山櫻花、槲櫟。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本。

3158. **Orthosia gothica** Linnaeus 歌夢尼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:213)
寄 主：山楂、柳、櫟等屬植物。
分 佈：新疆、黑龍江；土耳其、歐洲。

3159. **Orthosia gracilis** Schiffermüller 單夢尼夜蛾 (Chen et al., 1988:188)
寄 主：蘋果(紅果)。
分 佈：遼寧。

3160. **Orthosia incerta** (Hüfnagel) 梦尼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:213; Xiao, 1992:1069)
別 名：*楊夢尼夜蛾*、*雲斑褐夜蛾*。
寄 主：蘋果、杏、山楂、海棠、櫟、楊、柳、大葉白蠟、複葉槭、大葉榆、月季等數十種樹木和灌木。
分 佈：臺灣、新疆、吉林、黑龍江；日本、印度、土耳其、歐洲。

3161. **Orthosia munda** (Denis et Schiffermüller) 黃灰夢尼夜蛾 (ASZI, 1987 2:213; Heppner, et Inoue, 1992:199)
Noctua munda Denis et Schiffermüller, 1775:
=*Phalaena gemina* Borkhausen, 1792:
=*Bombyx bimaculata* Haworth, 1803:
=*Bombyx geminatus* Haworth, 1803:
寄 主：李、櫟、榆、楊、柳、律草。
分 佈：臺灣、內蒙古、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

3162. **Othreis fullonia** (Clerck) 落葉夜蛾 (ASZI, 1987, 2:238; Chang & Hung, 1986:90; Chao, 1982:266; Heppner et Inoue, 1992:180; Han., 1992:1020; Xi, 1993:47; Yunn., 1987:1081; Zhang, 1988:442)
Phalaena fullonia Clerck, 1764:
=*Phalaena pomona* Cramer, 1775:
=*Noctua discoreae* Fabricius, 1781:
=*Ophideres princeps* Boisduval, 183 :
=*Phalaena cajeta* Wallace et Moore, 1866: (*nec* Cramer, 1775).
=*Ophiidres fullonica* Kishida, 1979: missp.
別 名：*擬通草木葉蛾*、*小通草木葉蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、桃、梨、杏、李、櫻桃、無花果、檬果、黃皮、番石榴、荔枝、葡萄等果汁；幼蟲為害木通、防己、刺桐等。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、浙江、江蘇、山東、黑龍江；朝鮮、日本、阿穆爾、東南亞、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲、大洋洲、非洲。

3163. **Othreis hypermnestra** (Cramer) 斑落葉夜蛾 (ASZI, 1987, 2:238; Yunn., 1987:1080)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、檬果等果汁。
分 佈：廣東、廣西、雲南；緬甸、印度、。

3164. **Oxyodes scrobiculata** (Fabricius) 佩夜蛾 (ASZI, 1987, 2:240; Heppner et Inoue, 1992:179; Han., 1992:1025; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Yunn., 1987:1084)
Noctua scrobiculata Fabricius, 1775:
=*Phalaena clytia* Stoll, 1782:
=*Noctua vittata* Fabricius, 1794:
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣、雲南、廣東、湖南；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3165. **Pangrapta obscurata** Butler 蘋眉夜蛾 (Chen et Wang, 1987:50-51; Zhang, 1987[ed.] 1:270)
別 名：*櫻桃紫褐夜蛾*。

寄 主：蘋果、梨、櫻桃(葉)。
分 佈：江西、陝西。

3166. **Panolis flammea** Schiffermüller 小眼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:214)
寄 主：歐洲赤松。
分 佈：黑龍江；日本、歐洲。

3167. **Panthea coenobita** Esper 盼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:195)
寄 主：松。
分 佈：黑龍江；蘇聯。

3168. **Paradiarsia punicea** (Hübner) 泛紫芒夜蛾 (Chen, 1986:101-102)
別 名：*泛紫模夜蛾*。
寄 主：懸鈎子、蒲公英等屬。
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

3168. **Parallelia arctotaenia** Guenée 玫瑰巾夜蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:261; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：幼蟲爲害中國槐、玫瑰，成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、桃、棶、枇杷、葡萄等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州。

3170. **Parallelia crameri** Moore 無腎巾夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:261; Zhao et al., 1997:191)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、棶、葡萄等。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州。

3171. **Parallelia curvata** Leech 污巾夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251; Zhang, 1987[ed.] 1:261)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：江西。

3172. **Parallelia fulvotaenia** Guenée 寬巾夜蛾 (Huang, 1990[ed.] 2:251; Zhang, 1987[ed.] 1:261)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：江西。

3173. **Parallelia gravata** Guenée 贅巾夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24; Zhang, 1987[ed.] 1:261; Zhao et al., 1997:191)
別 名：*巾夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、龍眼、棶等果汁。
分 佈：福建、江西。

3174. **Parallelia joviana** Stoll 隱巾夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:261)
寄 主：成蟲(吸果)吸食果汁。
分 佈：江西。

3175. **Parallelia maturata** Walker 霉巾夜蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhang,

1987[ed.] 1:262)
寄 主：幼蟲為害算盤珠，成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、棗、葡萄等果汁。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州。

3176. **Parallelia palumla** Guenée 柚巾夜蛾 (Chen et al. 2000(1):23-24)
寄 主：龍眼。
分 佈：福建。

3177. **Parallelia praetermissa** Warren 肾巾夜蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Zhang, 1987[ed.] 1:262)
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、葡萄等果汁。
分 佈：江西、湖南。

3178. **Parallelia staposa** Fabricus 石榴巾夜蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30;32; Yang, 1992:207-208; Zhang, 1987[ed.] 1:262)
寄 主：幼蟲為害石榴，成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、葡萄等果汁。
分 佈：江西、湖南、貴州。

3179. **Penicillaria jocoatrix** Guenée 垂尾夜蛾 (ASZI, 1987, 2:225; Chang & Hung, 1986:86; Heppner et al., 1992:184; Hun., 1992:1000; Tsai, 1965:111)
Penicillaria jocosatrix Guenée, 1852:
別 名：*檬果垂尾夜蛾*、*檬果夜盜蛾*。
寄 主：檬果、紅果欖仁樹。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、湖南；印尼、印度、斯里蘭卡、大洋洲、澳洲。

3180. **Pericyma (Alamis) cruegeri** (Butler) 鳳凰木同紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:235; Heppner, et Inoue, 1992:180; Luo et al., 1996:60)
Homoptera cruegeri Butler, 1886:
別 名：*鳳凰木夜蛾*。
寄 主：鳳凰木；成蟲(吸果)吸食檬果、黃皮、番石榴等果汁。
分 佈：廣東、海南、廣西；南太平洋諸島、大洋洲、澳洲。
天 敵：蜘蛛
Mantidae 螳螂科
松毛蟲惡姬蜂
小繭蜂
大腿蜂
黑卵蜂
Tachinidae 寄蠅科

3181. **Peridroma saucia** (Hübner) 疆夜蛾 (Heppner, et Inoue, 1992:201; Kuan, 1985:61-64)
Noctua saucia Hübner, 1808:
=*Noctua majuscula* Haworth, 1809:
=*Noctua margaritosa* Haworth, 1809:
=*Noctua aequa* Hübner, 1813:
=*Brotis orophila* Geyer, 1837:
=*Agrotis inermis* Harris, 1841:
=*Spaelotis infuscata* Blanchard, 1852:
=*Spaelotis stictica* Blanchard, 1852:
=*Agrotis impacta* Walker, 1857:

=*Agrotis intecta* Walker, 1857:
=*Agrotis ambrosioides* Walker, 1857:
=*Agrotis angulifera* Wallengren, 1860:
=*Agrotis ortonii* Packard, 1869:
=*Lycophotia ochronota* Hampson, 1903:
=*Agrotis saucia* var. *tenebricosa* Schawerda, 1929:
別 名：*絳色地老虎，土蠶，切根蟲*。
寄 主：有 27 科 49 屬 77 種。主要爲玉米、高粱、燕麥、小麥、馬鈴薯、大豆、菜豆、油菜、甘藍、卷心菜、白菜、塌棵菜(*Brassica narinosa* Bailey)、青菜(*Brassica chinensis* Linnaeus)、蘿蔔、薺(*Capsicum bursapastoris* (Linnaeus))、辣椒、南瓜、圓根(*Brassica rapa* Linnaeus)、野苜蓿(*Melilotus indicus* (Linnaeus))、雜種車軸草(*Trifolium hybridum* Linnaeus)、白車軸草(*Trifolium repens* Linnaeus)、紫苜蓿、草本犀狀黃氏(*Astragalus melilotoides* Pall.)、核桃(*Juglans regia* Linnaeus)等。
分 佈：四川；歐洲、北美、南美洲。

3182. **Plusiodonta coelonota** (Kollar) 肖彩金夜蛾 (Chao, 1982:267; Huang, 1990[ed.] 2:251; Huang et Gao, 1996:192; Ren, 1991:16; Zhang, 1987[ed.] 1:271)
Plusia coelonota Kollar, 1844:
=*Plusiodonta chalsytoides* Guenée, 1852:
=*Deva conducens* Walker, 1858:
=*Plusia agens Felder* et Rogenhofer, 1874:
別 名：*彩肖金夜蛾*。
寄 主：幼蟲爲害千金藤，成蟲(吸果)吸食柑橘等成熟果汁。
分 佈：福建、江西、浙江；印尼、印度、斯里蘭卡。

3183. **Plusia chryson** (Esper) 紫金翅夜蛾 (Chang & Hung, 1986:87, 90; Hun., 1992:1006; Yunn., 1987:1090; Zhang, 1987[ed.] 1:256)
=*Noctua orichalcea* Hbn.,
=*Noctua aeriferia* Swtb.,
別 名：*無花果葉夜蛾*。
寄 主：無花果、澤蘭屬、薄荷、蔥、紫蘭。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、浙江、安徽、新疆、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

3184. **Porphyrinia parva** (Hübner) 棗綺夜蛾 (Chen et al., 1993:57; Niu et Chen, 1998:30; Sun, 1984:382-383; Tsao et Wang, 1965:420-422)
別 名：*棗花心蟲、棗實蟲*。
寄 主：棗。
分 佈：湖南、浙江、安徽、河南、山西、河北、甘肅(蘭州)。

3185. **Pseudopanolis flavimacula takao** Inaba 僞小眼夜蛾 (ASZI, 1987, 2:214; Heppner et Inoue, 1992:199)
寄 主：紅松。
分 佈：臺灣、黑龍江；日本。

3186. **Pyrrhia bifasciata** (Staudinger) 核桃兜夜蛾 (ASZI, 1987, 2:204; Heppner et Inoue, 1992:202)
Grammesia bifasciata Staudinger, 1888:
=*Calymnia pryeri* Leech, 1889:

寄 主：大葉胡桃。
分 佈：臺灣、河北、黑龍江；日本、蘇聯。

3187. **Sarcopolia illoba** (Butler) 紅棕灰夜蛾 (ASZI, 1987, 2:212; Heppner et Inoue, 1992:198, Hua., 1992:963; Zhang, 1987[ed.] 1:245)
Agrotis illoba Butler, 1878:
=*Agrotis pacifica* Butler, 1878:
=*Hydraecia khasiana* Moore, 1881:
=*Mamestra declinans* Staudinger, 1888:
=*Polia assamica* Warren, 1913:
=*Aplecta differenciata* Bryk, 1949:
=*Polia f. pallida* Draudt, 1950:
寄 主：桑、菊、牛蒡、甜菜、大豆、豇豆、蔥、胡蘿蔔、櫻、香石竹、薔薇、棉、苜蓿、蕎麥、瞿麥、紫蘇、繁縷、虎杖、酸模、藜。
分 佈：臺灣、江西、湖南、江蘇、河北、黑龍江；朝鮮、日本、印度。

3188. **Selepa celtis** Moore 細皮夜蛾 (ASZI, 1987, 2:226; Chang et Hung, 1986:90; Heppner et Inoue, 1992:185; Hung, 1959: 162-166; Lu et Wen, 1985:78-80; NZWDI, 1981; Tsai, 1965:115; Xiao, 1992:1072)
Selepa celtis Moore, 1860:
=*Subrita curviferella* Walker, 1866:
別 名：*梨偽毒蛾、枇杷黃毛蟲*。
寄 主：檬果、蘋果、梨、梅、枇杷、三華李、嶺南梨、番石榴、菠蘿蜜、石榴、板栗、茶、八寶樹、人面果、大葉紫薇、秋楓、大葉合歡、茄苳、槭、九芎、大花紫薇、山黃麻。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、湖北、浙江、江蘇；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、澳洲。
天 敵：Mantidae 螳螂科
南海蜡
Charops sp. 懸繭姬蜂(蛹)
Goryphus basilaris Holmgren 橫帶溝姬蜂(蛹)
Xanthopimpla nana aequabilis Krieger 黃毛蟲黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)
金小蜂(寄生二齡幼蟲)
Formicidae 蟻科

3189. **Serrodes campana** Guenée 鈴斑翅夜蛾 (ASZI, 1987, 2:240; Heppner et Inoue, 1992:182; Xi, 1993:47; Yunn., 1987:1085; Zhang, 1987[ed.] 1:271; Zhang, 1988:442)
Serrodes campana Guenée, 1852:
=*Serrodes nigha* Guenée, 1852:
=*Serrodes callipepla* Prout, 1929:
別 名：*斑翅夜蛾*。
寄 主：幼蟲為害無患子，成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、柑橘、葡萄、櫻桃、無花果等果汁。
分 佈：江西、廣東、雲南、浙江、山東；印尼(爪哇)、緬甸、印度、斯里蘭卡、大洋洲、非洲。

3190. **Sesamia inferens** (Walker) 稻蛀莖夜蛾 (ASZI, 1987, 2:205; Chang & Hung, 1986:90; Chao, 1982:267; Heppner et Inoue; 1992:193)
Leucania inferens Walker, 1858:

=*Leucania proscripa* Walker, 1856:
=*Sesamia albiciliata* Snellen, 1880:
=*Sesamia tranquioaris* Butler, 1880:
=*Nonagria gracilis* Butler, 1880:
=*Nonagria innocens* Butler, 1881:
=*Sesamia hirayamae* Matsumura, 1928:
=*Sesamia cretica* Strand, 1920: (*nec* Lederer, 1857).
=*Sesamia sokutsusana* Strand, 1920:
=*Sesamia kosempona* Strand, 1920:
=*Sesamia cretocpodes* Strand, 1920:

別 名：*大螟蟲*，*紫螟蟲*，*稻夜盜*。

寄 主：香蕉、柑橘類、稻、麥、黍、玉米、甘蔗、薄荷、蘆葦。

分 佈：臺灣、福建、浙江、江蘇、四川、湖北；朝鮮、日本、琉球、菲律賓、婆羅洲、西里伯、越南、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、緬甸、安達曼群島、印度、斯里蘭卡。

天 敵：*Amauromorpha schoenobii* Viereck 姬蜂(幼蟲)
Dioctes lineatus Ishida (幼蟲)
Enicospilus sakaguchii Matsumura et Uchida (幼蟲)
Eriborus sinicus Holmgre 螟黑瘦姬蜂(幼蟲)
Goryphus basilaris Holmgre = *longicornis* Ishida 橫帶溝姬蜂(幼蟲)
Ichneumon sp. 大螟白星姬蜂(幼蟲)
Itoplectis naranyae 螟蛉瘤姬蜂(幼蟲)
Nesopimpla naranyae Ashmead (幼蟲)
Xanthopimpla emaculata Szépligeti (幼蟲)
Temelucha biguttula Matsumura 螟黃抱緣姬蜂(螟黃瘦姬蜂)(幼蟲)
Xanthopimpla flavolineata Cameron 無斑黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla stemmator Thunberg 螟黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Apanteles flavipes Cameron 螟黃足絨繭蜂(幼蟲)
Bracon chinensis Szepligeti 中華繭蜂(幼蟲)
Bracon onukii Watanabe 螟黑紋繭蜂(幼蟲)
Microbracon chinensis Szépligeti (幼蟲)
Shirakia schoenobii Viereck (幼蟲)
Tropobracon schoenobii (Viereck) 三化螟繭蜂(幼蟲)
Tetrastichus inferens Yoshimoto 大螟嚙小蜂(蛹)

3191. **Sinna extrema** (Walker) 胡桃豹夜蛾 (ASZI, 1987, 2:219; Heppner et Inoue, 1992:187; Hun., 1992:990; Zhang, 1987[ed.] 1:248)
Deiopeia extrema Walker, 1854:
=*Teinopyga reticularis* Felder, 1874:
=*Sinna clara* Butler, 1881:
=*Sinna fentoni* Butler, 1888:.
=*Sinna ornatissima* Alphraky, 1897:
=*Sinna koresinna* Bryk, 1949:

寄 主：胡桃屬、楓楊。

分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、黑龍江；朝鮮、日本。

3192. **Speiredonia martha** Bulter 晦旋目夜蛾 (Zhao et al., 1997:191)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

3193. **Speiredonia retorta** Linnaeus 旋目夜蛾 (Chen et Wang, 1987:33; Huang, 1990[ed.] 2:251; Xie et al., 1994, 20(4):30-32; Yang, 1992:207-208; Zhao et al., 1997:191)

寄 主：幼蟲爲害合歡，成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、李、榛、枇杷、葡萄等果汁。

分 佈：福建、江西、貴州、陜西。

3194. **Spirama retoria** (Clerck) 旋目夜蛾 (Chao, 1982:268; Heppner, et Inoue, :181; Xi, 1993:47; Zhang, 1988 443)

Phalaena retoria Clerck, 1759:
=*Noctua spiralis* Fabricius, 1775:
=*Erebus chimista* Kollar, 1844:
=*Spirama suffumosa* Guenée, 1852:
=*Spirama cohaerens* Walker, 1858:
=*Hypopyra martha* Butler, 1878:
=*Spirama simplicior* Butler, 1881:
=*Spirama jinchuena* Butler, 1882:
=*Spirama inaequalis* Butler, 1883:

寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、蘋果、梨、桃、杏、李、葡萄、櫻桃、無花果等果汁。

分 佈：福建、山東；朝鮮、日本、菲律賓、印尼、印度、尼泊爾。

3195. **Spodoptera exigua** (Hübner) 甜菜夜蛾 (Amaldoss et Hsu, 1989:239-250; Chang et al., 1982:103; Chen et Chang, 1988:194; 1998:428-429; Cheng et Kao, 19993:396-402; Cheng et al., 1985:315-322; 1988:429; Chu et Han, 1989:313; 1990:359; Chu et Wu, 1987:414; 1989:312-313; 1990:360; 1992:91-99; Dai et Yang, 1993, 19(2):20-21; Fang, 1992:355; Feng et al., 1995, 4:39-41; Guan et al., 1996, 25(2):168-172; Liu et al., 1995, 21(6):29-30; Shang et al., 1990:363; Wang et al., 1988, 8(2):87-93; Wang et al., 1998, 25(4):341-344; Wu et Chu, 1992:101-107; 109-120; Wu et al., 1992, 12(2):100-102; Wu et al., 1995, 22(1):95-96; Xu et al., 1998, 25(2):133-136; Xu et al., 1998, 27(1):73-77; Xu et al., 1999, 26(1):20-24; Yen et Chang, 1988:192; Yen et al., 1988:303-309; Yin, 1993, (4):35-36; Zhou et al., 1993, (1):24-27)

寄 主：雜食，園藝、雜糧及特用作物等。

分 佈：臺灣、安徽、全國。

天 敵：白僵菌
蟾蜍

3196. **Spodoptera litura** (Fabricius) 斜紋夜蛾 (ASZI, 1987, 2:199; Chang, 1971:72-74; 189-200; 1987:40; Chang & Hung, 1986:90; Chang et al., 1986:419; Chao, 1982:267; Chen, 1981:46; Chen et Hsiao, 1984:219-229; Chien et Chow, 1985:379-387; Chiu et Chien, 1979:273-278; Chou et al., 1984:331-336; Chu et Ou-Yang, 1986:113; 1987:166; 415; 1989:49-57; 231-238; 313; 1990:271-277; 1991:188-196; Chu et Shih, 1985:98-113; 1986:117; 1987:415-416; Chu et Wu, 1992:91-99; Chu et al., 1976:161-172; 173-182; Chu et al., 1987:185-192; 193-197; 1987:193-197; Fang, 1992:355; Fang et al., 1993:211-225; Gao et al., 1994(1):32; Heppner et Inoue, 1992:194; Hau et Lo, 1986:112; Huang et Zhang, 1994:36-39; Hun., 1992:971; Lee, 1987:87-94; 1989:27-36; Lee et Shih, 1995:249-254; Liu et Yang, 1985:451; Luo et Jin, 1995:87; Ou-Yang, 1994:183-205; Ou-Yang et Chu, 1988: 143-150; 186-187; 1990:27-36; 1991:39-47; 1994:173-182; Pingtung AC., 1986:82-84; Shih et Chu, 1985:131-141; 1995:59-69; 71-79; 311-317; 381-392; 1986:117; 1987:31-36; Sun et Gai, 1999, 26(4):329-332; Suzhou CS., 1985:246; Tang et Su, 1988:11-12; Tsai, 1965:115; Tsai et al., 1988; 426; Xie et al., 1999, 21(2):82-92; Yang et al., 1975:446; Yen et Chang, 1988:192; Yen et al., 1987:173; Yin, 1993:301; Zhang, 1987[ed.] 1:239); Zhao et al., 1997:191; Zheng, 1982:246)

Noctua litura Fabricius, 1775:
=*Noctua histrionica* Fabricius, 1775:
=*Noctua elata* Fabricius, 1781:
=*Prodenia ciligera* Guenée, 1852:
=*Prodenia tasmanica* Guenée, 1852:
=*Prodenia glaucistriga* Walker, 1856:
=*Prodenia subterminalis* Walker, 1856:

=*Prodenia declinata* Walker, 1857:
=*Mamestra albisparsa* Walker, 1862:
=*Spodoptera retin* Wallace et Moore, 1866: (*nec* Freyer, 1845).
=*Prodenia evanescens* Butler, 1884:
別 名：*蓮紋夜蛾*。
寄 主：雜食性，檬果、龍眼、梨、棕、草莓、柿、柑橘、蓮霧、刺番荔枝、酪梨、桑、茶、泡桐、榉、櫟、柳、枸杞、甘薯、棉、芋、荷、向日葵、煙、芝麻、蓖麻、玉米、高粱、瓜類、豆類及農作物蔬菜等植物 99 科 290 多種。
分 佈：臺灣、福建、江西、海南、我國溫暖地區，北方偶爾發生；亞洲(熱帶、亞熱帶地區)、日本、馬來、印度、澳洲、非洲。
天 敵：*Calosoma maderae chinense* Kirby 中華金星步甲
Chlaenius bioculatus Motschulsky 雙斑青步甲
Rhynchium brunneum Fabricius 黃唇蜾蠃蜂
Metapius (*Ceratopius*) *kakogawanus* Matsumura (幼蟲)
Metapius (s. str.) *rufus browni* (Ashmead) 斜紋夜蛾盾臉姬蜂(幼蟲)
Apanteles ruficrus Haliday 螟蛉絨繭蜂(幼蟲)
Chelonus formosanus Sonan (幼蟲)
Litomastix maculata Ishii 夜蛾跳小蜂(斑翅多胚跳小蜂)
Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂(卵)
Exorista sorbillans (Wiedemann) 家蠶追寄蠅

3197. **Stenoloba confusa** Leech 交蘭紋夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24)
寄 主：龍眼。
分 佈：福建。

3198. **Sympis rufibasis** (Guenée) 合夜蛾 (Heppner et Inoue, 1992:177; Huang, 1990[ed.] 2:251; Yunn., 1987:1084)
Sympis fufibasis Guenée, 1852:
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘果汁。
分 佈：臺灣、雲南；印尼(爪哇)、緬甸、印度、斯里蘭卡。

3199. **Sypna picta** Butler 涂閃夜蛾 (ASZL 1987, 2:239; Hun., 1992:1021)
=*Sypna achatina* Butler,
寄 主：懸鉤子、槲、紋股藍、栓皮櫟。
分 佈：雲南、湖南、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

3200. **Sypna simplex** Leech 單閃夜蛾 (Yang, 1992:207-208)
寄 主：梨(吸果)。
分 佈：貴州。

3201. **Targalla delatrix** (Guenée) 蒲桃夜蛾 (Chang & Hung, 1986:86; Chen, 1981:46; Heppner et Inoue, 1992:185)
Phlegetonia delatrix Guenée, 1852:
別 名：*黑基鑲夜蛾*。
寄 主：蓮霧、蒲桃、馬來蒲桃。
分 佈：臺灣；印尼、馬來亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、昆士蘭、日本。

3202. **Thyas juno** (Dalman) 肖毛翅夜蛾 (ASZI, 1987, 2:232; Chen et Wang, 1987:33; Heppner et Inoue, 1992:181; Hun., 1992:1013; Yunn., 1987:1074)

Noctua juno Dalman, 1823:
=*Ophideres elegans* Van de Hoeven, 1840:
=*Lagoptera multicolor* Guenée, 1852:
=*Thyas bella* Bremer et Grey, 1853:
=*Dermaleipa ceramensis* Prout, 1922:
=*Dermaleipa renalis* Bryl, 1949:

別 名：*毛翅夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食柑橘、梨、桃、李、蘋果等果汁；幼蟲爲害李、樺、木槿等。
分 佈：雲南、四川、湖南、江西、浙江、湖北、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、印尼、印度。

3203. **Tiracola aureata** Holloway 掌夜蛾 (ASZI, 1987, 2:213; Chang & Hung, 1986:90; Heppner et Inoue, 1992:199; Hun., 1992: 964; Yunn., 1987:1061; Zhang, 1987[ed.] 1:245)

Tiracola aureata Holloway, 1989:
=*Tiracola plagiata* auct. (*nec* Walker, 1857).

別 名：*柑橘夜蛾*。
寄 主：柑橘、香蕉、茶、蔥、甘藍、蘿蔔、結球白菜、萵苣、水茄。
分 佈：臺灣、福建、江西、浙江、湖南、雲南、四川、江西；印尼(沙勞越)、印度、斯里蘭卡、大洋洲、美洲。

3204. **Tolydesma otiosa** Guenée 暗紋粉夜蛾 (Chen et al., 2000(1):23-24)

寄 主：龍眼(吸果)。
分 佈：福建。

3205. **Trachea atriplicis** Linnaeus 陌夜蛾 (Xi, 1993:47; Zhang, 1988:443)

別 名：*白戟銅翅夜蛾*。
寄 主：成蟲(吸果)吸食蘋果、梨、桃、杏、李、櫻桃、葡萄、無花果等果汁。
分 佈：山東。

3206. **Trichoplusia ni** (Hübner) 銀紋夜盜 (Chang, 1987:40; Chang & Hung, 1986:87; Chou et al., 1984:331-336; Heppner at Inoue, 1992:184; Tsai, 1965:113)

Noctua ni Hübner, 1803:
=*Plusia extrahens* Walker, 1858:
=*Plusia humilis* Walker, 1858:
=*Plusia significans* Walker, 1858:
=*Plusia innata* Herrich-Schäffer, 1868:
=*Plusia brassicae* Riley, 1870:
=*Plusia echinocystidis* Strecker, 1874:
=*Plusia f. florida* Dannehl, 1929:

寄 主：葡萄、可可樹、玉蔚葛藤、苧麻、豌豆、番茄、牛蒡、萵苣、胡蘿蔔、蘿蔔、花椰菜、結球白菜、落花生、罌粟、煙草。
分 佈：臺灣、福建、中國大陸、日本、印度、小亞細亞、歐洲、非洲、美國、古巴。
天 敵：*Brachymeria lasus* (Walker) 廣腿小蜂(蛹)

3207. **Trichosea champa** Moore 黃腹劍紋夜蛾 (Chang, 1987:40; Wu, 1977:83-86)

寄 主：葡萄、檜木(油葉茶)(*Euonymus japonica* Thunb.)(茶科)、南燭(*Vaccinium bracteatum*)(越橘科 Vacciniaceae)

分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東部、越南、印度。

3208. **Valeria tricristata** Draudt 碧鷹冬夜蛾 (ASZI, 1987, 2:218; Hun., 1992:970)

寄 主：黑刺李。

分 佈：江西、湖南。

3209. **Xylophylla punctifascia** Leech 木葉夜蛾 (Xie et al., 1994, 20(4):30)

寄 主：葡萄。

分 佈：湖南。

3210. **Xylena formosa** (Butler) 麗木冬夜蛾 (ASZI, 1987, 2:217; Heppner et Inoue, 1992:197; Yunn., 1987:1063)

Calocampa formosa Butler, 1878:

寄 主：果樹、煙草、豌豆、艾屬、博落回、羊蹄、虎杖。

分 佈：臺灣、雲南、江蘇；日本。

RHOPALOCERA 蝶亞目

Hesperiidae 弄蝶科

3211. **Erionota torus** Evans 香蕉弄蝶 (Chao, 1982:273; Chen, 1993(1):65-67; Heppner at Inoue, 1992:131; Huang, 1990[ed.] 2:289-290; Huang et Gao, 1996:272; Hun., 1992:1108; Lin, 1986[ed.]:339-340; Luo et Li, 1998:93; NZWDI, 1981:1959; Tsai, 1995:45-47; Tsai et al., 1989:310-311; 1990:419-426; Zhou et Zhang, 1995:37-41)

Erionota torus Evans 1941:

別 名：*香蕉卷葉蟲*、*蕉苞蟲*、*巨弄蝶*、*蕉弄蝶*。

[Banana roller]

寄 主：芭蕉科(香蕉、芭蕉、柴蕉、美人蕉)、瓊麻。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南；印度、錫金。

天 敵：*Cotesia erionotus* (Wilkinson)　蕉弄蝶絨繭蜂

Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂

Agiommatus erionotus Huang　弄蝶偏眼金小蜂(卵)

Ooencyrtus erionotae Ferriere　卵跳小蜂

Elasmus philippinensis Ashmead　菲島扁小蜂

3212. **Pyrgus maculatus** Bremer et Grey 花弄蝶 (Chao, 1982:274; Hu et Hu, 1994, 20(5):48-49; Hun., 1992:1107)

寄 主：草莓、醋栗、茅莓、繡線菊。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、河南、陝西；朝鮮、日本。

3213. **Suastus gremius gremius** (Fabricius) 黑星弄蝶 (Chang & Hung, 1986:111; Chao, 1982:274; Heppner et Inoue, 1992:131; Tsai, 1965:124)

Hesperia gremius Fabricius, 1798:

=*Hesperia disu* Kollar, 1844:

=*Hesperis divodasa* Moore, 1865:

寄 主：可可椰子類、羅比親王海棗。

分 佈：臺灣、華南；中南半島、印度、斯里蘭卡、尼泊爾。

Papilionidae 鳳蝶科

(Chen et al., 1993(3):32; Chen, 1993, 10(3):168-173)

3214. **Graphium agamemnon agamemnon** Linnaeus 綠斑鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:103; Heppner et Inoue, 1992:133)

Papilio agamemnon Linnaeus, 1785:
Graphium agamemnon agamemnon Linnaeus 1857:
寄 主：釋迦、烏心石、暗羅、白玉蘭。
分 佈：臺灣、廣東；澳洲。

3215. **Graphium doson postianus** (Fruhstorfer) 青斑鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:103; Heppner et Inoue, 1992:133)

Papilio postianus Fruhstorfer, 1908:
=*Papilio postianus* ab. *hankuronis* Matsumura, 1929:
=*Papilio postianus* ab. *kuronis* Matsumura, 1929:
=*Papilio postianus* ab. *akanashi* Matsumura, 1929:
=*Papilio postianus* ab. *contaminatus* Esaki et Nomura, 1930:
寄 主：釋迦、白玉蘭、含笑、烏心石、樟、暗羅。
分 佈：臺灣、海南、香港；朝鮮、日本、馬來亞、印度。
天 敵：*Apanteles papilionis* Viereck 鳳蝶絨繭蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂(蛹)

3216. **Graphium sarpedon** (Linnaeus) 翠鳳蝶 (Chao, 1982:277; Heppner, et Inoue, 1992:133)

Papilio sarpedon Linnaeus, 1758:
寄 主：樟、楠、肉桂。
分 佈：臺灣、福建、廣東。

3217. **Papilio bianor** Cramer 碧鳳蝶 (Chao, 1982:276; Hun., 1992:1074; Zhang, 1987[ed.] 1:280)

別 名：*黑鳳蝶*。
寄 主：柑橘、山椒、吳茱萸、黃蘗、羌活。
分 佈：福建、江西、廣東、四川、湖南、河南、陜西、吉林。
天 敵：*Pteromalus puparum* Linnaeus 蛹金小蜂(蛹)

3218. **Papilio demoleus** Linnaeus 黃花鳳蝶 (Chao, 1982:277; Chiu et al., 1985:1-8; Chu, 1961:211-213; Heppner, et Inoue, 1992 :133; Huang, 1990[ed.] 2:256-260; Huang et Gao, 1996:195; NZWDI, 1981:1922)

別 名：*達摩鳳蝶*、*無尾鳳蝶*。
寄 主：芸香科之柑橘類，以及小茴香、胡蘿蔔等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江(我國柑橘產區)；日本、越南、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Coccygomimus disparis* (Viereck) 舞毒蛾黑瘤姬蜂
Pteromalus puparum Linnaeus 蛹金小蜂(蛹)

3219. **Papilio demoleus libanius** Fruhstorfer 無尾鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:105; Heppner et Inoue, 1992: 133)

Papilio demoleus libanius Frijstprfer. 1908:
=*Papilio libanius* ab. *radiata* Hirayama, 1941:
=*Papilio libanius* ab. *wesoui* Murayama, 1958:

寄 主：柑橘類、雙面刺、過山香。
分 佈：臺灣、華南；中南半島、印度、阿拉伯。

3220. **Papilio dialis tatsuta** Murayama 臺灣烏鴉鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:104; Heppner et Inoue, 1992:134)
=*Papilio andronicus* Fruhstorfer, 1908: preocc.
=*Papilio tatsuta* ab. *tatsuta* Nakahara, 1941:
=*Papilio tatsuta* ab. *neotatsuta* Murayama et Shimonoya, 1963:
=*Papilio taiwanicus* Moonen, 1989:
Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970: repl. name.
寄 主：柑橘類、賊仔樹、食茱萸。
分 佈：臺灣、華南。

3221. **Papilio helenus** Linnaeus 白斑鳳蝶 (Chao, 1982:277; Hun., 1992:1075; Zhang, 1987[ed.] 1:280)
別 名：*黑蝶、楞鳳蝶、白緞帶鳳、緞帶鳳蝶*。
寄 主：柑橘、兩面針、黃檗。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、西藏；日本、東南亞等地。

3222. **Papilio helenus fortunius** Fruhstorfer 白斑鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:104; Heppner et Inoue, 1992:134)
Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908:
=*Papilio fortunius* ab. *opacus* Murayama et Shimonoya, 1966:
=*Papilio fortunius* ab. *florentis* Murayama et Shimonoya, 1968:
寄 主：柑橘類、雙面刺、花椒。
分 佈：臺灣、華南、華中；印度、南洋各地。

3223. **Papilio hoppo** Matsumura 雙環鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:104; Heppner et Inoue, 1992:134)
Papilio hoppo Matsumura, 1908:
=*Papilio hopponis* Matsumura, 1907: nom. nud.
別 名：*北埔鳳蝶*。
寄 主：蕓香科植物。
分 佈：臺灣。

3224. **Papilio machaon** Linnaeus 茴香鳳蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:280)
寄 主：枳殼、茴香、芹菜、胡蘿蔔、當歸、防風。
分 佈：江西。

3225. **Papilio memmon** Linnaeus 迷囊鳳蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:280)
寄 主：柑橘。
分 佈：江西。

3226. **Papilio memnon heronus** Fruhstorfer 大鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:104; Chao, 1982:277, Heppner et Inoue, 1992:134; Tsai, 1965:125)
Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929:
=*Papilio herunus taihokuana* Matsumura, 1929:
=*Papilio heronus* ab. *pseudolampsacus* Murayama et Shimonoya, 1968:
別 名：*黃絲鳳蝶*。
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣、福建、華南；日本九州、南洋各島、印度。

天 敵：*Xanthopimpla pedator* Fabricius 印黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Xanthopimpla punctata (Fabricius) 廣黑點瘤姬蜂(幼蟲)
Pteromalus puparum Linnaeus 蝶蛹金小蜂(蛹)

3227. **Papilio nephelus** Boisduval 雲鳳蝶 (Hun., 1992:1075)
Papilio nephelus Boisduval, 1836:
寄 主：柑橘屬。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南；馬來西亞、印尼。

3228. **Papilio nephelus chaonulus** Fruhstorfer 臺灣白紋鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:104; Heppner et Inoue, 1992:134)
Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902:
=*Papilio chaonulus* ab. *chaonides* Niepelt, 1914:
=*Papilio chaonulus* ab. *ukon* Matsumura, 1939:
=*Papilio chaonulus* ab. *horishana* Tanaka, 1940:
=*Papilio chaonulus* ab. *unipunctata* Dufrane, 1946:
=*Papilio chaonulus* ab. *addenda* Dufrane, 1946:
=*Papilio chaonulus* ab. *jacouleti* Dufrane, 1946:
=*Papilio chaonulus* ab. *imcomptus* Murayama, 1958:
寄 主：柑橘類、飛龍掌血、雙面刺。
分 佈：臺灣；中南半島、印尼。

3229. **Papilio paris** Linnaeus 巴黎綠阿鳳蝶 (Chao, 1982:276; Heppner, et Inoue, 1992:134; Hun., 1992:1076; Zhang, 1987[ed.] 1:280)
Papilio paris Linnaeus, 1758:
別 名：*寶鏡鳳蝶、後藍紋鳳蝶、巴黎綠鳳蝶*。
寄 主：柑橘、芸香科。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東。

3230. **Papilio polytes** Linnaeus 玉帶鳳蝶 (Chao, 1982:277; Chen et Wang, 1987:243-244; Fu, 1995(3):43; Heppner et Inoue, 1992:133; Huang et Gao, 1996:194; Hun., 1992:1074; NZWDI, 1981:1923; Tsai, 1965:125; Zhang, 1987[ed.] 1:280)
Papilio polytes Linnaeus, 1758:
寄 主：柑橘、枸橘、花椒、山椒。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、山東、河南、陝西(柑橘產區都有)；朝鮮、日本、菲律賓、馬來亞、印度、澳洲。
天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama 晉草蛉(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker) 廣蛹闊小蜂(蛹)
Pteromalus puparum Linnaeus 蛹金小蜂(蛹)
Trichogramma sericihi Pang et Chen 鳳蝶赤眼蜂(卵)

3231. **Papilio polytes pasikrates** Fruhstorfer 玉帶鳳蝶巴斯亞種 (Heppner et Inoue, 1992:133)
Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer, 1908:
=*Papilio pasikrates* ♂ ab. *takahashii* Sonan, 1936:
=*Papilio pasikrates* ♀ ab. *seriata* Hirayama, 1939:
=*Papilio pasikrates* ♂ ab. *inaequalis* Murayama, 1958:
=*Papilio pasikrates* ♂ ab. *nubes* Murayama, 1958:
=*Papilio pasikrates* ♀ ab. *scintillans* Murayama, 1959:
=*Papilio pasikrates* ♂ ab. *magicus* Murayama, 1959:
=*Papilio pasikrates* ♂ f. *fulvifasciatus* Shirzu, 1060:

=*Papilio pasikrates* ♂ ab. *gynaiensis* Murayama et Shimonoya, 1963:
=*Papilio pasikrates* ♀ ab. *baikeiensis* Murayama et Shimonoya, 1963:
=*Papilio pasikrates* ♀ f. *colosseus* Murayama et Shimonoya, 1965:
寄 主：柑橘類。
分 佈：臺灣。

3232. **Papilio polyctor thrasymedes** Fruhstorfer 烏鴉鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:105; Heppner et Inoue, 1992:134)
=*Papilio thrasymedes formosanus* Rebel, 1906: preocc.
=*Papilio thrasymedes takasago* Naiahara et Esaki, 1930: repl. name.
=*Papilio thrasymedes chengkon* Chen, 1974:
別 名：*玉帶鳳蝶*。
寄 主：柑橘類、雙面刺、賊仔樹、飛龍掌血、食茱萸。
分 佈：臺灣、河南、陜西；朝鮮、日本。

3233. **Papilio protenor** Cramer 藍鳳蝶 (Chao, 1982:278; Hun., 1992:1074; Zhang, 1987[ed.] 1:281)
寄 主：柑橘、枸橘、山椒、兩面針。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、廣東、山東、陜西。

3234. **Papilio protenor amaura** Jordan 黑鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:105; Heppner et Inoue, 1992:133; Tsai, 1965:125)
Papilio protenor amaura Jordan, 1909:
=*Papilio amaura* ab. *kagaribi* Nakahara, 1938:
=*Papilio amaura* ab. *chungi* Murayama, 1958:
寄 主：柑橘類、雙面刺、賊仔樹、飛龍掌血。
分 佈：臺灣；琉球、日本。
天 敵：*Pteromalus puparum* Linnaeus 蛹金小蜂(蛹)

3235. **Papilio thaiwanus** Rothschild 臺灣鳳蝶 (Chang & Hung, 1986:105; Heppner et Inoue, 1992:134)
Papilio thaiwanus Rothschild, 1898:
=*Papilio annaeus* Fruhstorfer, 1908:
=*Papilio matsumurae* Wileman, 1909:
=*Papilio nautes* Oberthür, 1918:
=*Papilio watanabei* Matsumura, 1927:
=*Papilio thaiwanus* ♂ ab. *e-fasciatus* Mitono, 1027:
=*Papilio thaiwanus* ♂ ab. *kurosotsu* Nakahara, 1938:
=*Papilio thaiwanus* ♂ ab. *kawaii* Hirayama, 1939:
=*Papilio thaiwanus* ♂ ab. *janome* Hirayama, 1939:
=*Papilio thaiwanus* ♂ ab. *procursus* Murayama et Shimonoya, 1968:
寄 主：柑橘類、飛龍掌血。
分 佈：臺灣。
天 敵：*Pteromalus puparum* Linnaeus 蛹金小蜂(蛹)

3236. **Papilio xuthus** Linnaeus 柑橘鳳蝶 (ASZI, 1987, 2:304; Beijing FC., 1980[ed.]:298; Chang & Hung, 1986:105; Chao, 1982:278; Chen et Wang, 1987:243-244; Chen et al., 1993(3):32; Fu, 1995(3):43; Heppner et Inoue, 1992:133; Huang, 1990[ed.] 2:256-260; Huang et Gao, 1996:194; Hun., 1992:1073; Liu, 1982 [ed.]:236-237; Tsai, 1965:125; Wang, 1987[ed.]:320-321; Wang et al., 1994(2):36-38; Wang et al., 1997, 14(1):33; Xiao, 1992:1139; Zhang, 1987[ed.] 1:281; Zhong et al., 1999(6):21)
Papilio xuthus Linnaeus, 1767:
=*Papilio xuthus koxinga* Fruhstorfer, 1908:
=*Papilio xuthus* ab. *umbriferus* Murayama et Shimonoya, 1966:

別　名：*柑橘黃鳳蝶，春鳳蝶，花椒鳳蝶，橘黑黃鳳蝶，橘狗，燕尾蝶，鳳子蝶，橘紅紋鳳蝶，黃波羅鳳蝶。*
[Yellow swallowtail, Small citrus dog]
寄　主：柑橘、柚子、花椒、山花椒、枸橘、枳殼、黃菠蘿、黃柏、黃檗、賊仔樹、吳茱萸。
分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。
天　敵：*Chrysoa shansiensis* Kuwayama　晉草蛉(幼蟲)
Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus luctuosus (Smith)　野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Brachymeria lasus (Walker)　廣闊小蜂(蛹)
Pteromalus puparum (Linnaeus)　蝶蛹金小蜂(蛹)
Tetrastichus ayyari Rohwer　印度嚙小蜂
Trichogramma sericini Pang et Chen　鳳蝶赤眼蜂(卵)
Sycanus croceovittatus Dohrn.　黃獵蝽

3237. **Princeps demoleus** Linnaeus 黃花鳳蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:281)
寄　主：柑橘、柚。
分　佈：江西。

Pieridae 粉蝶科

3238. **Aporia crataegi** Linnaeus 山楂粉蝶 (Beijing FC., 1980[ed.]:297-298; Chen et Wang, 1987:55-56; Chou & Chiu, 1962:91; Huang, 1990[ed.] 2:142-144; Li, 1965:545-551; Liu, 1982[ed.]:235-236; Sun, 1984:365-367; Wu et al., 1998(4):25; Xiao, 1992:1129)
別　名：*山楂絹粉蝶，梅白粉蝶。*
寄　主：蘋果、梨、梅、杏、沙果、桃、李、山荊子、山楂、山里紅、花楸、櫻桃、春榆、鼠李、山楊、毛榛子、卵葉樺、山柳。
分　佈：四川、河南、陝西、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲。
天　敵：蜘蛛
胡蜂
桿菌
白僵菌
Coccygomimus disparis (Viereck)　舞毒蛾黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus instigator (Fabricius)　古北黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus luctuosus (Smith)　野蠶黑瘤姬蜂(幼蟲)
Coccygomimus nipponicus Uchida　日本黑瘤姬蜂(幼蟲)
Ephialtes capulifera (Kriechbaumer)　黑基長尾姬蜂(幼蟲)
Pimpla disparis Viereck　姬蜂(蛹)
Theronia atalantae gestator (Thunberg)　脊腿囊爪姬蜂(幼蟲)
Apanteles glomeratus Linnaeus　黃絨繭蜂(寄生率有時高達 70 %)
Apanteles flavipes Cameron　白絨繭蜂

Brachymeria femorata (Panzer) 粉蝶闊小蜂(蛹)
Brachymeria lasus (Walker) 蛹闊小蜂(蛹)
Pteromalus puparum Linnaeus 蝶蛹金小蜂(蛹)
Pteromalus sp. 赤眼金小蜂
Exorista larvarum (Linnaeus) 古毒蛾追寄蠅

3239. **Aporia** sp. 沙棗絹粉蝶 (Pang et al., 1978:7-8)
寄 主：沙棗(胡頹子)。
分 佈：陝西、山西。

3240. **Gonepteryx aspasia** Menetrie 銳角翅粉蝶 (Chen et al., 1993:42)
寄 主：棗。
分 佈：

3241. **Gonepteryx rhamni** Linnaeus 角翅粉蝶 (Chen et al., 1993:41; Hun., 1992:1080; Zhang, 1987[ed.] 1:279)
別 名：*鉤翅粉蝶*、*鼠李粉蝶*、*鉤翅黃蝶*。
寄 主：棗、鼠李、酸棗。
分 佈：湖南、江西、廣西、廣西、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山西、新疆、遼寧、黑龍江；緬甸、印度。

Lycaenidae 小灰蝶科

3242. **Celastrina argiolus** Linnaeus 琉璃灰蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:290)
寄 主：蘋果、梨、鼠李、冬青、常青藤、蠶豆。
分 佈：江西。

3243. **Deudorix epijarbas** (Moore) 荔枝小灰蝶 (Chao, 1982:284; Chen et al., 1994:57; Chien, 1955:144; Heppner, et Inoue, 1992:137; Huang, 1990[ed.] 2:279-281; Huang et Gao, 1996:221; Huang et al., 1997:125; Tan et al., 1999, 26(3):213-218)
Dipsas epijarbas Moore, 1857:
寄 主：荔枝、龍眼(果)。
分 佈：福建、廣東、廣西；印度。

3244. **Deudorix epijarbas menesicles** Frehstorfer 恆春小灰蝶 (Chang & Hung, 1986:110; Heppner et Inoue, 1992:137; Tsai, 1965:126)
Deudorix epijarbas menesicles Frehstorfer, 1912:
=*Rapala koshunna* Sonan, 1931:
=*Deudorix menesicles* ab. *nubilatus* Murayama et Shimonoya, 1968:
別 名：*緋色小灰蝶*。
寄 主：龍眼、荔枝(果實)。
分 佈：臺灣；菲律賓、西里伯、摩鹿加群島、印度、斯里蘭卡、印澳太區、澳洲。

3245. **Ropala** sp. 枇杷小灰蝶 (Chao, 1982:285, Huang et Gao, 1996:229)
寄 主：枇杷、龍眼(花穗)。
分 佈：福建。

3246. **Spindasis lohita** Horsfield 荔枝藍灰蝶 (Chao, 1982:285; Heppner, et Inoue, 1992:138; Zhang, 1987[ed.] 1:291)
Amblypodia lohita Horsfield, 1829:
別 名：*茶二尾燕蝶，茶灰蝶*。
寄 主：梨、咖啡、茶。
分 佈：福建、江西。

3247. **Spindasis syama** (Horsfield) 斑馬灰蝶 (Heppner et Inoue, 1992:138; Hun.1992:1106)
Amblypodia syama Horsfield, 1829:
=*Aphnaeus syama* ♀ var. *hirayamae* Matsumura, 1919:
=*Aphnaeus syama* ab. *paroeica* Strand, 1922:
=*Aphnaeus syama* ab. *nakaharai* Naritomi, 1941:
別 名：*三星雙尾燕蝶，雙尾燕蝶*。
寄 主：番石榴，薯蕷。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、雲南、陝西、河南；印尼、馬來西亞、緬甸、泰國、印度、錫金。

Nymphalidae 蛺蝶科

3248. **Acraea issoria formosana** (Fruhstorfer) 苧麻黃蛺蝶 (Heppner et Inoue, 1992:145; Hun., 1992:1091)
Pareba issoria formosana Fruhstorfer, 1914:
=*Acraea formosana* ab. *improvisus* Murayama, 1959:
別 名：*苧麻蛺蝶，黃斑蛺蝶*。
寄 主：苧麻、蕁麻等，在海南島還爲害咖啡、刺桐、茶樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北等省；日本、越南、馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

3249. **Calinaga buddha** Moore 黃領蛺蝶 (Heppner et Inoue, 1992:148; Hun., 1992:1098)
Calinaga buddha Moore, 1857:
別 名：*桑蛺蝶，黃領蝶*。
寄 主：桑樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、河南；緬甸、印度、孟加拉、錫金、不丹、尼泊爾。

3250. **Calinaga buddha formosana** Fruhstorfer 苜環蝶 (Chang & Hung, 1986:108; Heppner et Inoue, 1992:148; Hun., 1992:1098)
Calinaga buddha formosana Fruhstorfer, 1908:
寄 主：小桑樹。
分 佈：臺灣。

3251. **Cyrestis thyodames** Boisduval 無花果蛺蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:283)
寄 主：無花果。
分 佈：江西。

3252. **Cyrestis thyodamas formosana** Fruhstorfer 石墻蝶 (Chang & Hung, 1986:109; Heppner et

Inoue, 1992:148)
Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898:
=*Cyrestis formosana* aut. f. *tappana* Matsumura, 1929:
=*Cyrestis formosana* ab. *nigriradiata* Sugitani, 1932:
=*Cyrestis haru* Kato, 1933:
=*Cyrestis aki* Kato, 1933:
=*Cyrestis formosana* ab. *horishana* Tanaka, 1939:
=*Cyrestis formosana* ab. *ambustus* Murayama et Shimonoya, 1963:
寄 主：薜荔、榕樹、白肉榕、牛奶榕。
分 佈：臺灣、華南、華中；日本、中南半島、印度、新幾內亞。

3253. **Euthalia garuda** Moore 大黑蛺蝶 (Luo et al., 1996:61)
寄 主：檬果(葉)。
分 佈：海南。

3254. **Euthalia phemius** Doubleday 檬果蛺蝶 (Luo et al., 1996:61)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

3255. **Polygonia c-album** (Linnaeus) 黃鉤蛺蝶 (Chou & Chiu, 1962:93; Heppner et Inoue, 1992:146; Hua, 1992:1100)
Papilio album Linnaeus, 1758:
=*Polygonia c-album asakurai* Nakahara, 1920:
別 名：*多角蛺蝶、C 字蝶、狸黃蝶、黃紋蝶、白弧紋蛺蝶*。
寄 主：柑橘、梨、莓類、大麻、律草、亞麻。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、陝西、湖北、浙江、安徽、江蘇、河南、山東、河北；日本、越南、瑞典。

Danaidae 斑蝶科

3256. **Euploëa mulciber** Cramer 白斑蜓蝶 (Zhang, 1987[ed.] 1:286)
寄 主：無花果。
分 佈：江西。

Satyridae 眼蝶科 (蛇目蝶科)

3257. **Elymnias hypermnestra hainana** Moore 紫蛇目蝶 (Chang & Hung, 1986:108; Heppner et Inoue, 1992:150; Pingtung AC., 1986:71)
Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878:
=*Elymnias hypermnestra formosana* Fruhstorfer 1903.
寄 主：可可椰子、黃椰子、觀音棕竹等棕櫚科等植物。
分 佈：臺灣、大陸沿海、海南；中南半島、印度、南洋群島。

3258. **Melanitis leda** (Linnaeus) 稻褐眼蝶 (Chan, 1982:279)
Papilio leda Linnaeus, 1758:
=*Papilio ismene* Cramer, 1775:
別 名：*稻暗褐眼蝶*。
寄 主：柑橘、水稻、甘蔗、麥等。
分 佈：臺灣、福建、廣東；日本、琉球、菲律賓、印尼、印度、澳洲、薩摩

亞島、斐濟群島、毛里求斯。
天 敵：*Coccygomimus parnarae* Viereck　稻苞蟲黑瘤姬蜂(幼蟲)
Rogas sp.　稻眼蝶內繭蜂(幼蟲)

HYMENOPTERA 膜翅目

Xyelidae 鞘葉蜂科

3259. **Xyela** sp. 油松鞘葉蜂 (Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:64)
Xyela sp. Li et al., 1992:4.
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr.　油松(雄花)
分 佈：陝西、山西。

Pamphiliidae 扁葉蜂科

3260. **Acantholyda dimorpha** Maa 異耦扁葉蜂 (ASZI, 1987, 2:306; Chao, 1982:286; Hun., 1992:1208; Zhang, 1987[ed.] 2:72; Xiao et al., 1991:14-15)
Acantholyda dimorpha Maa, 1944:
別 名：*異耦網蜂、黃結網葉蜂*。
寄 主：*Pinus massoniana* Lamb.　馬尾松
分 佈：福建、江西、湖南、湖北、浙江。

3261. **Acantholyda erythrocephala** (Linnaeus) 紅頭阿扁葉蜂 (Xiao et al, 1991:15)
寄 主：*Pinus* spp.　松
分 佈：黑龍江；朝鮮、蘇聯(西伯利亞、高加索)、北歐、中歐、英國、美國。

3262. **Acantholyda falavalbimarginata** Xiao 黃白緣阿扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:17)
寄 主：*Pinus yunnanensis* Frach.　雲南松
分 佈：雲南(華坪)。

3263. **Acantholyda flavomarginata** Maa 黃緣扁葉蜂 (ASZI, 1987, 2:306; Xiao, 1992:1144; Xiao et al., 1991:16; Zhang, 1987[ed.] 2:72)
Acantholyda flavomarginata Maa, 1944:
別 名：*異耦翅蜂、鑲黃網蜂、黃緣翅蜂*。
寄 主：*Pinus massoniana* Lamb.　馬尾松
分 佈：福建、江西、湖南、廣西。

3264. **Acantholyda guizhouica** Xiao 貴州阿扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:15-16)
寄 主：*Pinus massoniana* Lamb.　馬尾松
分 佈：貴州。

3265. **Acantholyda laricis** Giraud 落葉松扁葉蜂 (ASZI, 1987, 2:307; Xiao et al., 1991:21)
寄 主：*Larix gmelini* (Rupr.) Litvin.　興安落葉松。
分 佈：內蒙古；日本、蘇聯、芬蘭、匈牙利、奧地利。

3266. **Acantholyda peiyingaopaoa** Hsiao 白音阿扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:18)
寄 主：*Picea koraiensis* Nakai　紅皮雲杉

分 佈：內蒙古(赤峰市克什騰旗白音敖包林場)。

3267. **Acantholyda piceacola** Xiao et Zhou 雲杉阿扁葉蜂 (Xiao, 1992:1146; Xiao et al., 1991:18-19)
寄 主：落葉松
Picea crassifolia Kom. 雲杉
分 佈：青海、甘肅。
天 敵：病原菌
鳥類：烏鴉、斑尾榛雞

3268. **Acantholyda pinivora** Enslin 松扁葉蜂 (Liu, 1982[ed.]:218-219)
寄 主：油松、赤松。
分 佈：山東(泰山、蒙山)。

3269. **Acantholyda posticalis** Matsumura 松阿扁葉蜂 (ASZI, 1987, 2:307; Hun., 1992:1208; Xiao, 1992:1147; Xiao et al., 1991:20-21)
=*Acantholyda pinivora* Enslin,
別 名：*松扁葉蜂*。
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松
Pinus densiflora Sieb. et Zucc. 赤松
Pinus massoniana Lamb. 馬尾松。
Pinus sylvestris var. *mongolica* Litv. 樟子松
分 佈：湖南、河南、山東、山西、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯西伯利亞、蒙古、中歐、北歐、意大利、法國、英國。
天 敵：*Trichogramma dendrolimi* Matsumura 赤眼蜂(卵,寄生率爲 2.3 %)
Phora egregia 蚤蠅
Sarcophagus albiceps 麻蠅
寄蠅(幼蟲,寄生率達 21.6 %)
Myrmica kurokii 蟻(咬食率達 21.3 %)
Paratrichina flavipes 蟻(咬食率達 21.3 %)
富氏凹頭蟻(成蟲,幼蟲)
蜘蛛
Isaria sp. 黃僵菌
線蟲
Streptopelia orientalis orientalis 鳩鴿科

3270. **Acantholyda pseudodimorpha** Xiao 擬異耦扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:17; Yunn.,1987:1281)
寄 主：松。
分 佈：雲南(昆明、大理)。

3271. **Cephalcia abietis** (Linnaeus) 雲杉腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:25-26)
寄 主：紅皮雲杉
歐洲：*Picea alies* (Linnaeus) 歐洲雲杉
分 佈：黑龍江；東歐(羅馬尼亞、南斯拉夫、匈牙利)、中歐(德國、比利時、捷克、奧地利)、少見于北歐(芬蘭、瑞典、丹麥)。
天 敵：盲蝽(卵)

瓢蟲 2 種
食蟲椿
蚉蜂 2 種
蟻
Myxexoristops blondeli R.-O. 扁尾撵寄蠅
寄生菌
蜘蛛
鳥類

3272. **Cephalcia alashanica** (Gussakovskij) 賀蘭腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:28-29)
寄 主：紅皮雲杉
分 佈：內蒙古(賀蘭山西坡，赤峰市克什騰旗白音敖包林場)

3273. **Cephalcia arvensis** (Panzer) 阿佛腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:26-27)
寄 主：*Picea* spp. 雲杉
分 佈：黑龍江；蘇聯(西伯利亞)，北歐及西歐次山區較多。

3274. **Cephalcia chuxiongica** Xiao 楚雄腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:23; Yunn., 1987:1281)
Cephalcia chuxiongnica Xiao, 1984:138.
寄 主：*Pinus yunnanensis* Franch. 雲南松。
分 佈：雲南。

3275. **Cephalcia danbaica** Xiao 丹巴腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:22-23)
寄 主：*Picea retroflexa* Mats. 雲杉
Picea likiangensis var. *balfouriana* (Rehd et Wils.) 雲杉
分 佈：四川(丹巴大桑曲圃)。

3276. **Cephalcia erythrogaster** (Hartig) 紅腹腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:24-25)
寄 主：落葉松
分 佈：黑龍江；東歐(匈牙利，羅馬尼亞，南斯拉夫)，中歐(德國，比利時，捷克，奧地利)，少見于北歐(芬蘭，瑞典，丹麥)。

3277. **Cephalcia falleni** (Dalman) 法氏腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:27-28)
寄 主：國外：歐洲雲杉
Picea obovata 西伯利亞雲杉
分 佈：黑龍江；蘇聯(伊爾庫次克地區)，瑞典，芬蘭，捷克，奧地利，瑞士，德國，比利時，荷蘭。

3278. **Cephalcia kunyushanica** Xiao 昆崳山腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:23-24)
寄 主：赤松(?)
分 佈：山東(煙台地區昆崳山)。

3279. **Cephalcia lariciphila** (Wachtl) 高山扁葉蜂 (ASZI, 1987, 2:308; Xiao, 1992:1153; Xiao et al., 1991:29-30)
寄 主：*Larix principis-rupprechtii* Mayr 華北落葉松
落葉松

興安落葉松
分 佈：山西、河北、黑龍江；朝鮮、蘇聯、歐洲、英國。
天 敵：Formicidae　蟻科
Formica transkaucasia Wasonov　高加索黑蟻
Formica superba Wheeler　紅胸黑斑蟻
Formica sanguinea Latreille　血紅蟻
鳥類：喜鵲、烏鴉
寄生蜂

3280. **Cephalcia yanqingensis** Xiao 延慶腮扁葉蜂 (Xiao et al., 1991:24)
寄 主：油松
分 佈：北京(延慶)。

Xiphydriidae 項樹蜂科(長頸樹蜂科)

3281. **Xiphydria palaeanarctica** Semenov-Tian-Shanski 項樹蜂 (Xiao et al., 1991:36)
寄 主：核桃、松、樫木、槭、七葉樹、樺、榆。
分 佈：吉林；朝鮮、日本、蘇聯。

Siricidae 樹蜂科

3282. **Sirex juvencus juvencus** (Linnaeus) 藍黑樹蜂 (ASZI, 1987, 2:309; Xiao et al., 1991:40)
寄 主：落葉松、松樹、雲杉。
分 佈：西藏、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、瑞典、匈牙利、羅馬尼亞、波蘭、芬蘭、法國、丹麥、印度、土耳其、澳大利亞、阿爾及利亞、英國、加拿大、美國。

3283. **Sirex juvencus imperialis** Kirby (Xiao et al., 1991:41)
寄 主：松、雲杉。
國外：冷杉、雪松
分 佈：貴州、浙江、安徽、山東；印度、巴基斯坦。

3284. **Sirex nitobei** Matsumura 新渡戶樹蜂 (Xiao et al., 1991:40)
寄 主：華山松、油松。
國外：落葉松、松屬植物
分 佈：雲南、陝西、河北；朝鮮、日本。

3285. **Sirex rufiabdominis** Xiao et Wu 紅腹樹蜂 (Xiao, 1992:1156; Xiao et al., 1991:39-40)
寄 主：馬尾松、油松。
分 佈：浙江、江蘇、安徽。

3286. **Tremex apicalis** Matsumura 黑頂樹蜂 (ASZI, 1987, 2:310)
寄 主：紅松、楊、柳、梧桐。
分 佈：四川、浙江、江蘇、陝西、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本。

3287. **Tremex fuscicornis** (Fabricius) 煙角樹蜂 (ASZI, 1987, 2:310; Han., 1992:1209; Xiao, 1992:1158;

Xiao et al., 1991:57-58; Zhang, 1987[ed.] 2:73)

寄 主：梨、桃、杏、楓楊、柳、楊、櫸、水青岡、楓、櫟、朴、樺、千金榆等 80 餘種樹木。

分 佈：福建、江西、湖南、西藏、浙江、江蘇、上海、山東、山西、甘肅、寧夏、陝西、河北、北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、北歐、西歐、北美、澳洲。

天 敵： Mantidae　螳螂科

Meganhyssa parccelleus Tosquinet　褐斑馬尾姬蜂(寄生率 24.5%)

蜘蛛

灰喜鵲、伯勞

3288. **Urocerus albicornis** Fabricius 杉樹蜂 (Chang & Hung, 1986:140)

寄 主：松類、杉木、冷杉 (枝幹)。

分 佈：臺灣；加拿大、美國、墨西哥。

3289. **Urocerus antennatus** (Marlatt) 異角大樹蜂 (Xiao et al., 1991:46)

寄 主：紅松、雲杉、落葉松。

國外：冷杉、鐵杉

分 佈：北京、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯。

3290. **Urocerus gigas taiganus** Benson 泰加大樹蜂 (Beijing FC., 1980[ed.]:352-353; Xiao, 1992:1159; Xiao et al., 1991:47-48)

寄 主：松、雲杉、落葉松。

分 佈：山西、河北、甘肅、青海、新疆、黑龍江；蘇聯、波蘭、芬蘭、挪威。

3291. **Urocerus japonicus** Smith 松樹蜂 (Chang & Hung, 1986:140)

=*Urocerus sinuatus* Matsumura,

寄 主：松、杉木、冷杉 (枝幹)。

分 佈：臺灣；日本。

3292. **Urocerus xanthus** (Cameron) 藏黃大樹蜂 (Xiao et al., 1991:47)

寄 主：雲杉、冷杉。

國外：松、雪松。

分 佈：西藏、青海；印度、巴基斯坦。

3293. **Xeris spectrum himalayensis** (Bradley) 喜馬拉雅尾樹蜂 (Xiao et al., 1991:43)

寄 主：松、雪松、雲杉、冷杉。

分 佈：西藏。

3294. **Xoanon matsumurae** (Rohwer) 松村氏斑樹蜂 (Xiao et al., 1991:52)

寄 主：松、落葉松、冷杉、雲杉。

分 佈：吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

Cephidae 莖蜂科

3295. **Janus gussakovskii** Maa 葛氏梨莖蜂 (Chao, 1982:289; Huang, 1990[ed.] 2:99; Huang et Gao,

1996:255; Xiao et al., 1991:64)
寄　主：梨。
分　佈：福建、河北、北京。

3296. **Janus piri** Okamoto et Matsumura 梨莖蜂 (ASZI, 1987, 2:310; Chao, 1982:289, Chen et Wang, 1987:135-136; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:99-102; Huang et Gao, 1996:255; Hun., 1992:1210; Li, 1995:30; Li, 1995(2):16; NZWDL, 1981:1740; Sun, 1984:368-369; Xiao et al., 1991:63-64; Zhang, 1987[ed.] 2:72; Zhang, 1997(3):41-42; Zhejiang, 1978:9-11; Zhao et al., 1998(4):29)
寄　主：梨、沙果、蘋果、海棠、杜梨等。
分　佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、河南、陝西、山東、河北、北京；朝鮮、蘇聯、西歐。
天　敵：*Tetrastichus* sp.　嚙小蜂(幼蟲)

3297. **Janus** sp. 山楂莖蜂 (Cao et Peng, 1993:24)
寄　主：山楂。
分　佈：山西。

Diprionidae 松葉蜂科

3298. **Diprion jingyuanensis** Xiao 靖遠松葉蜂 (Chen et al., 1997, 13(2):61-64; Wang et al., 1994, (3):12-14; Xiao et Zhang, 1994, (6):663-664; Zhang, 1995, 11(1):40-45; Zhou et Zhang, 1994, (11):10-12)
寄　主：*Pinus tabulaeformis* Carr.　油松
分　佈：山西、甘肅。

3299. **Diprion liuwanensis** Huang et Xiao 六萬松葉蜂 (ASZI, 1987, 2:313; Xiao, 1992:1168; Xiao et al., 1991:87-88)
寄　主：馬尾松
　　Pinus taiwanensis Hay.　黃山松
分　佈：廣東、廣西、江西、安徽。
天　敵：*Hierodula patellifera* Serville　廣腹螳螂
　　蠋敵
　　黑刺蟻
　　大腿蜂
　　大山雀、黑枕黃鸝、杜鵑、畫眉。

3300. **Diprion nanhuaensis** Xiao 南華松葉蜂 (Xiao, 1992:1170; Xiao et al., 1991:89; Yunn., 1987:1288; 1290)
寄　主：華山松、雲南松、馬尾松。
分　佈：雲南、貴州。

3301. **Diprion pinivora** Maa 松葉蜂 (Chao, 1982:287)
寄　主：馬尾松。
分　佈：福建。

3302. **Diprion similis** (Hartig) 類歐松葉蜂 (Xiao et al., 1991:90)
寄　主：國外：*Pinus sylvestris* Linnaeus　歐洲赤松
　　Pinus montana Mirl.　歐洲山松

Pinus strobus 美國白松

分 佈：遼寧；蘇聯(西伯利亞及歐洲部)，中歐，北歐，美國，加拿大。

3303. **Diprion wenshanicus** Xiao et Zhou 文山松葉蜂 (ASZI, 1987, 2:313; Xiao et al., 1991:88; Yunn., 1987:1288, 1289)

寄 主：雲南松。

分 佈：雲南。

3304. **Diprion** sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:72)

寄 主：松。

分 佈：江西。

3305. **Gilpinia disa** Smith 油杉吉松葉蜂 (Yunn., 1987:1289, 1290)

寄 主：雲南油杉。

分 佈：雲南。

3306. **Gilpinia fennica** (Forsius) 芬蘭吉松葉蜂 (Xiao, 1992:1171)

寄 主：雲杉。

分 佈：黑龍江；芬蘭南部。

天 敵：松小卷蛾寄蠅

3307. **Gilpinia jinghongensis** Xiao et Huang 景洪吉松葉蜂 (Yunn., 1987:1288, 1293)

寄 主：松。

分 佈：雲南。

3308. **Gilpinia jingxii** Xiao et Huang 景룑吉松葉蜂 (Yunn., 1987:1288, 1292)

寄 主：松。

分 佈：雲南。

3309. **Gilpinia lipuensis** Xiao et Huang 荔蒲吉松葉蜂 (Xiao et al., 1991:99)

寄 主：馬尾松。

分 佈：廣西(荔蒲)。

3310. **Gilpinia pinicola** Xiao et Huang 紅松吉松葉蜂 (Xiao et al.,1991:97)

寄 主：*Pinus koraiensis* Sieb. et Zucc. 紅松

分 佈：黑龍江。

3311. **Gilpinia yongrenica** Xiao et Huang 永仁吉松葉蜂 (Xiao et al., 1991:96-97; Yunn., 1987:1288, 1292)

Gilpinia yongrenica Xiao et Huang, 1984:141.

寄 主：雲南松。

分 佈：雲南。

3312. **Microdiprion keteleeriafolius** Xiao et Huang 油杉小松葉蜂 (Yunn., 1987:1289, 1297)

寄 主：雲南油杉。

分 佈：雲南。

3313. **Neodiprion biremis** (Konow) 雙枝黑松葉蜂 (Xiao et al., 1991:92; Yunn., 1987:1289)
寄 主：雲南松
Pinus khasya Royle ex Gord var. *langbianensis* (Ghev.) Gaussen 思茅松
分 佈：香港、雲南；泰國。

3314. **Neodiprion chuxiongensis** Xiao et Zhou 楚雄新松葉蜂 (Xiao et al., 1991:103; Yunn., 1987:1289, 1296)
Neodiprion chuxiongensis Xiao et Zhou, 1984:144.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

3315. **Neodiprion dailingensis** Xiao et Zhou 帶嶺新松葉蜂 (Xiao, 1992:1173; Xiao et al., 1991:102)
寄 主：紅松、雲杉。
分 佈：遼寧、黑龍江。
天 敵：*Ichneumon* sp. 姬蜂
寄蠅(寄生率可達 30 %)

3316. **Nesodiprion deqenicus** Xiao et Zhou 迪慶黑松葉蜂 (Xiao et al., 1991:91-92)
寄 主：*Pinus densata* Mast. 高山松
分 佈：雲南。

3317. **Neodiprion guangxiicus** Xiao et Zhou 廣西新松葉蜂 (Fang et Cao, 1988:291-293; Xiao, 1992:1175; Xiao et al., 1991:101)
寄 主：雲南松。
分 佈：廣西、雲南。
天 敵：Virus 病毒
Ichneumonidae 姬蜂科(二種)
Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅(幼蟲)
寄蠅(幼蟲)(寄生率爲 41.8 %)

3318. **Nesodiprion huanglongshanicus** Xiao et Huang 黃龍山黑松葉蜂 (ASZL, 1987, 2:313; Xiao, 1992:1178; Xiao et al., 1991:91)
寄 主：油松、華山松。
分 佈：陝西(黃龍山)。
天 敵：蜘蛛(成蟲)
蚯蚓(成蟲)
Reduviidae 獵蝽科(幼蟲)
大黑蟻(幼蟲)
蟻(成蟲)
鳥類：大山雀、杜鵑、北紅尾鴝
鼠類(幼蟲)
白僵菌(幼蟲)
霉菌(蛹)
姬蜂科(蛹)
寄蠅(幼蟲)

寄蠅(蛹)

3319. **Neodiprion huizeensis** Xiao et Zhou 會澤新松葉蜂 (Xiao et al., 1991:100-101; Yunn., 1987:1289, 1294)

Neodiprion huizeensis Xiao et Zhou, 1984:'42.

寄 主：華山松。

分 佈：雲南。

3320. **Neodiprion japonica** Merlatt 松綠葉蜂 (Chang & Hung, 1986:140; Chao, 1982:288; Yie, 1966:173-185; Yie et al., 1967:5-13; Zhang, 1987[ed.] 2:72)

別 名：*松黃葉蜂*。

寄 主：馬尾松、濕地松、松類(葉)。

分 佈：臺灣、福建、江西；日本。

天 敵：*Euplectrus* sp. 釉小蜂(幼蟲)

Cleptridae

Cleptrus pinicola Lin

3321. **Neodiprion sertifer** Geiffroy) 松黃葉蜂 (Beijing FC., 1980[ed.]:299-302; Chu, 1974:233-236; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:212-213; Liu , 1982[ed.]:217-218; Zhang, 1987[ed.] (2):72)

寄 主：油松、馬尾松、紅松、華山松、油松、赤松、黑松、雲南松。

分 佈：江西、陝西、河北、遼寧。

天 敵：*Parus major* 白臉山雀(幼蟲)

Phoenicus aurooreus 紅尾鴝(幼蟲)

霉菌(蛹)

寄蠅(蛹)

姬蜂(蛹)

繭蜂(蛹)

小蜂(蛹)

蜘蛛(成蟲)

鼠(蛹)

3322. **Neodiprion xiangyunicus** Xiao et Zhou 祥雲新松葉蜂 (Xiao, 1992:1176; Xiao et al., 1991:100; Yunn., 1987:1289, 1295)

Neodiprion xiangyunicus Xiao et Zhou, 1984:144.

寄 主：雲南松、華山松。

分 佈：貴州、雲南、四川。

天 敵：Pentatomidae 蝽科(幼蟲)

Reduviidae 獵蝽科(幼蟲)

Formicidae 蟻科(幼蟲,成蟲)

蜘蛛(成蟲)

大山雀、鵲鴝、黃臀鵯

白僵菌(幼蟲)(12.5%)

霉菌(蛹)

Ichneumonidae 姬蜂科(蛹,二種)

小蜂(蛹,一種)

Chrysis sp. 青蜂

Tachinidae　寄蠅科(幼蟲-蛹,二種)
鷓鴣(蛹)

3323. **Nesodiprion yananicus** Huang et Zhou 延安黑松葉蜂 (ASZI, 1987, 2:314; Xiao et al., 1991:91)
寄 主：油松。
分 佈：陝西。

3324. **Nesodiprion zhejiangensis** Zhou et Xiao 浙江黑松葉蜂 (ASZI, 1987, 2:314; Hun., 1992:1209; Xiao, 1992:1180; Xiao et al., 1991:92-93; Yunn., 1987:1289, 1294; Zhang, 1987[ed.] (2):72)
寄 主：華山松、馬尾松、濕地松(*Pinus elliottii*、火炬松(*Pinus taeda*)、晚松、雲南松、思茅松、黑松(*Pinus thunbergii*)。
分 佈：福建、議廣東、廣西、雲南、四川、湖南、江西、浙江、安徽、湖北。
天 敵：Ichneumonidae　姬蜂科(蛹，二種)
Monodontomerus minor Ratzeburg　單齒突小蜂(蛹)
Cleptidae
Cleptus sp. (蛹)
(林間寄生率爲 27.8-54.7 %)

Tenthredinidae 葉蜂科

3325. **Allantus** sp. 山楂粘葉蜂 (Kang et al., 1993, 20(3):211-215)
寄 主：山楂(葉)。
分 佈：吉林。

3326. **Arge berberidis** Shrank 松三節葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:72)
寄 主：松。
分 佈：江西。

3327. **Arge coerutescens** Geoffroy 暗藍三節葉蜂 (Xiao et al., 1991:71-72)
寄 主：*Rubus* spp.　懸鈎子屬
分 佈：雲南；朝鮮、日本、蘇聯、西歐。

3328. **Arge pagana** Panzer 薔薇葉蜂 (Cheng et Duan, 1992, 9(2):122; Zhang, 1987[ed.] 2:72)
寄 主：李、桃、刺梨。
分 佈：江西、陝西。

3329. **Caliroa cerasi** (Linnaeus) 梨粘葉蜂 (Huang, 1990[ed.] 2:102-103)
寄 主：梨(葉)。
分 佈：四川、江蘇、山東、新疆；日本、歐洲、北美。

3330. **Caliroa matumotoris** Harukawa 梨葉蜂 (Huang, 1990[ed.] 2:102)
寄 主：梨。
分 佈：雲南。

3331. **Cimbex nomurae** Marl 梨大葉蜂 (Cao et Peng, 1993:23; 1993(4):11-12)

寄 主：梨。
分 佈：山西。

3332. **Croesus japonicus** Takeuchi 日本扁足葉蜂 (Xiao, 1992:1183)
寄 主：核桃、楓楊。
分 佈：山東；朝鮮、日本。

3333. **Hoplocampa minutominuto** Ghrist 李實蜂 (Chen et Wang, 1987:158-159; Gao, 1996(1):49; Huang, 1990[ed.] 2:163-164; Liu, 1993, 15(2):84-87; Yang et al., 1997(4):37)
寄 主：李。
分 佈：江蘇、陝西、北京。
天 敵：*Steinernema* CB-2Y 斯氏線蟲
Bracon nigrorufum Cushm. 繭蜂(幼蟲)

3334. **Hoplocampa pyricola** Rohwer 梨實蜂 (ASZI, 1987, 2:315; Chen et Wang, 1987:125-126; Han, 1993(4):41; Huang, 1990[ed.] 2:97-99; Hun., 1992:1210; Li, 1994:29; NZWDI, 1981:1742; Wu et Zhang, 1999(2):43; Wu et al., 1998(1):45-46; Zhang, 1987[ed.] 2:72; Zhao et al., 1997:190)
寄 主：梨(花及幼果)、杏、榛、櫻桃。
分 佈：福建、江西、湖南、河南、華東、陝西、河北、北京、西北、遼寧；日本。

3335. **Nematus** sp. 梅葉蜂 (Cai et Liu, 1988:152-153)
寄 主：梅。
分 佈：四川。

3336. **Nematus** sp. 落葉松赤腹葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:72)
寄 主：落葉松。
分 佈：江西。

3337. **Pachynematus itoi** Okutani 伊藤厚絲葉蜂 (Xiao, 1992:1194)
寄 主：西伯利亞落葉松、日本落葉松、長白落葉松、興安落葉松。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、奧地利。
天 敵：Hemerobiidae 褐蛉科(成蟲,一種)
Pentatomidae 蝽科(幼蟲)
鳥類(幼蟲)
Virus 病毒(幼蟲)
Ichneumonidae 益蜂科(幼蟲,一種)

3338. **Pristiphora erichsonii** (Hartig) 落葉松紅腹葉蜂 (ASZI, 1987, 2:317; Xiao, 1992:1197; Xie, 1990:354-255)
別 名：*落葉松葉蜂*。
寄 主：華北落葉松、興安落葉松、落葉松。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等；蘇聯、中歐和北歐、英國、加拿大、美國。

3339. **Pristiphora huangi** Xiao 桃葉蜂 (Huang et Gao, 1996:257; Xiao et al., 1991:126; Zhao et al.,